

ক্লেন নিঃসরণ ; সন্তান প্রসবের পর ক্লেন (Lochia) নিঃসরণ বন্ধ হইয়া অস্বাভাবিক হয় (একন্, বেগ্) ; স্তনে দুগ্ধের সঞ্চয় বন্ধ হওয়া ।

খাসিয়দ্ব । স্বর মৃদু, শুনি যায় না এবং ভোতলায় জ্বর ; রক্তোৎকাশ এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে কখন কাশি থাকে, কখন বা কাশি থাকে না ; নিশ্বাস কষ্টকর এবং উষ্ণগুক্ত ; অনবরত দীর্ঘনিশ্বাস (ক্যাক্-কস্, ইন্-নেস্) ; হিকা (সিকুটা, নাক্স-বম্, হায়োস্, ট্রাইমন্) ।

হৃৎপিণ্ড এবং নাড়ী । হৃৎস্পন্দন ; নাড়ী ক্ষুদ্র, দ্রুতগামী এবং সঙ্কুচিত এবং অনেক সময় 'অগম (Intermittent) (কোনারাম্, ডিম্বিট্, ক্যালী-কার্ক্, নেট্রাম্-মিউর) ; নাড়ী কম্পমান্, মৃদুগতি বিশিষ্ট এবং লুপ্ত ।

পৃষ্ঠদেশ । পৃষ্ঠদেশ এবং কোমরের পশ্চাদ্দেশে বেদনা (বেল্, সিমিসিক্, নাক্স-বম্, পাল্-স্) ; পৃষ্ঠদেশে অবশবোধ এবং টন্টনানি বাহ্য হাত এবং পায়ের আঙ্গুল পর্গান্ত বিস্তৃত হয় (একন্) ।

অঙ্গ প্রত্যঙ্গ । অঙ্গ প্রত্যঙ্গের আক্ষিপিক সঞ্চালন (সিকুটা, বেগ্, হায়োস্, ট্রাইমন্) ; হাত পায়ের পাতা এবং আঙ্গুলের সঞ্চালন ; অঙ্গ প্রত্যঙ্গে ভারিবোধ এবং উহার কম্পন ; উষ্ণ জলে অনেকক্ষণ ভিজাইয়া রাখিলে ঘেঁষাপ হয়, অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সেরূপ ঠাণ্ডা, শিটা এবং কৌকড়া হয় ; অঙ্গ প্রত্যঙ্গে অবশবোধ এবং উহাতে স্পর্শজ্ঞান রহিততা ও ঠাণ্ডাবোধ, হাত পায়ের অগ্রভাগেই বাহ্য অধিক অগ্রভূত হয় ; অঙ্গ প্রত্যঙ্গে কষ্টদায়ক অসাড়বোধ ; পা বাহ্য, হাত এবং পায়ের আঙ্গুলে ঝিল ধরা ; অঙ্গ প্রত্যঙ্গে হামা দেওয়ার জ্বর হুড়্-হুড়্ এবং কুট্-কুট্ করা (একন্) ; অঙ্গ প্রত্যঙ্গে কসিয়া ধরার জ্বর বেদনা ; হাত পায়ের পাতায় আলাহুতব (আস্, লাল্-ফ্) ; অঙ্গ প্রত্যঙ্গে ঝিঁঝিঁ ধরা ; অঙ্গ প্রত্যঙ্গে পচা লাগা (Gangrene) (আস্, আন্-গ্রাঙ্গ্) ।

চর্ম্ম । চর্ম্ম শীতল এবং শুষ্ক ; সমুদয় শরীরেই অসাড়বোধ ; কোন প্রাণী হামা দিবা গেলে ঘেঁষাপ হয়, চর্ম্মের নীচে সেরূপ অগ্রভূত হয় ; গায় হামের জ্বর ফুসুড়ী (আস্, আর্গিকা, কস্) ; শরীরের স্থানে স্থানে লোন্ডা বাগ্গর (Echymoses) (আর্গিকা, কস্) ; শরীরের নানা স্থানে পচাযুক্ত ফোঁকা পড়া (আস্) ।

জ্বর । সমুদয় শরীর ঠাণ্ডা, বিশেষতঃ হাত পা, এবং মুখমণ্ডল ;

সমুদয় শরীরে প্রচুর পরিমাণে শীতল চট্‌চটিয়া ঘর্ষ (আস্, ক্যাম্ফার, মার্ক, ফস) ।

ব্যবহার । রক্তশ্রাব, বিশেষতঃ জরায়ু হইতে স্ত্রীলোকের শেষ রক্তঃরোধের সময় রক্তশ্রাব ; গর্ভশ্রাব ; অনিয়মিত, আক্ষেপিক, মূহ প্রসব বেদনা অথবা প্রসব বেদনা আরম্ভ হইয়া একবারেই থাকে না ; সন্তান প্রসবের পর ক্রোদ (Lochia) নিঃসরণ বন্ধ হওয়া বা উহা বিকৃত হওয়া ; সন্তান প্রসবের পর পেটে বেদনা (ভাবালিয়ার কামড়, -After pains) ; সন্তান প্রসবের পর জরায়ুর মধ্যে কুল (Placenta) লাগিয়া থাকা ; আক্ষেপ বা কন্বাল্‌সন্স (Convulsions) ; পক্ষাঘাত ; পচা ঘা বা গ্যাংগ্রিন্ (Gangrene) ; ক্ষত ; ছুষ্ট্রণ বা পৃষ্ঠাঘাত (Carbuncle) ; সামান্য এবং সাংঘাতিক আকরের ওলাউঠা ; কসেরুকা মর্জ্জায় রক্তাধিক্য বা রক্তাবরোধ এবং উহার উদ্ভেজনা ইত্যাদি অনুরূপে সিকেল্ কর্ণুটাম ব্যবহার্য্য ।

বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ । অত্যন্ত তরুলতা, বলক্ষয় এবং অস্থিরতা (আস্) ; অতি শীঘ্র শীঘ্র বলক্ষয় (আস্, ক্যাম্ফার, কার্বো-বেজ্) ; আক্ষেপ বা কন্বাল্‌সন্স ; মূত্ররোগের জ্ঞায় আক্ষেপ বা থেঁচনী ; নিম্ফেটিক্ গ্রন্থির কোড়াব জ্ঞায় ক্ষীতি ; ওলাউঠার জ্ঞায় রোগের পতনাবস্থা ; রক্তশ্রাবের সময় ; উদ্ভাপে অনুরূপের বৃদ্ধি এবং ঠাণ্ডা বাতাসে, অথবা সর্দি লাগিলে বা বৃথ হইলে অনুরূপের উপশম ; শীর্ণ, লম্বা, তল্‌তলে এবং শিথিল লেঙ্গী বিশিষ্ট চর্ম্মল এবং রুদ্র ও বৃদ্ধ অচলের পক্ষে এই ঔষধ বিশেষ উপকারী ইত্যাদি সিকেল্ কর্ণুটামের কতকগুলি বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ মধ্যে পরিগণিত ।

সমগুণবিশিষ্ট ঔষধ । জরায়ুর উপর সিকেলের কার্য্য অনেকটা কলোকিলামের জ্ঞায় । এতদ্বিন্ন কোন কোন বিষয়ে ইহার কার্য্যের সঙ্গে আদিনিক, বেলাডোনা, ক্যামোমিলা, কল্‌চিকাম্, লাইকোপডিয়ার, পাল্‌সেটিলা, রাস্-টক্স এবং সাল্‌ফারের কার্য্যের জ্ঞায় ।

প্রতিষেধক ঔষধ । ক্যাম্ফার, ওপিয়াম্ ।

ডাইলুশন বিচার । ৩য় এবং ৬ষ্ঠ ডাইলুশনই সচরাচর অধিক ব্যবহৃত হইয়া থাকে । ডাক্তার গাংবলি, ডাক্তার লেডাম্ এবং ডাক্তার ফ্রোয়ে-

দ্রিয়ার মতে এই ঔষধের ১২ এবং ৩০ ডাইলুশনে প্রসব বেদনা বৃদ্ধি করিয়া সম্ভান প্রসবের বিশেষ সহায়তা করে । কোন কোন চিকিৎসক সম্ভান প্রসব উপলক্ষে এই ঔষধের ২০০ ডাইলুশনও ব্যবস্থা করিয়া থাকেন । আবার কোন কোন চিকিৎসক প্রসব বেদনা প্রবল করার অভিপ্রায়ে মূল আরোক এবং ১ম বা ২য় দশমিক ডাইলুশন, ১ ফোঁটা মাত্রায় সেবনের ব্যবস্থা করিয়া থাকেন ।

স্পাইজেলিয়া আন্থেলমিয়া,—স্পাইজেল্

(SPIGELIA ANTHALMIA,—SPIGEL.)

দক্ষিণ আমেরিকা, ব্রেজিল এবং ইউনাইটেড স্টেটসের দক্ষিণ এবং দক্ষিণ পশ্চিমাংশে এই গাছ জন্মে । এই গাছের শুকনা পাতা, ডাঁটা যথা নিয়মে রেকটিকাইড্ স্পিরিটে ভিজাইয়া ইহার মূল আরোক প্রস্তুত হইয়া থাকে । শুকনা পাতা, ডাঁটা গুঁড়া করিয়া যথা নিয়মে উহাতে স্বগার অব্ মিক্ মিশাইয়া ইহার গুঁড়াও প্রস্তুত হইতে পারে ।

সাধারণ ক্রিয়া । শরীরের সমুদয় অংশ এবং বিশেষ বিশেষ ইঞ্জিনের স্নায়ু এবং চক্ষু ও জ্বংপিণ্ডের অংশাল অংশ ও পেশীর উপর ইহার কার্য্য থাকা হেতু গতি উৎপাদন শক্তির সহায়কারী স্নায়ু উত্তেজিত হইয়া মুখমণ্ডলের পেশীর আক্ষেপিক সঞ্চালন, পেশীর অগ্রভাগের স্পন্দন (Subsultus Tendinum) এবং আক্ষেপ (Convulsions) হইয়া থাকে । জ্ঞান উৎপাদন শক্তির সহায়কারী স্নায়ু উত্তেজিত হওয়ার দরুন মুখমণ্ডল এবং মস্তকের ট্রিজিমিনাই বা ট্রাইকেসিয়াল্ (Trigemini or Trifacial) নামক বৃহৎ স্নায়ুশূল, জ্বংস্নায়ুশূল, উৎপন্ন হয় । উক্ত প্রকারের স্নায়ুশূল এবং চক্ষু ও জ্বংপিণ্ডের বাতাক্রান্ত হওয়ার অবস্থা উৎপাদন করা এই ঔষধের একটী বিশেষ প্রাকৃতিক গুণ বা শক্তি মধ্যে পরিগণিত ।

সাধারণ প্রাকৃতিক লক্ষণ ।

মন । স্মরণ শক্তির দুর্বলতা বা হ্রাস ; কোন প্রকারের মানসিক পরিশ্রমে অনিচ্ছা ।

অন্তক । উচ্চ স্থান হইতে নিম্ন দিকে তাকাইলে মাথা ঝোঁরা, বাহার দরুণ রোগী মনে করে যেন সে পড়িয়া যাইবে ; মাথার চিমা বোধ এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে কপালে চাপিয়া ধরার জায় বেদনা যাহা অধিক হইতে আরম্ভ হইয়া বহির্দিকে বিস্তৃত হয় বলিয়া অমুভূত হয় ; একগাছি কিতা কসিয়া বাধিয়া রাখিলে যেরূপ হয়, মাথার সেরূপ আঁটাবোধ (আন্টি-টার্ট, জেল্‌স, ক্যালী-আয়োড), মাথা হেট করিয়া উপুড় হইলে যাহা অধিক অমুভূত হয় ; কপাল এবং কপালেত্র হই পার্শ্বে ছিঁড়িয়া ফেলার জায় বেদনা যাহা চক্ষুর পানে বিস্তৃত হয় এবং নড়া চড়া, বিশেষতঃ চলিবার সময়, পা বধা স্থানে না পড়িয়া পা হঠাৎ সরিয়া পড়িলে বাহার বৃদ্ধি হয় ; মাথার চাপিয়া ধরার জায় বেদনা যাহা কপালের ডাইন পার্শ্বেই অধিক অমুভূত হয় এবং তদরূপ ডাইন চক্ষুও আক্রান্ত হয়, নড়া চড়া, গোলমাল, ঝাঁকি লাগা অথবা মলত্যাগের সময় কৌণ পাড়িলে বৃদ্ধি হয় ; মাথা যেন ফাটিয়া য় য় হইয়া পড়িয়া যাইবে এরূপ অমুভূত হয় (ব্রাই, ক্যাপ্‌স) ; নির্দিষ্ট সময়ে (Periodical) শিরঃস্রোতা ; মস্তিষ্কের কাঁপনি, মাথা নাড়িলে বা তাড়া তাড়ি চলিয়া বেড়াইলে যাহা অধিক অমুভূত হয় (বেল, নাক্স-মক্‌, রাস্‌ টক্স) ; স্পর্শ করিলেও মাথার হাড় টাটানি (একন্‌, চায়না, মার্ক, নেট্রাম্‌-মিউর, সাইলিসি, সাল্‌ক) ।

চক্ষু । চক্ষু উহার কোটির অপেক্ষা বড় হইলে যেরূপ হয়, চক্ষু সকালনে সেরূপ অমুভূত বোধ (প্রোথাম্‌, কন্‌-আন্‌) ; চক্ষে ঝোঁটা বিধা বা কর্তনব্যং শ্রবণ বেদনা যাহা চক্ষে আরম্ভ হইয়া চক্ষুদিকে বিস্তৃত হয় ; চক্ষুর গোলকে চাপিয়া ধরার জায় বেদনা, চক্ষুর গোলক ঘুরাইলেই যাহা অধিক অমুভূত হয় (ব্রাই, ফাইসট্‌) ; বাতাক্রান্ত চক্ষু প্রদাহ (Rheumatic Ophthalmia) এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে চক্ষু দিয়া প্রচুর পরিমাণে জল পড়া, চক্ষে কখন বেদনাদি থাকে, কখন বা বেদনাদি থাকে না ; চক্ষুর উপরের পাতা পড়িয়া যার বা চক্ষু যেদিকের দিকি থাকে না (Ptosis) ; চক্ষে বেদনা যাহা চক্ষুর কোটির পতীরতম অংশে অমুভূত হয় (আলোক্‌, মিউসিক্‌) ; চক্ষু প্রদাহ এবং তদরূপ চক্ষুর যেখানে লাগ বর্ণ ।

কর্ণ । কোন নির্দিষ্ট সময়ে (Periodical) বধিরতা ; অনেক দূর

হইতে যেন কানে টন টন শব্দ প্রবেশ করে, বাহার দরুণ মনে হয় যেন কান ঢল ঢলে করিয়া বন্ধ করিয়া রাখিয়াছে; কর্ণশূল এবং কানের মধ্যে ডেলার ভায় কোন পদার্থ লাগিয়া রাখিয়াছে এরূপ অনুভূত হওয়ার দরুণ কানে চাপিয়া ধরার ভায় যাতনা ।

নাসিকা । নাসিকার গোড়ার পশ্চাৎ ভাগ হইতে প্রচুর পরিমাণে স্লেম্মা নির্গমন, বাহার দরুণ রাতিতে নাক বন্ধ হইয়া থাকে; সোম নড়িলে বা বাতাস মধ্যে প্রবেশ করিলে যেরূপ হয়, নাসিকার পশ্চাৎ দেশে সেরূপ স্ফুৎ স্ফুৎ করা ।

মুখমণ্ডল । মুখমণ্ডলে বেদনা বা স্নায়ুশূল, যাহা বায় পার্শ্বেই অধিক অনুভূত হয় (একন্) এবং তদরুণ আক্রান্ত স্থানে ছিঁড়িয়া ফেলা, খোঁচা বিধার ভায় বা জ্বালাযুক্ত বেদনা, যাহা গালের হাড়, নিম্ননাড়ি, চক্ষুর ক্রুর উপরিভাগ এবং চক্ষু গোলকেই অধিক অনুভূত হয়; কোন নির্দিষ্ট সময়ে উক্ত প্রকারের স্নায়ুশূল; বেদনা প্রাতঃকাল হইতে আরম্ভ হইয়া সন্ধ্যাস্ত পর্য্যন্ত অবস্থিতি করে; বেলা ছই প্রহরের সময় বেদনাদির বৃদ্ধি; নড়া চড়া বা গোলমালা বেদনাদির বৃদ্ধি (চায়না, কোইনাইন্) ।

মুখগহ্বর । দন্ত শূল, বাহার দরুণ মনে হয় যেন দাঁত বহির্দিকে ঠেপিয়া বাহির হইতেছে; দাঁতের গোড়ায় ছিঁড়িয়া ফেলার ভায় বা দগ্ধশিয়া বেদনা, বিশেষতঃ যে দাঁতে ছিদ্র হয় (মার্ক); ঠাণ্ডা জল লাগিলে দাঁতের বেদনার বৃদ্ধি (আন্টি-ক্লুড, গ্রাফ, ষ্টাফিস, সাল্‌ক); ঠাণ্ডা বাতাসে দাঁতের বেদনার বৃদ্ধি (একন্); আহারের পর দাঁতের বেদনার বৃদ্ধি (আন্টি-ক্লুড, ল্যাক); জিহ্বা ফাটায়ুক্ত (ব্যাণ্ট, বেল, রান্-টম্); জিহ্বার ডাইন পার্শ্বে স্ফী বিধানের ভায় বেদনা ।

পাকস্থলী এবং উদর । কোন কঠিন পদার্থ চাপিয়া থাকিলে যেরূপ হয়, পাকস্থলীতে সেরূপ চাপিয়া থাকার ভায় বেদনা বা যাতনা (ব্রাই, কালী-কার্ক, মার্ক, নাজ্-বম, সিপিয়া) । কসিয়া ধরিলে যেরূপ হয়, উদরে সেরূপ বেদনা বা পেটকানড়াণী এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে মনের অত্যন্ত উৎসেহ ও হাস কষ্ট; উদরে স্ফী বিধানের ভায় প্রথর বেদনা ।

মল এবং মলদ্বার । বায়দ্বার বাহ্যে বেগ, কিন্তু বেগ দিলে মল

নির্গত হয় না (আনাকাড, কষ্ট, লাইকোপ, নাক্স-বম); মলের সঙ্গে ক্রমি পড়ে; গুহ এবং গুহ ঘারে চুলকানি, কুট, কুট, করা এবং হুড্, হুড্, করা; গুহ ঘারে লম্বা পোল-ক্রমি; অণ্ডকোষ এবং গুহ ঘারের মধ্যবর্তী স্থানে (Perineum) হুচী বিধাইয়া ছিদ্র করার ভাব অশুভূত হওয়া।

মূত্রযন্ত্র । মূত্রমালী দিয়া ধাতু নিঃসরণ।

জননেন্দ্রিয় । পুরুষাদি খাড়া হয় এবং স্ত্রীসহবাস সম্বন্ধে মনে নানা প্রকারের কার্মনিক ভাবের উদয় হয়, কিন্তু স্ত্রী সহবাসের ইচ্ছা হয় না; পুরুষাদি এবং ডাইন অণ্ডকোষে চুলকানি এবং হুচী বিধানের ভ্রায় অশুভূত হয়, যাহা পশ্চাৎ দিক হইতে সম্মুখদিকে বিস্তৃত হয়।

পৃষ্ঠদেশ । বিশ্রাম কালীনও মেকুদণ্ডে খেঁতলিয়া যাওয়া বা মোচড়াইয়া পড়ার ভ্রায় বেদনা।

শ্বাসযন্ত্র । বুকে আঁটা বোধ এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে মনের অত্যন্ত উদ্বিগ্ন এবং শ্বাস কষ্ট; বুকে হুচী বিধানের ভ্রায় বেদনা, সামান্ত, নড়া চড়া অথবা শ্বাস প্রস্থাসে বাহার বৃদ্ধি হয় (ব্রাই, ক্যালী-কার্ক); বিছানায় শয়নাবস্থায়, নড়াচড়াতে এবং বাহি উপরদিকে উঠাইলে শ্বাস কষ্ট এবং নিশ্বাস বদ্ধ হওয়ার উপক্রম হয়, বাহার দরুণ রোগী ডাইন পার্শ্বে বা মাথা উঁচু করিয়া শয়ন করিয়া থাকিতে বাধ্য হয়।

হৃৎপিণ্ড এবং নাড়ী । হৃৎস্পন্দন (ক্যাক্ট, ক্যাল্-ক-কার্ক); প্রবল হৃৎস্পন্দন যাহা অন্তলোকেও দেখিতে পায় এবং বাহার শব্দ রোগীর নিকটবর্তী লোকে শুনিতে পায় (মোনয়েন্, ক্যালী-নাইট্রিক্, থুজা, বিরেট্-আল্‌ব); প্রাতঃকালে ঘুম ভাঙ্গিবার পর বিছানায় বসিয়া সম্মুখ পানে হেলিয়া পড়িলে হৃৎস্পন্দন; দীর্ঘ নিশ্বাসে বা নিশ্বাস বদ্ধ করিলে হৃৎস্পন্দন; হৃৎস্পন্দন এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে বুকে অত্যন্ত কষ্টমূল্যব (একন্, গাল্‌ফ, বিরেট্-আল্‌ব); হৃৎপিণ্ডে হুচী বিধানের ভ্রায় যাতনা (আর্বিকা, আক্টি-পিয়াস, ক্যাক্ট, ব্রাই, ক্যালী-কার্ক) এবং কখন কখন নাড়ীতেও এক সময়ে এইরূপ অশুভূত হয়; স্নায়বিক হৃৎস্পন্দন এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে নাড়ী স্পন্দন; নাড়ী দুর্বল, কম্পান এবং অনিয়মিতরূপে স্পন্দন করে।

অঙ্গপ্রত্যঙ্গ । হাত ইত্যাদি উর্দ্ধাধার কম্পন; অঙ্গ প্রত্যঙ্গ

এবং সন্ধিতে কসিরা ধরা বা ছিঁড়িয়া ফেলার তার বেদনা (ব্রাই, লেডাম) ; চলিবার সময়ই অঙ্গ প্রত্যঙ্গ অধিক আক্রান্ত হয় ।

নিদ্রা । অস্থির নিদ্রা এবং বারবার ঘুম ভাঙ্গিয়া যাওয়া ; এলো মেলো স্বপ্ন দেখা এবং যাহার দরুন রোগী জাগিয়া পড়িয়া অত্যন্ত শ্রান্তি অনুভব করে এবং জাগিলে স্বপ্ন বিষয়ে কিছুই স্মরণ থাকে না ।

জ্বর । সামান্য নড়া চড়াতেই শীতবোধ ; প্রাতঃকালে ঘুম ভাঙ্গি লেই শীতবোধ ; হাতে চট্‌চটিয়া ঘর্ম্ম ।

ব্যবহার । মুখমণ্ডলের এবং মস্তকের ট্রিজিমিনাট বা ট্রাইফেসিয়াল্ (Trigemini or Trifacial) নামক বৃহৎ স্নায়ুশূল এবং হৃৎপিণ্ডের বাত জনিত বেদনা এবং হৃৎ স্নায়ুশূল ; হৃৎপিণ্ডের যান্ত্রিক অস্থখ ; বাতাক্রান্ত চক্ষু প্রদাহ ; কৃমি জনিত রোগ ইত্যাদি রোগে স্পাইজেলিয়া ব্যবহার্য্য ।

বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ । স্পর্শ করিলে বা ঝাকি লাগিলে আক্রান্ত স্থানে অত্যন্ত বেদনার উদ্বেক হয় ; অত্যন্ত দুর্বলতা, যাহা প্রাতঃকালেই অধিক অনুভূত হয় ; রক্তান্নতা ধাতুবিশিষ্ট দুর্বল রোগী এবং গণ্ডমালা ধাতুবিশিষ্ট বালক বালিকাগণ যাহাদের কৃমির ধাতু থাকে, তাহাদিগের পক্ষে বিশেষ উপযোগী ; নড়া চড়া, গোলমাল, নিশ্বাসে, স্পর্শনে, চক্ষু ঘুরাইলে অস্থখের বৃদ্ধি ইত্যাদি স্পাইজেলিয়ার বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ মধ্যে পরিগণিত ।

সমগুণ বিশিষ্ট ঔষধ । স্পাইজেলিয়ার কার্যের সঙ্গে একোনাটের কার্যের বিশেষ সাদৃশ্য আছে । কৃমি রোগে ইহার কার্যের সঙ্গে সিনার কার্যের বিশেষ সঙ্গ আছে । ডাক্তার গারেসি (Dr. Guernsey) বলেন সে, নাভি প্রদেশে বেদনা এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে হৃৎস্পন্দন স্পাইজেলিয়ার এক বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ মধ্যে পরিগণিত । এতদ্ভিন্ন ইহার কার্যের সঙ্গে কোন কোন বিষয়ে বেলাডোনা, ব্রাইওনিয়া, ক্যালেকেরিয়া কার্ক, সিমিসিফিউগা, ডিজিটালিস, কালী-কার্ক, লরোসিরেনাস্, লাইকোপডিয়াস্, মার্কিউরিয়াস্, ফফরাস্, পাল্‌সেটিল্লা, রাস্-টক্স, দিগিয়া, সাল্‌ফার এবং জিঙ্কামের কার্যের সাদৃশ্য আছে ।

প্রতিষেধক ঔষধ । অরাস্, ককিউনাস্, ক্যাম্ফার, পাল্‌সেটিল্লা ।

ডাইলুশন বিচার । মায়ুলে ১২ বা ৩০ ডাইলুশন ব্যবহার্য ।
 হৃৎপিণ্ডের অন্তর্থে ১ম হইতে ৬ষ্ঠ ডাইলুশন উপকারী । হানিমানের মতে
 ৩০ ডাইলুশন বিশেষ উপকারী ।

স্পঞ্জিয়া টোকা,—স্পঞ্জ

(SPONGIA TOSTA,—SPONG)

কোন এক বিখ্যাত হোমিওপ্যাথিক ঔষধালয় হইতে স্পঞ্জের আদত গুঁড়া
 ক্রয় করিয়া উচাতে যথা নিয়মে মূগার অবনিক্ মিশাইয়া ৩য় শততমিক
 ক্রম পর্য্যন্ত গুঁড়া প্রস্তুত হইয়া থাকে । ৩য় শততমিক ক্রমের গুঁড়া হইতে
 যথা নিয়মে ৪র্থ শততমিক ক্রমের আরোক প্রস্তুত হইয়া থাকে । আবার
 আদত স্পঞ্জ যথা নিয়মে ২০° ডিগ্রী ওবারপ্রফ্ স্পিরিটে মিশাইয়া মূল
 আরোকও প্রস্তুত হইতে পারে ।

সাধারণ ক্রিয়া । কণ্ঠনালী, বায়ুনল, থাইরয়েড্ গ্রন্থি (Thyroid
 Gland), হৃৎপিণ্ড এবং অণ্ডকোষের উপর ইহার বিশেষ কার্য্য দেখিতে
 পাওয়া যায়, যাহার দক্ষণ উক্ত যন্ত্র উত্তেজিত, প্রদাহযুক্ত ও ক্ষীত হয়
 এবং কখন কখন উহাতে ফাইব্রিন (Fibrin) নামক পদার্থের সঞ্চার হয় ।
 গ্রন্থির বিবৃদ্ধি ও কঠিনতা এবং কণ্ঠনালী ও বায়ুনলের প্রদাহ উৎপাদন
 করা বিষয়ে ইহার কার্য্য অনেকটা অ্যাগোডিনের জায় ।

সাধারণ প্রাকৃতিক লক্ষণ ।

মন । গান করিবার অনিবার্য্য ইচ্ছা এবং উচ্চর সঙ্গে সঙ্গে মনের
 ক্ষুধা বা আনন্দ ।

মস্তক । বহির্বাযু হইতে উষ্ণ ঘরে গেলে মস্তিষ্কের ডাইন পার্শ্ব
 মূল্যে বেদনা ; কপালের বাম পার্শ্ব হঠাৎ বিধানের জায় প্রথম বেদনা ;
 মাথার রক্তাধিক্য বা রক্তাবরোধ (একন্, বেল্) ।

নাসিকা । তরল সর্দি এবং নাক দিয়া প্রচুর পরিমাণে জলবন্তরল

গ্লেস্মা নির্গমন ও উহার সঙ্গে সঙ্গে অনবরত হাঁচি সেওয়া (একন্, সিপা) ; শুষ্ক সর্দি এবং তদ্রূপ নাক বন্ধ হইয়া থাকা (আলাম, নাক্স-বন্, সিগিয়া, সাইগিসি) ।

মুখমণ্ডল । মুখমণ্ডল টল্টলে, ক্ষীত, লাগবর্ণ অথবা নীলের আভাযুক্ত এবং অত্যন্ত যাতনার চিহ্নযুক্ত ।

মুখগহ্বর । হর্রাহির নিম্নস্থিত গ্রন্থির (Sub-maxillary glands) ক্ষীতি ।

গলার মধ্য । থাইরয়েড্ গ্রন্থি (Thyroid gland) ক্ষীতি এবং কঠিনত (আয়োড) এবং তদ্রূপ রাত্রিতে নিশ্বাস বন্ধ হওয়ার উপক্রম হওয়া ; গলার মধ্যে স্থচী বিধানের স্রাব বেদনা ।

পাকস্থলী । ক্ষুধার অত্যন্ত বৃদ্ধি ; মুখে তিক্ত স্বাদ (আস্, ব্রাই, নাক্স-বন্, পাল্) বাহা গলার মধ্যই অধিক অনুভূত হয় ।

মূত্রযন্ত্র । বারবার প্রস্রাব করার ইচ্ছা বা চেষ্টা ।

পুরুষ জনেন্দ্রিয় । অণুকোষের ক্ষীতি এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে উহাতে চাপিয়া ধরার স্রাব বেদনা (ক্রিমিটিস্, রডোড্) ; থেঁতলিয়া গেলে বা মোচড়াইয়া পড়িলে অথবা নিঙ্ড়াইলে যেৰূপ হয়, অণুকোষে সেরূপ কষ্টদায়ক চিন্চনে বেদনা (একন্, আর্জেন্ট্-নাইট্রিক্, রডোড্) ; অণুকোষ হইতে শুক্র নিঃসারক সূত্র (Spermatic Cord) পর্যন্ত স্থচী বিধানের স্রাব বেদনা বা যাতনা (ক্রিমিটিস্) ; শুক্র নিঃসারক সূত্র ক্ষীত এবং অত্যন্ত বেদনায়ুক্ত হয় ।

শ্বাসযন্ত্র । শ্বসভঙ্গ ; শ্বস কাটিয়া যার অর্থাৎ কথা বলিতে বলিতে শ্বস বন্ধ হয় ; বায়ুনের উপরিভাগে অত্যন্ত শুষ্কবোধ ; স্পর্শ করিলে বায়ুনের উপরিভাগে বেদনার উদ্রেক হয় (একন্, ল্যাক্) ; মাথা ঘুরাইলে বা ফিরাইলে কণ্ঠনালীতে বেদনা ; কণ্ঠনালী, বৃহৎ এবং ক্ষুদ্র বায়ুনের প্রদাহ ; কণ্ঠনালীর আক্ষেপ (Laryngismus Stridulus) ; ডেলার স্রাব কোন একটা পদার্থ লাগিয়া থাকিলে যেৰূপ হয়, কণ্ঠনালীতে সেরূপ বাধ বাধ বোধ এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে নিশ্বাস প্রস্রাসের ব্যাঘাত ; বুকের নিম্ন প্রদেশে বেদনা বা টাটানি এবং অনবরত কাশি, বুকের উক্ত প্রদেশ হইতে

বাহার উদ্রেক হয়; খেউ খেউ শব্দ বিশিষ্ট শুষ্ক কাশি (বেল্); যুঁড়ীর জ্বর গভীর বা সাঁই সাঁই শব্দ বিশিষ্ট এবং হাঁপানির জ্বর কাশি; দিবা রাত্রি শুষ্ক কাশি এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে বুকের মধ্যে জ্বালাহুতব; মাথা নিচু করিয়া শয়ন করিলে, অত্যন্ত উষ্ণ ঘরে, শুষ্ক, ঠাণ্ডা বাতাসে কাশির বৃদ্ধি (একন্, হিপ্-সাল্ফ্) এবং আহার বা পানের পর কাশির উপশম; শ্বাস প্রস্বাসে, সাঁই সাঁই, হিম্ হিম্ এবং করাতে কাঠ চিরার জায় শব্দ হয় ও শ্বাস প্রস্বাসে অত্যন্ত কষ্টাহুতব, নিশ্বাস টানিলে বা শয়ন করিয়া থাকিলে বাহার বৃদ্ধি হয়; গলা দিয়া হরিত্রাবর্ণের চট্ চট্টিয়া আঠা বা কঠিন স্লেয়া নির্গমন; গলা দিয়া লোমুতা স্বায় বিশিষ্ট স্লেয়া নির্গমন; শ্বাস কষ্ট এবং বুকের অত্যন্ত দুর্বলতা, বাহার দ্রুত সমান্ত শারীরিক পরিশ্রম করিলেই রোগী কণ্ঠ বলিতে অত্যন্ত কষ্ট অহুতব করে (হিপ্-সাল্ফ্, ঠানাম্); শ্বাস রুদ্ধ হওয়ার উপক্রম হইয়া রোগীর ঘুম ভাঙ্গিয়া যাওয়া; কাশিবার সময় বুক এবং বায়ুনলে জ্বালা এবং টাটানি এবং গলার মধ্যে ছাল উঠিয়া যাওয়ার জ্বর অহুত হয়; এক-খানি শুকনা স্পঞ্জের মধ্য দিয়া নিশ্বাস প্রস্বাসে যেকোন অহুত হয়, নিশ্বাস প্রস্বাসে সেক্রপ অহুত হয়; পুরাতন আকাবেব কাশি এবং কাশিতে গলা দিয়া কঠিন ক্ষুদ্র স্ফোটক নির্গত হয়; গলা দিয়া প্রচুর পরিমাণে স্লেয়া নির্গমন; রোগী শয়ন করিয়া থাকিতে পারে না; ফুফুস-প্রদাহের সারিরা যাওয়ার অবস্থা; বাম ফুফুসের স্ফোটক রোগ (Tuberculosis) বাহা ফুফুসের উপরিভাগে আরম্ভ হয়।

হৃৎপিণ্ড এবং নাড়ী। প্রবল হৃৎস্পন্দন (একন্, আস্, বেল্, লাইকোপাস্, স্পাইজেল্, সাল্ফ্) এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে বৃক্ বেদনা এবং শ্বাস প্রস্বাসে বাঁধ বাঁধ বোধ হওয়া; রাত্রি ছই প্রহরের সময় শ্বাস বদ্ধ হইয়া ঘুম ভাঙ্গিয়া যাইয়া রোগীর অত্যন্ত যাতনার তাবের উদ্রেক হয়। নাড়ী পূর্ণ, কঠিন এবং দ্রুতগামী (একন্, বেল্, বিয়েট্-বিরাইড্); জংগ্রাস্ শূল (Angina Pectoris); বৃক্ সঙ্কোচক বেদনা; বৃক্, গরম বোধ, শ্বাস রোধ, বৃহৎ তাব এবং প্রচুর ঘর্ম; এরটা (Aorta) নামক বৃহৎ ধমনির প্রদাহ, ক্ষীতি এবং বিলুপ্তি; থাকিয়া থাকিয়া শুষ্ক কাশি, শয়ন করিয়া থাকিলে বাহার বৃদ্ধি হয়; রক্তস্রাবের কিল্লীর বাত জনিত প্রদাহ (Rhe-

matic Endocarditis); হৃৎপিণ্ডের প্রত্যেকবার স্পন্দনের সঙ্গে সোঁ সোঁ শব্দ হয়।

গ্রীবা। গ্রীবা এবং গলার মধ্যের পেশী শক্ত হয় বা উহা নোয়ান যায় না।

অঙ্গ প্রত্যঙ্গ। বাম হৃদের সন্ধির নিকটবর্তী স্থানের পেশীর স্পন্দন; ডাইন হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলীর মাথায় খিল ধরার স্থান বেদনা বা বাতনা, নড়াচড়াতে বাহা সমুদয় অঙ্গুলীতে বিস্তৃত হয়।

জ্বর। শরীর উষ্ণ এবং চর্ম উষ্ণ ও শুষ্ক (একন, আর্স); শরীর উষ্ণ হওয়ার দরুণ অত্যন্ত বাতনা, মুখমণ্ডল লালবর্ণ; সর্বদা কান্দ কান্দ ভাব এবং রোগীকে কোন মতেই সান্তনা করা যায় না; আত্মিক অর বা অরবিকার।

নিদ্রা। সর্বদা নিদ্রার ভাব, চাই তোলা, শরীরের জড়তা বা অবশবোধ, অপরাহ্নেই বাহা অধিক অশুভ হয়; স্বপ্ন দেখিয়া ঘুম ভাঙ্গিয়া যায়।

ব্যবহার। গলগণ্ড (Goitre); ঝুড়ী কাশি (Croup); কণ্ঠনালী প্রদাহ (Laryngitis); কণ্ঠনালীর আক্ষেপ; বারুনল প্রদাহ; যক্ষাকশি; এক শিরার ব্যারাম (Orchitis); পোতায় জল হওয়া বা উহার প্রদাহ (Hydrocele); হৃৎপিণ্ডের যান্ত্রিক অশুথ; হৃদস্তাবরক ঝিল্লীর বাত জনিত প্রদাহ (Rheumatic Endocarditis); এয়র্টা (Aorta) নামক বৃহৎ ধমনির প্রদাহ, ক্ষীতি এবং বিস্তৃতি ইত্যাদি অশুথে স্পঞ্জিয়া ব্যবহার্য। টেষ্টিস (Teste) মতে ইহা হৃদ্যাহাবরক ঝিল্লী প্রদাহ (Pericarditis), হৃৎস্রাবরক ঝিল্লী প্রদাহ (Pleurisy) এবং অস্ত্র বেট ঝিল্লী প্রদাহে (Peritonitis) ব্যবহার্য। ডাক্তার হিউজ্ (Dr. Hughes) বলেন যে, চিকিৎসার ফল দেখিয়া তিনি টেষ্টিস উক্ত মতের পোষকতা করিতে পারেন না।

বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ। সামান্য শারীরিক পরিশ্রমে অত্যন্ত দুর্বলতা এবং শরীরে ভারিবোধ ও উহার সঙ্গে মনের অত্যন্ত উদ্বেগ, বমনোদ্বেগ, মুখমণ্ডল শিটা এবং শ্বাস কষ্ট; শরীরের স্থানে স্থানে দাঁকের স্তার কুড়ী জীলোক এবং বালক বালিকাগণের অশুথ; রাত্রিতে, মাথা

লিহু করিয়া শয়ন করিলে, ঘরের মধ্যে থাকিলে অথবা উচ্চস্থানে উঠিলে
অশ্বখের বৃদ্ধি হয় এবং নীচে নামিতে, আহার এবং পানের পর (কাশির),
সোজা হইয়া শয়ন করিয়া থাকিলে অশ্বখের উপশম ইত্যাদি স্পঞ্জিয়ার
কতকগুলি বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ ।

সমগুণ বিশিষ্ট ঔষধ । স্পঞ্জিয়ার কার্যের সঙ্গে আরোডিন্,
ব্রোমিন্, হিপার সাল্‌ফিউরিস্, ক্যালো-বাইক্রমিকাম্, সেলিনিয়াবের
কার্যের বিশেষ সাদৃশ্য আছে । এতদ্বিন্ন কোন কোন বিষয়ে ইহার কার্যের
সঙ্গে একোনাট্ট, বেলাডোনা, ব্রাইওনিয়া, ক্যাল্‌কেরিয়া-কার্ব্, কোনা-
রাম্, ড্‌সিরা, ইগ্‌নেসিয়া, লাইকোপডিয়াস্, মার্কিউরিয়াস্, নাক্স বমিকা,
কক্ষরাস্, পাল্‌সেটিল্লা, রাস্ টক্স, সিপিয়া, স্পাইজেলিয়া এবং সাল্‌ফারের
কার্যের সাদৃশ্য আছে ।

প্রতিষেধক ঔষধ । ক্যান্‌ফার ।

ডাইলুশন বিচার । ডাক্তার হিউজ্ (Dr. Hughes) বলেন যে,
ষুঃভীকাশি, কণ্ঠনালীর অশ্বখে সমুদয় প্রকারের ডাইলুশনই উপকারী ।
তিনি উক্ত সকল প্রকারের অশ্বখেই ১ম এবং ২য় দশমিক ডাইলুশন ব্যব-
হার করিয়া কল পাইয়া থাকেন । কংপিওর অশ্বখে ১২ হইতে ৩০ ডাইলু-
শন ব্যবহার্য্য । ৬ষ্ঠ ডাইলুশনই আমরা সচরাচর অধিক ব্যবহার করিয়া
থাকি । গলগণ্ড এবং একশিরার পক্ষে ১ম এবং ৩য় দশমিক ক্রমের শুঁড়া
এক প্রেইণ মাত্রায় সেবনে বিশেষ উপকার দর্শে ।

স্ট্যানাম্,-(টিন্),-স্ট্যানাম্

(STANNUM,—(TIN),-STANN.)

কোন এক বিষম হোমিওপ্যাথিক ঔষধান্ন হইতে আদত স্ট্যানাম্ ক্রম
করিয়া উহাতে যথা নিম্নে স্থান অর্জ্‌ মিল্ক শিশাইরা ৩য় শতভাগিক ক্রম
পর্যন্ত শুঁড়া প্রস্তুত হইয়া থাকে । ৩য় শতভাগিক ক্রমের শুঁড়া হইতে যথা
নিম্নে ৪র্থ শতভাগিক ক্রমের আরোক প্রস্তুত হইয়া থাকে ।

সাধারণ ক্রিয়া । মস্তিষ্ক এবং কসেরিকা মজ্জার উপর ইহার কার্য অতি প্রবল, বাহার দক্ষণ গতি উৎপাদনের সহায়কারী বস্ত্রাদির অত্যন্ত বল-
কর, পক্ষাঘাত, আঁকেশ এবং দায়ু শুলের ভ্রায় বেদনা উৎপন্ন হয় । শ্বাস
যন্ত্রের প্ৰৈত্মিক বিস্তার উপরও ইহার কার্য অতি প্রবল, বাহার দক্ষণ উক্ত
বিস্তার প্রদাহযুক্ত হইয়া গলাদিয়া প্রচুর পরিমাণে পূর্ব মিশ্রিত স্লেম্মা নির্গত
হয়, বায়ুনল বিস্তৃত হয় এবং শ্বাস যন্ত্রের দায়ু গুলির অত্যন্ত বলকর হয় ।
হোমিওপ্যাথির আবিষ্কৃত মৃত মহাত্মা ডাক্তার সায়ুয়েল্ হানিমান ষ্টানাম্কে
কুমিনাশক ঔষধ বলিয়া অনেক প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন । তিনি বলিয়া
গিয়াছেন যে, অস্ত্রের মধ্যে কুমি হইলে ষ্টানাম্ সেবনে অস্ত্রের মধ্যে সঞ্চিত
কুমি মরিয়া যায় এবং কোন প্রকার রেচক ঔষধ রোগীকে খাওয়াইলে
মলের সঙ্গে অস্ত্রের মধ্যে সঞ্চিত কুমিগুলি নির্গত হয় । অস্ত্রে কুমি থাকুক
আর না থাকুক যদি পরিপাক কার্ধ্যের সহায়কারী যন্ত্রের অস্থি কুমির লক্ষ-
ণের ভ্রায় লক্ষণাদি বর্তমান থাকে, তবে ষ্টানাম্ দ্বারা বিশেষ উপকার দর্শে ।

সাধারণ প্রাকৃতিক লক্ষণ ।

মন । মনের অত্যন্ত উদ্বিগ্ন এবং অস্থিরতা ; সর্বদা বিষম এবং
নিম্নস্তম্ভাব ও কাঁদিবার স্বভাব (ইয়েস্, নেট্রাম্-মিউর, পাস্, সাস্টক্) ;
চুপে চুপে বক্ বক্ করা ; অনিচ্ছা পূর্বক এবং হঠাৎ প্রেমের উত্তর করা ।

মস্তক । দায়ুশুলের ভ্রায় মাথাধরা বাহা আন্তে আন্তে এবং যত্ন-
ভাবে আরম্ভ হইয়া ক্রমে বৃদ্ধি পাইয়া পুনরায় ক্রমে ক্রমে কমিয়া যায় ;
কপালে চাপা বোধ বাহা মধ্যদেশ হইতে বহির্দেশে বিস্তৃত হয় ; মাথার
উপরিভাগে এবং কপালে আঁটা এবং চাপা বোধ বাহা আন্তে আন্তে বৃদ্ধি
পায় এবং আন্তে কমে ; মাথার সম্মুখ ভাগে চাপিয়া ধরা বা ছিঁড়িয়া
ফেলার ভ্রায় বেদনা ; কপালের বাম পার্শ্ব, কপাল এবং ক্ষুদ্র মস্তিষ্কের
(Cerebellum) মধ্য দিয়া ঝাকি লাগার ভ্রায় অনুভূত হইয়া উক্ত স্থানে
ঘুশ্ ঘুশ্ চাপা বোধ থাকিয়া যায়, বিশ্রাম কালীন বাহার বৃদ্ধি হয় এবং
নড়া চড়াতে বাহার উপশম হয় ; কপালের দুই পার্শ্বে দপ্পলিয়া বেদনা ।

চক্ষু । বাম চক্ষের নাকের নিকট বর্তী কোণে ফোকা বা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র
ব্রণের ভ্রায় ক্ষুদ্র বাহা নেত্র নালীর (Fistula Lachrymalis) ভ্রায় বৃদ্ধি

হয়; আঙনী (Stye) হইলে যে রূপ হয়, বার চক্ষের নাকের নিকটবর্তী কোণে সেরূপ চাপিয়া ধরার জ্বার বেদনা; রাত্রিতে চক্ষুর পাতায় পাতায় আঁটিয়া লাগিয়া থাকে (ক্যাল্‌ক্-কার্ব, লাইকোপ্, মার্ক, সাইলিনিস, ব্রান্-টল, সাল্‌ফ্)।

মুখমণ্ডল । মুখ মণ্ডল শিটা এবং বদিয়া যায়। মুখ মণ্ডল কণ্ঠ ।

মুখ মণ্ডল এবং গলার মধ্য । জিহ্বা হরিদ্রা বর্ণের স্লেমা দ্বারা লেপযুক্ত; মুখে অত্যন্ত হর্ষক (আর্বিফা, হিপ্-সাল্‌ফ্, ক্রিয়াজ্, আয়োড্, নাইট্রিক্-অ্যাস)। গলার মধ্যে গাঢ়, আটাল, ধূসরের আভাযুক্ত, রক্তমিশ্রিত স্লেমার সঞ্চায়; স্লেমা ভুলিবার সময় বমনের উদ্রেক হয়; গলার মধ্যে অত্যন্ত শুকাইয়া এবং ছাল উঠিয়া যাওয়ার জ্বার চড়্‌চড়ানি বা জ্বালাইয়া, গিলিবার সময়ই যাহা অধিক অস্বস্তি হয় (আলাম্, আর্জেন্ট্-নাইট্রিক্, হিপ্-সাল্‌ফ্)।

পাকস্থলী এবং উদর । অত্যন্ত ক্ষুধা, কিন্তু রোগী যথোচিত পরিমাণে খাইতে পারে না (ব্রাই, ফেরাম্, লাইকোপ্); আহারের পর তিক্ত স্বাদ বিশিষ্ট উদার উঠা (ব্রাই, চায়না, নাক্স-বম্), বমনোদ্বেগ, বিশেষতঃ আহারের পর এবং তৎপর পিত্ত বমন (নাক্স-বম্); রক্ত বমন (হ্যামামেলিস্, ওপিয়াম্, নাক্স-বম্, পডোফ্); পাকস্থলীতে ভারি এবং চাপা বোধ এবং স্পর্শনে উহাতে টাটানি; পাকস্থলীতে খিলখরা। উদরে খালি খালি বোধ (ফস্, সিপিরা); উদর স্পর্শনেও টাটায় (এপিস্, ব্রাই, বেল্)।

মল । বারবার বাহ্যের বেগ, কিন্তু বেগ দিলে মল নির্গত হয় না; মলের সঙ্গে ক্রিমি নির্গত হয়; শূল বেদনা এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে মুখমণ্ডল কণ্ঠ ।

জননেন্দ্রিয় । কোন প্রকারের স্বপ্ন না দেখিয়াই পুরুষের অঙ্গাঙ্গে বা অনিচ্ছাপূর্বক ধাতু নিঃসরণ। স্ত্রীলোকের জরায়ু স্থান বৃষ্ট হওয়া (Pro-lapsus uteri) এমন জরায়ু যেন যোনিদ্বার দিয়া সজোরে ঠেঁসিয়া বাহির হইতেছে এরূপ অস্বস্তি হওয়া ।

শ্বাস যন্ত্র । স্বরভঙ্গ এবং কঠিনাণীতে বশ্‌বশে বোধ ও উহার সঙ্গে সঙ্গে বৃকে অত্যন্ত হর্ষকবোধ (কার্বো-বেজ্-ফস্); বারুনলের মধ্যে

অতিরিক্ত পরিমাণে শ্লেষ্মার সঞ্চয় (অ্যান্টি-টার্ট, ইপিফাইক, অস্মিয়ার, ফস্) বাহ্য সামান্য কাশিলেই নির্গত হয়; কাশি এবং তদ্রূপ গলায় মধ্যে টাঁচিয়া ফেলার ভায় অস্বভূত হয় ও উহার সঙ্গে গলা দিয়া সবুজের আভাযুক্ত পদার্থ নির্গত হয় (সাইলিসি); গলা দিয়া দুর্গন্ধযুক্ত, মিষ্টবাদের বিশিষ্ট পদার্থ নির্গমন (ক্যাক্-কার্ক); সন্ধ্যার সময় শয়ন করিবার পূর্বে কাশির বৃদ্ধি; কাশির দরুন বায়ুনল এবং বৃকে টাটানি (কষ্ট, নাক্স-বম্); সন্ধ্যার সময়, বিছানায় শয়ন করিলে, রাত্রি দুই প্রহর পর্যন্ত শুষ্ক কাশি এবং গলা দিয়া অল্প পরিমাণে শ্লেষ্মা নির্গমন; বৃকের দুর্বলতার দরুন স্বরভঙ্গ এবং মুহু স্বর বিশিষ্ট শুষ্ক কাশি; গলা দিয়া হরিদ্রাবর্ণের বিশ্রী স্বাদ বিশিষ্ট শ্লেষ্মা নির্গমন (ক্যাক্-কার্ক); গলা দিয়া ধূসরের আভাযুক্ত শ্লেষ্মা নির্গমন (লাই-কোপ); গলা দিয়া গাঢ় শ্লেষ্মা এবং রক্ত নির্গমন; গলা দিয়া প্রচুর পরিমাণে সবুজের আভাযুক্ত পদার্থ নির্গমন (সাইলিসি); গলা দিয়া পচা, বা মিষ্ট স্বাদবিশিষ্ট (ক্যাক্-কার্ক), অথবা লোন্তা স্বাদবিশিষ্ট পদার্থ নির্গমন (আম্, ক্যাল্-কার্ক, কার্কো-বেজ্, ফস্, সিপিয়া); বৃকের মধ্যে শ্লেষ্মা থাকিলে ঘেদ্রূপ হয়, বৃকের মধ্যে সেদ্রূপ হুঙ্ হুঙ্ করার দরুন অনবরত কুশ্ কুশে কাশি; উচ্চ স্থানে উঠিবার সময় শ্বাস কষ্ট এবং শ্বাস বন্ধ হওয়ার উপক্রম হওয়া (একন্, আমন্-কার্ক, আন্, ক্যাক্-কার্ক, ক্যাক্ট); সামান্য নড়াচড়াতেই শ্বাস কষ্ট বা শ্বাস রুদ্ধ হওয়ার উপক্রম হওয়া; সন্ধ্যার সময় শ্বাসকষ্ট, বাহার দরুন রোগী গায়ের কাপড় ঢল্ ঢলে করিয়া দিতে বাধ্য হয়; বৃকের মধ্যে অত্যন্ত দুর্বল এবং পালিবোধ; আঁটিয়া ধরিলে ঘেদ্রূপ হয়, বৃকের মধ্যে সেদ্রূপ কষ্টান্তব এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে দীর্ঘ নিশ্বাস টানিবার স্বভাব ও মনের অত্যন্ত উদ্বেগ; বৃকের মধ্যে অত্যন্ত টাটানি; বৃকের বাম পার্শ্বে স্থলী বিধানের ভায় বা কর্তনবৎ প্রথম বেদন (ক্যালী-কার্ক, ফস্, সিপিয়া)।

অঙ্গ প্রত্যঙ্গ । বাহ এবং পায় ভারিবোধ ও পক্ষাঘাতের ভায় অত্যন্ত দুর্বল বোধ; সন্ধ্যার সময় হাত পায়ের পাতা ফীত হয়।

ব্যবহার । ফুফুস এবং কণ্ঠনালী সঞ্চয়ী যক্ষাকাল (Pulmonary and Laryngeal Phthisis); বায়ুনল প্রদাহ; রক্তোৎকাশ; বক্ষ শোথ;

পুঁষাদির অতিরিক্ত নিঃসরণের দরুণ জ্বর বা হেক্টিক্ ফিবার (Hectic Fever); পক্ষাঘাত; মৃগী রোগ; হিষ্টিরিয়া; মুখ মণ্ডলে বেদনা বা স্নায়ুশূল; ক্রমি জনিত অম্লধ্ব ইত্যাদি রোগে ঠানাম্ ব্যবহার্য্য।

বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ। অত্যন্ত দুর্বলতা এবং বলহীন, বাহ্যিক দরুণ রোগী অনবরত বসিয়া বা শয়ন করিয়া থাকিতে বাধ্য হয় (সাইলেন্সি); নীচের ঘর হইতে উপরের ঘরে সিঁড়ি ভাঙ্গিয়া উঠিবার সময় মূচ্ছার ভাব; সজোরে কথা বলিলে বা পুস্তকাদি পড়িলে রোগী অত্যন্ত দুর্বল হইয়া পড়ে (ককিউল); বেদনাদি আন্তে আন্তে আরম্ভ হয়, আন্তে আন্তে অত্যন্ত বৃদ্ধি হয় এবং ক্রমে ক্রমে কমিয়া যায়; সমুদয় শরীরে শীত বোধ; প্রাতঃকালে এবং রাত্রিতে প্রচুর পরিমাণে দুর্বলকারক ঘর্ম্ম (চায়না, কস্ম, সাল্‌ফ্‌-আস্‌) বাহ্যতে অত্যন্ত পচা গন্ধ থাকে (নাজ্‌-বস্ম, ঠাকিস্‌; নড়া চড়া, কথা বলা, উচ্চ স্থান হইতে নিম্ন স্থানে নামিতে অম্লধ্বের বৃদ্ধি এবং চলিয়া বেড়াইলে ও চীত হইয়া শয়ন করিলে অম্লধ্বের উপশম ইত্যাদি ঠানামের কতকগুলি প্রধান প্রাকৃতিক লক্ষণ।

সমগুণ বিশিষ্ট ঔষধ। জ্বীলোকের জরায়ুর অম্লধ্বে ঠানামের কার্য্য অনেকটা সিপিয়ার কার্য্যের স্তায়। জরায়ুর উপর ইহার কার্য্য অনেকটা আর্জেন্টাম্, কুপ্রাম্ এবং জিঙ্কামের স্তায়। এতদ্ভিন্ন কোন কোন বিষয়ে ইহার কার্য্য আদিনিফ, বেলাডোনা, ব্রাইওনিয়া, ক্যাল্‌কেরিয়া কার্ণ, কষ্টিকাম্, চায়না, হেলিবোরাস্, লাইকোপডিয়াম্, পাল্‌সেটিলা, স্ককরাস্, রাস্‌-টল্‌, স্পাইক্সিলেয়া এবং সাল্‌ফারের কার্য্যের স্তায়।

প্রতিষেধক ঔষধ। পাল্‌সেটিলা।

ডাইলুশন বিচার। হানিমানের মতে এই ঔষধের ৩য় ক্রমের গুঁড়াতেই যথোচিত ফল পাওয়া যায়। ডাক্তার হিউজ্ (Dr. Hughes), ডাক্তার বেজ্ (Dr. Bayes) এবং ডাক্তার ড্রুরি (Dr. Drury) মতে ১২ এবং ৩০ ডাইলুশন অধিক উপকারী। মৃগি, হিষ্টিরিয়া এবং কাশিতে ৩য় দশমিক ক্রমের গুঁড়া এবং জরায়ুর অম্লধ্বে ৬, ১২ এবং ৩০ ডাইলুশন ব্যবহার করিয়া লেখক যথোচিত ফল পাইয়া থাকেন।

ষ্ট্রামোনিয়াম, -(ধূতুরা),-ষ্ট্রামন

(STRAMONIUM,—STRAM.)

ধূতুরাগাছ বোধ হয় এতদ্দেশে সকল লোকেই জানেন। ইহা পৃথিবীর
প্রায় সমুদয় স্থানেই জন্মে। এই গাছের পাতা, ডাঁটা ইত্যাদি সমুদয় অংশই
এক স্পিরিটে ভিজাইয়া মূল আরোক প্রস্তুত হইয়া থাকে।

সাধারণ ক্রিয়া। মস্তিষ্কের উপর ইহার কার্য অতি প্রবল।
ইহা মস্তিষ্কে চঞ্চল করিয়া উহার কার্য করার শক্তিকে বিকৃত করে,
যাহার দরুণ বমনোদ্বেগ, প্রলাপ এবং নানা প্রকারের কাল্পনিক বিকটাকার
দেখা ইত্যাদি বেলাডোনা এবং হায়োসায়েনাসের স্থায় মস্তিষ্ক আক্রান্ত
হওয়ার কতকগুলি লক্ষণ প্রকাশ পায়। ইহার প্রলাপ বেলাডোনা
বা হায়োসায়েনাসের প্রলাপ অপেক্ষা অধিক প্রখর বা উগ্র হয়; ষ্ট্রামো-
নিয়ামের প্রলাপ এবং উন্মত্ততা বেলাডোনা এবং হায়োসায়েনাস অপেক্ষা
অধিক উগ্র বা প্রবল। মস্তিষ্কে রক্তাধিক্য বা রক্তাবরোধ করা সম্বন্ধে
ইহার ক্ষমতা হায়োসায়েনাস অপেক্ষা অধিক প্রবল বা উগ্র বটে, কিন্তু উহা
বেলাডোনা অপেক্ষা অনেক কম প্রবল বা উগ্র। ইহা মস্তিষ্কের প্রস্তুত
প্রদাহ উৎপাদন করিতে পারে না। ইহা গলার মধ্যে এবং চৰ্ম্মের
উপর আরক্ত অরের ফুসুড়ীর স্থায় আঙনের স্থায় লাল ফুসুড়ী উৎপাদন
করে। মস্তিষ্কের উত্তেজনা হেতুই ইহা শব্দের অত্যন্ত অংশের উপর
কার্য্য করিয়া থাকে। উক্ত প্রকারের কার্য্যের দরুণ চক্ষুর তারা বিকৃত
হয়, শব্দবোধ সমুদয় অংশের স্পর্শ জ্ঞান শক্তির হ্রাস হয়, বিশেষ বিশেষ
ইন্দ্রিয় বিকৃত হয়, আক্ষেপ (Convulsions), স্ত্রী বা পুরুষ সহবাসের অত্যন্ত
ইচ্ছা, মূত্রাবরোধ ইত্যাদি লক্ষণ গুলি প্রকাশ পায়।

সাধারণ প্রাকৃতিক লক্ষণ।

মন। উগ্র প্রলাপ (বেল্, ক্যাছ্); অত্যন্ত ভয় (বেল্, বিয়েট্-
আল্‌ব্); সর্বদা পলায়ন করার চেষ্টা; বিছানা হইতে উঠিয়া বাগয়ার
চেষ্টা (বেল্); অনবরত অসংলগ্ন কথা বলা; হাসি (হায়োস্); মানসিক

এবং শারীরিক শক্তির অত্যন্ত হ্রাসগতা এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে কোন ক্ষুদ্র ভ্রব্য ভুলিয়া বা কুড়াইয়া তোলার ভাব বাহ্য মৃত্যুর কতকক্ষণ পূর্বেই সচরাচর অধিক দেখিতে পাওয়া যায় (বেল, হারোস্); জী বা পুরুষ সহবাসের অত্যন্ত ইচ্ছা; বিদেশীয় ভাষায় কথা বলা; উন্মত্ততা; আলোক দেখা এবং অন্ধ লোকের নিকট থাকিবার ইচ্ছা (ক্রিগাক্স, হারোস্); সময়ে সময়ে রাগান্বিত হইয়া লোককে মারা বা মারিবার চেষ্টা করা; সর্বদা অহঙ্কারের ভাব এবং একগোঁসামী (প্রাটিনা, ল্যাক্স); চীৎকার করা, কামড়াণ এবং নখ দ্বারা আচ্ড়ান; ভ্রমখাওয়া; উল্লাসিত এবং সন্তোষের ভাব, গান করা এবং নাচা (ক্রোকাস্); ভ্রম দেখা (আনাকার্ড, হারোস্, ক্যানাবিস্-ইণ্ড), বাহ্য দৰুণ-রোগী অত্যন্ত ভয় খায় (আবিসিহ্); বিকট আকার দেখা, অপরিচিত লোকের মুখ বা আকৃতি দেখা, অথবা রোগী মনে করে যেন ভয়ানক জন্তুগুলি তাহার পার্শ্বের দিকে লাফাইতেছে, অথবা তাহার দিকে দৌড়িয়া আসিতেছে, বাহ্য দৰুণ সে অত্যন্ত কাতুল হয়; জলাতক (Hydrophobia) (বেল, হারোস্); জল বা জলীয় পদার্থ পানে অনিচ্ছা বা ভয়; জল, আয়না, বা কোন প্রকারের চক্চকে ভ্রব্য দেখিলেই আক্ষেপের (Convulsions) উদ্বেগ হয়; গলার মধ্যের আক্ষেপিক সঙ্কোচন; ভয় খাইয়া পেণ্টীর অনিচ্ছা পূর্বক স্পন্দন বা কোরিয়া (Chorea); মৃগীরোগ; উন্মত্ততা; শুষ্ক বায়ু (Mealancholia); সমুদয় ইন্দ্রিয়ের জড়তা বা উহার ভীকৃত্যাহিতা; পর্যায়ক্রমে উল্লাস এবং বিষম ভাব; সকল লোক এবং সকল বিষয়ে উদাসীনতা (বার্কেরিস্, কস্, কস্-আস্); রোগীর (ছোট বালক বা বালিকা) ঘুম ভাঙ্গার পর সে প্রথম যে বস্তু সম্মুখে দেখে সে তাহাতেই ভয় খায় (বেল) এবং উক্ত বস্তু হইতে দৌড়িয়া পলায়ন করিতে চাহে; অজ্ঞাতসারে নাক দিয়া গৌ গৌ শব্দ করা; মাড়ি নিরদিগে ঝুলিয়া পড়ে; হাত এবং পায়ে পাতায় স্পন্দন; চক্ষুর তারি বিস্তৃত (ওপিয়াম্); স্মরণ শক্তির হ্রাসগতা বা হ্রাস (আনাকার্ড, ক্রিগাক্স, ল্যাক্স, মাক্স, নেট্রাম্-মিউর); মনে যে ভাবের উদয় হয় কথা বলিতে বলিতে তাহা ভুলিয়া যাওয়া; রোগী কোন বস্তুই একত নাম বলিতে পারে না।

অন্তক ৷ মাথাধোরা, যাহার দরুণ রোগী অন্ধকারে চলিতে পারে না এবং চলিতে চলিতে বাম বা পশ্চাৎদিকে তুলিয়া পড়ে (বেল); মধ্য পান করিলে মেরুণ হয়, মাথা মেরুণ টলে (আগারিকাশ); মস্তিকে প্রবল রক্তাধিক্য বা রক্তাবরোধ (বেল); মাথার উষ্ণাভাব; মাথার উপরিভাগ এবং কপালে দপ দপানি; মুচ্ছা; দৃষ্টি এবং শ্রবণশক্তির বিনাশ; মুখমণ্ডল ক্ষীত এবং টল্টলে; মাথার আক্কেপিক সঞ্চালন, বিশেষতঃ ডাইন দিকে বায়ুহার মাথা উঠান; অবসন্নতা এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে দৃষ্টি এবং শ্রবণ শক্তির বিনাশ ও অচেতনতা (হারোস্, ওপিয়াম্); মাথার পাতলা বোধ; কাকিমিয়া বালিস হইতে মাথা তুলিয়া পশ্চাৎদিকে ছাড়িয়া দেওয়া; মস্তিকের শোত এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে মাথার আক্কেপিক সঞ্চালন; বাতাক্রান্ত শিরঃসীড়া ।

চক্ষু । চক্ষু বিজ্ঞতরূপে ধোলা, স্থিরভাবে বিশিষ্ট এবং বহির্দিকে আকৃষ্ট (আমিল্, নাইটেট্, নেজ্, বেল্, হারোস্, ওপিয়াম্), উজ্জল এবং বিকৃত; চক্ষুর তারা বিজ্ঞত (বেল্, হারোস্, ওপিয়াম্) এবং কখন কখন অচল এবং উহাতে আলোক জ্ঞান থাকে না (সিকুটা, ডিজিট্); চক্ষুর দোষক ঝিল্লী কালচে লাল বর্ণ, যাহার দরুণ মনে হয় যেন চক্ষের রক্ত বহা নালীগুলি ময়লা তরল পদার্থ দ্বারা পরিপূর্ণ; সম্পূর্ণ অন্ধতা, অথবা ক্ষণিক অন্ধতা; আলোক চক্ষে লাগে বা সহ্য হয় না; রোগী আলোক দেখিলে পলায়ন করে; উজ্জল আলোক অথবা চক্চকে পদার্থ দেখিলেই আক্কেপের উদ্রেক হয় ।

কর্ণ । কানে কম শুনা ।

মুখমণ্ডল । মুখমণ্ডল উষ্ণ, লালবর্ণ এবং শোথের ভাৱ টল্টলে ও ক্ষীত (একন্, বেল্, ওপিয়াম্); চক্ষু পাগলের ভাৱ; মুখাকৃতি ভয় উৎপাদক; মুখমণ্ডলের পেশীর স্পন্দন (আগারিকাশ্, আণ্টি-টার্ট্, সিকুটা, ইগনেস্); কপাল কোঁচকান; মনে হয় যেন মুখমণ্ডল বাতাবিক অপেক্ষা লম্বা হইয়াছে; মুখমণ্ডলের এক পার্শ্বের বিসর্প (Erysipelas) এবং উহার সঙ্গে মস্তিকাবরক ঝিল্লী প্রদাহ (Meningitis); পর্যায়ক্রমে পক্ষাঘাত এবং আক্কেপের লক্ষণাদি প্রকাশ পায়; মুখমণ্ডলের আয়ুশূল; বাতনার দরুণ

রোগী পাংলের ভায় হয় ; সমুদ্র শরীরের মধ্য দিয়া আক্কেপিক ঝাকি বা ঝাকা লাগা ; রোগী বাহ উপরের দিকে ছোড়ে ; কপালের চর্ম কৌচকান ।

মুখগহ্বর এবং গলার মধ্য । জিহ্বা ক্ষীত, শক্ত, শুক এবং অতিকষ্টে সঞ্চালন করা যায় ; তৌত্‌লার ভায় কথা বলা (কষ্ট্, ক্যানাবিস্-ইন্, সেলেন্), অথবা কথা বলিতে একবারে অশক্তি (হায়োস্) ; মুখগহ্বর এবং উহার পশ্চাত্তাগে অত্যন্ত শুকাইতব ; মুখদিয়া চক্‌চকে লাল বহিরা পড়ে ; দাঁতে দাঁতে কড়মড় শব্দ করা ; মুখে রক্তমিশ্রিত ফেণা উঠে (আর্স্, সিকেল্) । গলার মধ্যের শুকতা এবং উহার আক্কেপিক সঙ্কোচনের দরুণ গিলিতে অশক্তি (বেল্, হায়োস্, লরোস্, প্রায়াস্, বিরেট্-আর্) ; গলার মধ্যে অত্যন্ত শুক বোধ (এপিস্, নাস্-মক্, রাস্-টক্) ।

পাকস্থলী এবং উদর । প্রবল শিপাসা এবং টক জ্বা পানের ইচ্ছা (আণ্টি টার্, চারনা, কস্, বিরেট্-আর্) ; হিকা ; বমনোদ্বগ্গ ; বমন ; বক্ষ এবং উদর কোটরের মধ্যবর্তী গোল পেশীর প্রদাহ (Diaphragmatitis) ; প্রলাপ ; ডায়েফ্রামে আগা গোড়া জ্বালাইতব ; বাস প্রবাস ঘন ঘন ; আক্কেপ ; জল পান করিতে মিলে জল পান করিতে চাহে না ; সকল প্রকারের দ্রব্যেই বাসের ভায় স্বাদ । উদর ক্ষীত এবং বিজ্জ্‌ত, কিছু কষ্ট্রন নহে ; উদরে বেদনা, বাহার দরুণ মনে হয় যেন কেহ নাভি সম্বন্ধে টানিয়া বাহির করিতেছে ; শূল বেদনা এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে শীত কম্প ।

মল এবং মূত্র । মল, মুত্রাবরোধ ; শিশুগণের ওলাউঠা ; দুর্বল-মুক্ত মল ভেদ ; টেরা চক্‌ তাকান ; ভয় খাইয়া রোগীর ঘুম ভাঙ্গিয়া যায় ; মুখমণ্ডল শিটা বা ফিকা ; কোষ্ঠবদ্ধ ; মূত্র আন্তে আন্তে মূত্রভাবে নির্গত হয় (একস্, কষ্ট্) ; অগাড়ে বা অনিচ্ছাপূর্বক মূত্র নির্গমন (আর্স্, বেল্, সিকুটা, হায়োস্, ওপিরাম্) ; হস্তমৈথুন, বাহার দরুণ মূগীরোগ হয় ।

জননেন্দ্রিয় । জীলোকের পুরুষ সহবাস এবং পুরুষের জীলহ-বাসের অত্যন্ত ইচ্ছা ; জীলোকের কানোন্মত্ততা (ক্যাহ্, চারনা, প্রাটিনা) । অরাস্ হইতে অতিরিক্ত রক্তস্রাব এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে এই ঔষধের মন লব্ধীয় প্রাকৃতিক লক্ষণ বর্তমান থাকে ।

বাস যন্ত্র । বরভঙ্গ বা স্বর সাঁই সাঁই শব্দ বিশিষ্ট, উচ্চ, চিকণ,

টিটি শব্দ বিশিষ্ট এবং অস্পষ্ট ; মাতাল দিগের কাশি ; শ্বাস প্রশ্বাস ঘন ঘন এবং কষ্টকর ; বুকের সঙ্কোচন হেতু শ্বাসরোধ হওয়ার উপক্রম হওয়া (আসফিটিডা, ইগ্‌নেস্) ; বুকে লাল ফুসুড়ী ; মোহক জ্বর ।

হৃৎপিণ্ড এবং নাড়ী । হৃৎস্পন্দন (একন্, বেল্, স্পাইজেল্) ; নাড়ী দ্রুতগামী, পূর্ণ ও প্রবল ; কোমল, মুহুগতি বিশিষ্ট ও দ্রুতগামী ।

অঙ্গ প্রত্যঙ্গ । বাহু এবং হাতের আক্ষেপিক সঞ্চালন ; বিছানার কাপড়াদি তোকান (খোঁটা) এবং সার্বজনিক অবসরতা ; আঙ্গুল হাড়া বা নখকোণী এবং উহাতে অসহ্য বেদনা ; আক্রান্ত স্থানে পূর্ব হইলে উহার ঘর্ষণাদির এই ঔষধে উপশম হয় ; হাত পায়ের স্পন্দন বা ঝাকনি (বেল্, হায়োস্) ; পেশীর অগ্রভাগের স্পন্দন বা ঝাকনি (হায়োস্, ক্যালী-আরোড্) ; অঙ্গ প্রত্যঙ্গের কাঁপনি (ককিউল্, কোনায়াম্, জেল্‌স্, মার্ক্) ; অঙ্গ প্রত্যঙ্গ অসাড় হয় ; উরুর মধ্যদেশ ক্ষীত এবং লালবর্ণ ।

চর্ম । সমুদয় শরীরে উজ্জ্বল লালবর্ণের ফুসুড়ী (এপিস্, এরাম্, বেল্, রাস্‌টক্স্) ।

নিদ্রা । ঘুমেরধোরে মাকে গোঁ গোঁ শব্দ হওয়া ; গভীর নিদ্রা (লরোস্, ওপিয়াম্) ; অস্থির নিদ্রা ও বিছানায় বারবার এপাশ ওপাশ করিয়া ছট্‌ফট্‌ করা এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে চীৎকার করা ও শরীরের স্পন্দন ; নিদ্রার ইচ্ছা বা ক্ষিমান, কিন্তু নিদ্রা ভাল হয় না (বেল্, ল্যাক্, ওপিয়াম্) ; চীৎ হইয়া চক্ষু খোলা রাখিয়া এক দৃষ্টে তাকাইয়া ঘুমান (ওপি-রাম্) ; ভয় থাকিলে যেকপ হয়, ঘুম ভাঙ্গিলে সেকপ জড়নড় হওয়া ।

জ্বর । সমুদয় শরীর, বিশেষতঃ অঙ্গ প্রত্যঙ্গ, শীতল ; শীতলাবস্থায় মাথা উষ্ণ ; রোগী গায় কাপড় রাখিতে চাহে না ; মুখমণ্ডল উষ্ণ এবং লালবর্ণ এবং পায়ের পাতা ঠাণ্ডা ; প্রবল জ্বর ; চর্ম শুষ্ক এবং আঙ্গুলের শ্বাস প্রস্রব, বিশেষতঃ মাথা এবং মুখমণ্ডল (বেল্) ; সমুদয় শরীরে শীতল ঘর্ম (আন্টি-টার্ট্, আর্স্, কুপ্রাস্, ডিজিট্, বিরেট্-আব্) ; শিশু এবং ছোট বালক বালিকাগণের জ্বর ; ঘুমেরধোরে কাঁদিয়া উঠা ; ঘুমেরধোরে চমকিয়া উঠা বা শরীরের ঝাকনি ; চক্ষু মর্দ্ব খোলা থাকা ; চক্ষুর তারা বড় ও বিস্তৃত ; মূত্রাবরোধ ।

ব্যবহার । প্রবল তরুণ উদ্ভূততা ; মনোমুগ্ধতা (Delirium Tremens) ; জলাতক (Hydrophobia) ; জ্বীলোকের কানোমুগ্ধতা (Nymphomania) ; আক্ষেপ বা কন্‌বাল্‌সন্স ; মৃগীরোগ ; কোরিয়া (Chorea) ; হিষ্টিরিয়া ; চেতনাশূন্য আক্ষেপ ; ভয় খাইয়া আক্ষেপিক অশুখ ; গুল্মহাবের ঠিক উপরিভাগের হাড়ে বেদনা ; পক্ষাঘাত ; পারার (Mercury) দ্ব্য-শরীরে প্রবেশ করার দরুণ অশুখ ; আরক্তজ্বর ; হাম জ্বর ; গার কোন প্রকারের স্ফোটক রোগের স্ফোটক বসিয়া যাওয়া ; হৃৎক কক্ষ ; আরক্ত জ্বরের পর শোথ ; পোড়া ঘা, আঙ্গুল হাড়া বা নখকোণী ইত্যাদি অস্থি-ট্র্যামোনিয়াম ব্যবহার্য্য ।

বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ । প্রায় অস্থিই যন্ত্রণা বা বেদনামি অধিক অস্থিভূত হয় না ; আক্ষেপের সঙ্গে জ্ঞানের কোনও বৈলক্ষণ্য হয় না ; উজ্জল আলোক, স্পর্শন বা সামান্য আঘাতেই আক্ষেপের পুনরাক্রমণ আরম্ভ হয় ; স্বেচ্ছাপূর্ব্বক অঙ্গ সকলনের সহায়কারী পেশীর স্পন্দন ; সমুদয় শরীর শক্ত হয় বা নোয়ান যায় না (সিকুটা, কুপ্রাস, ওপিয়ারাম) ; মায়ু-মণ্ডলীর অতিরিক্ত চেতনা ; রোগী আপনাকে আপনি অত্যন্ত লম্বা মনে করে ; মল, মূত্র বর্জ্য ইত্যাদি স্বাভাবিক নিঃসরণ রুদ্ধ হওয়া ; ভয় খাইলে বেরুণ হয়, সমুদয় শরীরের সেরূপ কম্পন (জেল্‌ম) ; বারম্বার শরীর স্পন্দন (আগারিকান্‌, সিকুটা) ; শরীরের মধ্য দিয়া হঠাৎ ঝাকি বা দাক্কা লাগার জায় অস্থিভূত হওয়া ; আক্ষেপ হইয়া অঙ্গ প্রত্যঙ্গ অচল হয় এবং তদরূপ অস্ত্রের দাহায়া বাতীত রোগী অঙ্গাদি সকলন করিতে পারে না ; জল দেখিলে বা খাইলে আক্ষেপের উজ্জেক হয় ; সমুদয় শরীরের অনবরত অস্থিরতা ; সংজ্ঞা-ভোগের পর অঙ্গ প্রত্যঙ্গের পক্ষাঘাত ; একাকী থাকিলে, অন্ধকারে, স্পর্শনে, চক্‌চকে বস্তুর পানে তাকাইলে, গিলিবার সময়, বিশেষতঃ জল বা জলীয় পদার্থ গিলিবার সময়, অস্থিখের বৃদ্ধি এবং ঘরের মধ্যে থাকিলে, উজ্জল আলোকে বা অস্ত্রাজ লোকের সঙ্গে থাকিলে, শীতল জলে অস্থিখের উপ-
 * শম ইত্যাদি ট্র্যামোনিয়ামের কতকগুলি বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ মধ্যে পরিগণিত ।

সমগুণবিশিষ্ট ঔষধ । রক্তের উপর ট্র্যামোনিয়ামের কার্যের

টিরিবিথিনা ।

৩৩৩

সঙ্গে হায়োসায়েরমাস্ এবং বেলাডোনার কার্যের বিশেষ সাদৃশ্য আছে।
এতদ্ভিন্ন অন্ত্যস্ত বিষয়ে ইহার কার্যের সঙ্গে আগারিকান্, ক্যামোমিল, ক্যানাবিস্ ইণ্ডিকা, ইগ্‌নেসিয়া, আর্দিনিক, ব্রাইওনিয়া, সিকুটা, লাইকো-পডিয়াম্, নাক্স বমিকা, ওপিয়াম্, প্লাঘাম্, পাল্মেটোলা, সালফার এবং বিরেট্রাম্ আল্‌বামের কার্যের সাদৃশ্য আছে।

প্রতিষেধক ঔষধ । বেলাডোনা, হায়োসায়েরমাস্, নাক্স বমিকা।
অধিক মাত্রায় মূত্ররা থাইয়া বিযাক্ত হইলে লেবুর রস, বিনিগার (Vinegar). এবং তামাক ব্যবস্থা।

ডাইলুশন বিচার । ডাক্তার আণ্ডারউড্ (Dr. Underwood) বলেন যে, উন্নততা, প্রলাপ শু স্ত্রীলোকের কামোন্মত্ততা বা পুরুষ সহবাসের অত্যন্ত ব্যগ্রতা, মৃগীরোগ, আক্ষেপ বা কন্‌বাল্‌সন্স, স্নায়ুশূল এবং আক্ষেপ বা শূল বেদনা ইত্যাদি আক্ষেপিক অন্ত্রথে ১ম, ৩য় এবং ৬ষ্ঠ ডাইলুশন বিশেষ উপকারী। লেখকও ডাক্তার আণ্ডারউডের উক্ত মতের পোষকতা করেন। পক্ষাঘাত বা পক্ষাঘাতের অবস্থা, মাথাঘোরা, অনমনতা, মস্তিষ্কের শোথ, পাকস্থলী এবং অন্ত্রের অন্ত্রথ, বমনোদ্বেষ, বমন এবং উদরাময়, মল, মূত্র, বর্ষ ইত্যাদি স্বাভাবিক নিঃসরণ রুদ্ধ হওয়ার দরুণ অন্ত্রথে ১২ হইতে ৩০ ক্রম পর্য্যন্ত ব্যবহার্য্য। ডাক্তার হিউজ্ (Dr. Hughes) বলেন যে, ৩য় এবং ৬ষ্ঠ ক্রম ব্যবহার করিয়া তিনি সকল প্রকার অন্ত্রথেই যথোচিত ফল পাইয়া থাকেন।

টিরিবিথিনা,—টার্পিন্ তৈল,—টিরেব্.

(TEREBINTHINA,—TARPENTINE,—TEREB.)

কোন এক বিখ্যস্ত হোমিওপ্যাথিক ঔষধানয় হইতে আদত পরিষ্কৃত (Distilled) তার্পিন তৈল ক্রয় করিয়া যথা নিয়মে রেকটিকাইড্ স্পিরিটে মিশাইয়া ইহার মিশ্র আরোক (Dilutions) প্রস্তুত হইয়া থাকে।

সাধারণ ক্রিয়া । মূত্রকোষের উগর ইহার কার্য্য অতি প্রবল, বাহার দ্রুণ উক্ত বস্তুর উত্তেজনা, রক্তাবরোধ এবং প্রদাহ হইয়া থাকে ও রক্ত মূত্র (Haematuria) এবং আল্‌বুমিনুরিয়া (Albuminuria) ইত্যাদি অস্থখ হইয়া থাকে । ইহা কতক পরিমাণে প্লেগ্মা উৎপাদক ক্লিলীর উপরাত্ম-শও আক্রমণ করিয়া উহাতে রক্তাবরোধ এবং প্লেগ্মা জনিত প্রদাহ উৎপাদন করে । কিন্তু ইহা মূত্রাধার ও মূত্রনালীর শৈল্পিক ক্লিলীই অধিক পরিমাণে আক্রমণ করে এবং তদ্রূপ উক্ত বস্তুর প্রদাহযুক্ত হইয়া মূত্রকৃচ্ছ হইয়া থাকে ।

সাধারণ প্রাকৃতিক লক্ষণ ।

মন । মানসিক অবসন্নতা; মূত্রাববোধ হওয়ার দ্রুণ ঘোর অচে-
তনতার ভাব (ইউরিমিয়া, - Uraemia) (প্রবল) ।

মস্তক । মাথাধোবা; শিরঃশীড়া; মাথার অত্যন্ত চাপা এবং পূর্ণ বোধ ।

নাসিকা । নাকদিয়া অতিরিক্ত পরিমাণে রক্তস্রাব (একন্. বেল, ব্রাই, হানামেলিস্) ।

মুখমণ্ডল । মুখমণ্ডল শিটা এবং নাটক বন্ধ বিশিষ্ট (আস্') ।

মুখগহ্বর । জিহ্বা লাল বর্ণ, নির্মল এবং চক্‌চকে ।

পাকস্থলী এবং উদর । ক্ষুধা শূন্যতা; প্লেগ্মা বমন; পাকস্থলীতে আগ্নেয়ভব । উদর অত্যন্ত ক্ষীত এবং বিস্তৃত (চায়না, গ্রাফ্, হিপ্পোলাফ্); মনে হয় যেন উদরের মধ্যে একস্থান হঠাৎ অপর স্থানে বিদ্যাত্তর জায় কোন পদার্থ হঠাৎ আনাগোনা করে (একন্. কন্. আস্) ; শূল বেদনা ।

মল । জলবৎ তরল প্লেগ্মা ভেদ, দাগ প্রাতঃকালে বৃদ্ধি পায়; অস্ত্রের প্লেগ্মা জনিত অস্থপের দ্রুণ উদরামব এবং ~~বিস্তার~~ সঙ্গে সঙ্গে মূত্র কোষের প্রদাহ ।

মূত্রবস্ত্র । মূত্রকোষ প্রদেশে ভারি এবং চাপা বোধ; মূত্র কোষ প্রদেশে আগ্নেয় বা কসিয়া দরার জায় প্রবল বেদনা; মূত্রকৃচ্ছ এবং মূত্র ত্যাগের পর মূত্র নালীতে অত্যন্ত জ্বালা, টাটানি এবং চড়্‌চড়ানি (ক্যাঙ্ক্); মূত্র পবিনাণে অন্ন এবং রক্ত মিশ্রিত (আস্, ক্যাঙ্ক্, কল্‌চ্, হানামেলিস্); মূত্রে বায়োলেট্ (Violet) নামক ফুলের গন্ধ ।

খাসযন্ত্র । ক্ষুদ্র রক্তাধিক্য বা রক্তাবরোধ হইলে বেরূপ হয়, সেরূপ খাস কষ্ট ; বায়ুনের প্লেথ্রিক কিল্লীর অত্যন্ত শুষ্কতা ।

নাড়ী । নাড়ী দ্রুতগামী, ক্ষুদ্র, হ্রস্ববৎ সূক্ষ্ম এবং লুপ্ত প্রায় ।

ব্যবহার । মূত্র কোষ প্রদাহ (Nephritis) ; মূত্র কোষের ব্রাইট্‌স্ ডিজিজ্ (Bright's Disease of the kidneys) ; রক্তমূত্র ত্যাগ (Hæmaturia) ; মূত্রাধার প্রদাহ ; মূত্র নালীর প্রদাহ ; প্রমেহ রোগ ; অস্ত্রের ক্ষত এবং উহা হইতে রক্তস্রাব ; কৃমি ; উদরাময় ; শোথ ; শরীর শীর্ণ হওয়া ; ওলাউঠার প্রতি ক্রিয়ার পর মূত্রাবরোধ এবং তদরূপ ইউরিমিয়া (Uræmia) হইয়া বিকারের লক্ষণ ইত্যাদি অল্পে টিরিবিহিনা ব্যবহার্য্য ।

বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ । অত্যন্ত বলক্ষয় (আর্ম্, চায়না, ফর্ম্) ; কখন কখন চর্ম্মের নীচে স্পন্দন (হায়োস্, ষ্ট্রামন্) ; সমুদয় শরীরে ঠাণ্ডা চট্‌চটয়া ঘর্ম্ম (ক্যাম্ফার, টেবেকাম্, বিরেট্-আল্‌ব্) ইত্যাদি টিরি-বিহিনার কতকগুলি বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ ।

সমগুণবিশিষ্ট ঔষধ । ক্যাস্টারিস্ এবং কোপেইবা ।

প্রতিষেধক ঔষধ । ফক্ষরাস্ ।

ডাইলুশন বিচার । ৩য় এবং ৬ষ্ঠ ডাইলুশনই সচরাচর অধিক ব্যবহৃত হইয়া থাকে । ডাক্তার হিউজ্ (Dr. Hughes) ১ম হইতে ৩য় দশমিক ডাইলুশনই সচরাচর ব্যবহৃত করিয়া যথোচিত ফল পাইয়া থাকেন । অনেক টিকিৎসক ১২ এবং ৩০ ডাইলুশন ব্যবহার করিয়া যথোচিত ফল পাইয়া থাকেন ।

থুজা অক্সিডেন্টালিস্,—থুজা

(THUJA OCCIDENTALIS,—THUJA OCC.)

ক্যানেন্ডা এবং ইউনাইটেড্ স্টেট্‌সের অনেক স্থানে এই গাছ জন্মিয়া থাকে । ঐ সকল স্থানে ইহার চাষও হইয়া থাকে । ইহার অল্প বা কচি

পাতা ডাঁটা বখা নিয়মে ২০° ডিগ্রী ওয়ার প্রফ্‌ স্পিরিটে ডিফাইনেশন মূল আরোক প্রস্তুত হইয়া থাকে ।

সাধারণ ক্রিয়া । মূত্র বৃদ্ধ, জঁমনেন্দ্রিয়, গুহ্বার এবং চর্মের উপর ইহার কার্য অতি প্রবল । ইহা উক্ত বস্তুদিকে উত্তেজিত করিয়া উহার স্বাভাবিক নিঃসরণকে পরিবর্তিত এবং উহাকে অল্প ও ক্ষতকারক গুণ বিশিষ্ট পদার্থে পরিণত করে ; উক্ত তরল পদার্থ গুলিকে বিগলনাবস্থায় আনয়ন করিয়া আক্রান্ত অংশগুলিকে বিনাশ করে । চর্ম এবং শৈল্পিক স্কিলীর উপর আঁচিলের জায় ফুসুড়ী এবং শৈল্পিক আব্‌ (Warts and Condylomata) উৎপাদন করা এই ঔষধের একটি বিশেষ প্রাকৃতিক শক্তি বা গুণ মধ্যে পরিগণিত ।

সাধারণ প্রাকৃতিক লক্ষণ ।

মন । অত্যন্ত মানসিক অস্থিরতা এবং অবসন্নতা ; সর্বদা কাঁদবার ইচ্ছা বা স্বভাব (অরাম্‌, ইগ্নেন্স্‌, পাল্‌স্‌, ক্রিয়ার্জ্‌, রাস্‌-টেন্স্‌) ; সকল বিষয়েই অনস্থিতি ; চিড়্‌, চিড়্‌ করা ; এক গোঁয়ারমি (ব্রাই, কাম্‌, নাক্স্‌-বম্‌) ; বাঁটবার অনিচ্ছা (অরাম্‌) ; চিন্তা করিতে অশক্তি ; আন্তে আন্তে কথা বলা, বাহার দরুণ মনে হয় যেন উপযুক্ত শব্দ স্মরণ হয় না ; কথা বলিতে বা লিখিতে ভুল হয় ; কথা বলিতে বা লিখিতে হুই এক শব্দ ছাড়িয়া দেওয়া বা বানানাদিতে ভুল যাওয়া (ডাল্‌ক্‌, লাইকোপ্‌) ; মানসিক পরিশ্রমে অনিচ্ছা (চায়না, কস্‌-আন্‌, নাক্স্‌-বম্‌) ; সমুদয় বিষয়ই সহজে ভুলিয়া যাওয়া বা স্মরণ শক্তির হ্রাস (আনাকার্ড্‌, নাক্স্‌-মফ্‌) ; মনে হয় যেন পেটের মধ্যে কোন জীবিত বস্তু আছে ।

মস্তক । মাথায় গোলমালে বোধ ; চক্ষু বৃজিলে মাথাঘোরা (ল্যাক্‌) ; প্রাতঃকালে মাথা ধরা, বাহার দরুণ কখন কখন মনে হয় যেন গালের রেলার অস্থি (Malar bone) এবং উপরের মাড়ি প্রদেশ কাটিয়া খণ্ড খণ্ড হইবে ; আবার কখন কখন মনে হয় যেন মাথার উপরিতাপে যেন একটী কাঁটা দিয়া হানিতেছে ; আবার কখন কখন মনে হয় যেন কপাল কাটিয়া পড়িয়া যাইবে, বচির্কাষুতে চলিয়া বেড়াইলে বাহার

উপশম হয়; কপাল, কপালের দুই পার্শ্ব এবং মাথার পশ্চাৎ ভাগে ছিঁকিরা
কেলার ভায় বেদনা, রক্তিতে এবং শয়ন করিয়া থাকিলে যাহার বৃদ্ধি
হয়; কপালের দুই পার্শ্ব, কপাল এবং চক্ষুর উপরিভাগে হিত্র করা বা
শুচী বিধানের ভায় বেদনা; কপালের বাম পার্শ্বের উচ্চ স্থানে এবং মাথার
ডাইন পার্শ্বে কাঁটা বিধাইয়া দেওয়ার ভায় বাতনা (আর্গিকা, আগারিকান্,
আনাকার্ড, কফিয়া); মাথার চুল কঠিন, শুক এবং জ্যোতিশূন্য হয় ও
পড়িয়া যায়; মাথা অত্যন্ত টাটায়, যাহার দরুণ মাথার সামান্য স্পর্শনও
সহ্য হয় না (একন্, বেল, চায়না, মার্ক, নেট্রাম্ মিউর, নাইট্রিক্-অ্যাস) ।

চক্ষু । চক্ষুর ষেতাংশ প্রদাহযুক্ত এবং রক্তের ভায় লালবর্ণ
(বেল); বালি প্রবেশ করিলে বেক্রপ হয়, চক্ষের মধ্যে সেক্রপ চাপা এবং
শুক বোধ (অ্যাস্, কষ্ট, হিপ্-সাল্ফ্); চক্ষু এবং চক্ষুর পাতার আলা এবং
হল ফুটানের ভায় অস্বভূত হয় (অ্যাস্); রক্তিতে চক্ষুর পাতার পাতার
লাগিয়া থাকে (ক্যাল্-কার্ক, গ্রাফ, লাইকোপ্, সাল্ফ্); একখানি
সরুকাপড় বা ক্রাশার মধ্য দিয়া ভাকাইলে বেক্রপ হয়, চক্ষে সেক্রপ
আপ্সা দেখা (কোকোশ্, কষ্ট, নেট্রাম্-মিউর, ফস্, পিট্রোল, মিলিরা);
চক্ষুর সম্মুখে তাড়াতাড়ি পানীর ডানা ঝাড়ার ভায় ধক্কড়্ করা;
আলোক যেন জোনাকী পোকার ভায় দৃষ্ট হয় (আগারিকান্, সাইক্লোমেন্,
মার্ক); চক্ষুর আইরিসের প্রদাহ (Iritis) এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে আইরিসে
স্নৈয়িক ফোটক (Condylomata); চক্ষুর মধ্যে বাটরা ধরা এবং উহার
সঙ্গে সঙ্গে চক্ষুর উপর ও উহার চতুষ্পাশ্ববর্তী স্থানে অত্যন্ত উষ্ণত্ব;
চক্ষুর পাতার উপর আঁচিলের ভায় দানা দানা ফুসুড়ী (Granular-lids);
চক্ষুর পাতার বোজক ঝিল্লির প্রদাহ (Conjunctivitis), রক্তে ভাল ছু
না হইলে যাহার বৃদ্ধি হয়; চক্ষুর পাতার উপর ভূমির ভায় শুকনো
ফুসুড়ী; চক্ষুর পাতার আবের (Tumour) পক্ষে বিশেষ উপকারী ।

কর্ণ । কান দিয়া পচা মাংসের গন্ধযুক্ত জলবৎ তরল পুঁথ
নিঃসরণ ।

নাসিকা । নাসারন্ধ্রে বেদনাক্ত ক্ষত এবং চুমটি পড়া (আলাব,
আণ্টি-ক্লড্, ক্যালী-বাই, পাল্ন্); নাকের পাতার ক্ষীতি, উহার কঠি-

নভা এবং উহাতে কসিয়া ধরার জ্বায় বেদনা; নাকের পাতার লাগি চুণ্‌কালি বিশিষ্ট ফুস্কড়ী বাহা হইতে কখন কখন কল্‌তানি পড়ে; নাক দিয়া চূর্ণকয়ুক্ত পূর্ব সংযুক্ত শ্লেষ্মা নির্গমন (গ্রাক্, হিপ্-সাল্‌ক্, নাইট্রিক্-আস্); শুষ্ক সর্দি, বাহার দক্ষণ নাসারন্ধ্র শুষ্ক এবং বন্ধ হয়, সন্ধ্যার সময় বাহার বৃদ্ধি হয়; নাকের গোড়ার অত্যন্ত কষ্টদায়ক চাপা বোধ (একন্, ক্যালী-বাই, মার্ক্-আয়োড্)।

মুখমণ্ডল । মুখমণ্ডল এবং গালের হাড়ে ছিদ্র করা বা খনন করার জ্বায় বেদনা, স্পর্শনে বাহার উপশম হয়; উপরের ওষ্ঠে, ওষ্ঠের কোণের নিকট কাকি লাগার জ্বায় অম্লভূত হয়; মুখ মণ্ডলে মধ্যে মধ্যে দম্‌কা উচ্চাশ্রুত্ব।

মুখগহ্বর এবং গলার মধ্য । দীর্ঘ কাল্‌চে হরিত্রা বর্ণ এবং উহাতে টাটানি (আরোড্); জিহ্বায় ক্ষত এবং ফোঁকা (নাইট্রিক্-আস্); জিহ্বা ক্ষীত এবং উহাতে আলা এবং টাটানি; জিহ্বার অগ্রভাগ স্পর্শনে অত্যন্ত বেদনায়ুক্ত হয় বা টাটায়; জিহ্বার নীচে ফোড়ার জ্বায় নীলবর্ণের ক্ষীতি এবং উহার চতুঃস্পার্শ্ববর্তী স্থানের শিরার ক্ষীতি ও বিস্তৃতি; মুখের মধ্যে ঘা বা ক্ষত; পুড়িলে বেরূপ হয়, মুখের মধ্যে লেবুপ অম্লভূত হয় (আইরিস্, পাল্‌স্, সাল্‌সুনেরিয়া, সাল্‌ক্-আস্); গলার মধ্যে চট্‌চটিয়া আঠা শ্লেষ্মার দধার বাহা অতি কষ্টে নির্গত হয় (আলাম্, আমন্-কার্ক্, ক্যালী-বাই); গলার মধ্য শুষ্ক এবং ঝল্‌ঝল্‌।

পাকস্থলী এবং উদর । ক্ষুধাশূন্যতা; উল্লার উঠা, পিপাসার অত্যন্ত বৃদ্ধি, বিশেষতঃ রাত্রিতে; পাকস্থলীতে কঠিন বোধ। উদরের পার্শ্বে স্থলীধিধানের জ্বায় অম্লভূত হয়; উদর বর্ধিত এবং ক্ষীত; গর্ভাবস্থার ক্রম হাত পা বিস্তৃত করিলে বেরূপ হয়, উদরের স্থানে স্থানে লেবুপ উচু হওয়ার জ্বায় দৃষ্ট হয়; উদরের মধ্যে কোন জীবিত পদার্থ নড়িতেছে এরূপ অম্লভূত হয়, কিন্তু উহার দক্ষণ কোন বাতনাধি অম্লভূত হয় না (ক্রোকাশ্); আহারের পর উদর অত্যন্ত বড় হয় (চারনা, নাক্স্-বম্); উদর দ্বিগুণ বায়ু দ্বারা ক্ষীত এবং বিস্তৃত হয়; উদরের মধ্যে গড়্‌ গড়্‌, কল কল শব্দ হয় এবং উদরের মধ্যে যেন কোন জন্তু ডাকিতেছে এরূপ।

অস্বভূত হয় (কলোস) ; কুঁচকির গ্রন্থির ক্ষীতি এবং উহাতে অত্যন্ত বেদনা (ক্যাণ্‌ক-কার্ক্, ক্রিমোটস্, নাইট্রিক্-অ্যাস্, রাস্-টন্স্) ।

মল এবং মলদ্বার । শুষ্কদ্বারে শৈথিল্যকোষটক (Condylomata) ; মলত্যাগের সময় শুষ্ক দ্বারের কঠিনায়ক সঙ্কোচন ; শুষ্কদ্বারে কত ও তদ্রূপ আলা এবং স্পর্শনে উহাতে অত্যন্ত টাটানি (সাল্‌ফ্) ; অর্শরোগ এবং তদ্রূপ শুষ্কদ্বারে বলী বাহা সামান্য স্পর্শনেই অত্যন্ত টাটায় ; শুষ্কদ্বারে অত্যন্ত কঠকর স্থৌল্লিবানের জ্বায় বেদনা ; হিমারয়েডেল্ শিরাজে (Hæmorrhoidal vessels) চাপিয়া ধরার জ্বায় বাতনা বা আলাভূতব ; শুষ্কদ্বারে চুলকানি (সাল্‌ফ্, নাক্স-বম্, সাইলিসি, সিপিরা) ; প্রত্যহ প্রাতঃকালে উদরানব (আলোজ্, কমেজ্, সাল্‌ফ্) ; প্রাতঃকালে, প্রথম আহারের পর, উদরানব ; দান্তের সময় কখন কখন পেটে বেদনা থাকে এবং কখন বা বেদনা থাকে না ; মল উজ্জ্বল হরিদ্রা বর্ণ (চেলিডন্), জলবৎ তরল বাহা অতি বেগে শুষ্কদ্বার দিয়া নির্গত হয় (ক্রেটিন্, গ্রাটিওলা) এবং মল ত্যাগের সময় অত্যন্ত প্রবল শব্দে দ্বিবিভাব্য নিঃসরণ (আলোজ্) ; পিপার কুত্র ছিত্র দিয়া জল নির্গত হইলে বেরূপ হয়, মলত্যাগের সময় সেক্ষণ শব্দ হওয়া ; কোষ্ঠবদ্ধ (আলাম্, ড্রাই, নাক্স-বম্, ওপিয়ার্, কস্, লাল্‌ফ্) ।

মূত্রযন্ত্র । বারবার মূত্র ত্যাগের ইচ্ছা এবং প্রচুর পরিমাণে মূত্র ত্যাগ, মূত্রত্যাগের পর মনে হয় যেন আরো কয়েক ফোঁটা মূত্র মূত্রনালী দিয়া বহিরা পড়িতেছে ; মূত্র নির্গমনের সময় মূত্রনালীতে আলাভূতব (অ্যাস্, কোনার্যাম্, নেট্রাম্-কার্ক্) ; মূত্র পরিমাণে অল্প, কাল্‌চে ; মূত্র পরিমাণে অধিক এবং জলবৎ ; প্রমেহ রোগ এবং তদ্রূপ স্লেয়া দ্বারা মূত্র নালীর মুখ বদ্ধ হইয়া থাকা ; মূত্রনালী দিয়া হরিদ্রার আভ্যন্তর স্লেষ নিঃসরণ (হাইড্রাট্, মার্ক্) ।

জননেদ্রিয় । পুরুষাঙ্গের মাথার (Glans penis) আবরক চর্মেয় উপর (Prepuce) আঁচিলের জ্বায় আর্জ্ কুসুড়ী (নাইট্রিক্-অ্যাস্, টাকিন্) ; প্রিপাসের ক্ষীতি ; রাস্ এবং প্রিপাসের চুলকানি (সাল্‌ফ্) ; রাস্তিতে পুরুষাঙ্গ খাড়া হয় এবং তদ্রূপ অত্যন্ত কষ্টগত হয় ; বাত্ নিঃসরণ ; জন-

মেন্জির, বিশেষতঃ অণ্ডকোষাধারে এবং শুষ্ক দ্বার ও অণ্ডকোষাধারের মধ্যবর্তী স্থানে (Perineum) অচূর ঘর্ষ (সাইলিসি, সাল্ফ্.); পুরুষাঙ্গে গরমীর ঘা এবং তদ্রূপ মনে হয় যেন পুরুষাঙ্গে একখানি চোঁচ বিধিরা রহিয়াছে; প্রমেহ রোগের ক্রম নিঃসরণ বদ্ধ হওয়ার দরুণ দক্ষিণাত্য; প্রোট্ট গ্রন্থির প্রদাহ (Prostatitis); পুরুষাঙ্গে অঁচিলের তার ফুসুড়ী; ক্লমভঙ্গ। জ্রালোকের ঘোনি দ্বারাদিতে অঁচিলের তার ফুসুড়ী হইয়া উঠা হইতে কল্‌তানি, রক্ত এবং দুর্গন্ধযুক্ত ক্রম নিঃসরণ (নাইট্রিক্‌-মাস); ঘোনি, ঘোনি দ্বারাদিতে কামড়গী এবং চুলকানি; শ্বেত প্রস্রাব এবং তদ্রূপ ঘোনিদ্বার দিরা প্রস্রাব তার ক্রম নিঃসরণ; বাম ডিম্বকোষ প্রদাহযুক্ত যাহা প্রত্যেকবার রজঃস্রাবের সময় বৃদ্ধি হয়; ডিম্বকোষে অত্যন্ত কষ্ট-দায়ক জ্বালা এবং বেদনা যাহা চলিয়া বেড়াইলে বৃদ্ধি হয় এবং যাহার দরুণ রোগী শয়ন করিয়া থাকিতে বাধ্য হয়; ঘোনি, ঘোনিদ্বার এবং জ্বরায়ু ইত্যাদিতে খাড়া আকারের ফোঁতি বা আব (Tumour) এবং উহাতে জ্বালামুভব; গর্ভস্রাবের তৃতীয় মাসে গর্ভস্রাব।

খাস যন্ত্র। খাস প্রবাস ঘন ঘন; হাঁপানি কাশি (আস্); আহায়েব পরই কাশি।

জুংপিণ্ড। স্পষ্টতঃ জংশ্মানন দেখিতে পাওয়া যায় (মোনয়েন্, স্পাইজেল), কিন্তু উহার দরুণ রোগীর কোন বিশেষ উল্লেখ হয় না।

পৃষ্ঠদেশ। বসিয়া থাকিলে কোমরের পশ্চাৎদেশের ঠিক নিম্নভাগ, শুষ্ক দ্বারের উপরিভাগের হাড় এবং উরুদেশে বেদনা; অনেককাল বসিয়া থাকা বা সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া থাকিতে অশক্তি; মেরুদণ্ড বাকা হয়, যাহার দরুণ রোগী সমুখদিকে বাকিয়া দাঁড়ায়; উদর উঁচু হয়।

অঙ্গ প্রত্যঙ্গ। নখ বাকান এবং আবড় খাবড় (অঁচি-জুড়); নখ মটকা বা কোমল; নখ বাকা হইয়া পড়ে (নেট্রাম্‌-নিউর, সাল্ফ্.); হাত এবং পায়ের পাতা কাঁপে। উত্তর কুঁচকির সন্ধি যেন শিথিল হয়, যাহার দরুণ চলিতে কষ্ট অনুভূত হয়; পায়ের পাতার ঘর্ষ (নাইট্রিক্‌-আস্, সিলিয়া, সাইলিসি, সাল্ফ্.)।

চর্ম। শরীরের নানা স্থানে, বিশেষতঃ হাত এবং অননৈজিরে,

অঁচিলের ত্রায় ফুসুভী (নাইট্রিক্-অ্যাস্, ফস্-অ্যাস্, টাকিস্) ; শরীরের নানা স্থানে অত্যন্ত চুলকানি ।

নিদ্রা । অনিবার্য নিদ্রাশূভতা (সিমিসিক্, কফিয়া) ; বাম পার্শ্বে শয়ন করিলে অত্যন্ত উদ্বিগ্ন উৎপাদক এবং অত্যন্ত কষ্টদায়ক স্বপ্ন দেখা ।

যক্ষ্ম । রাক্ষিতে প্রচুর পরিমাণে হরিজ্ঞা বর্ণের ঘর্ষ, বাহার দক্ষণ মনে হয় যেন বিছানার চাদর তৈলে ভিজান হইয়াছে ।

ব্যবহার । শরীরের স্থানে স্থানে সৈন্যিক স্ফোটিক (Condylomata) ; গায় গরমীর ব্যারাম জীনিত দাদের ত্রায় ফুসুভী ; পুরুষাঙ্গ এবং যোনি দ্বারে অনিবার্য গরমীর বা ; প্রমেহ রোগ ; অঁচিল ; জিহ্বার নীচে ক্ষোতি ; মুখে বা ; মুখমণ্ডলের বেদনা বা অগ্নিশূল ; হাঁপানি কাশি ; ইংরেজী টকা দেওয়ার দক্ষণ অমুখ (সাইলিসি) ইত্যাদি অমুখে খুজা ব্যবস্থা ।

বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ । শরীরের উর্দ্ধাংশের নানা স্থানে কাকি লাগা ; অক্রান্ত স্থান শীর্ণ হয় এবং উহাতে স্পর্শ জ্ঞান থাকে না ; সন্ধিতে শোথ ; লম্বিকাধিক্য ধাতুতে (Lymphatic temperament) বিশেষ উপকারী ; প্রাতঃকালে এবং পূর্বাঙ্কে, অপরাহ্ন ঠোর পর, বিশ্রাম কালীন, বিছানার উচ্চতাতে, মদ্যপানে, তামাক খাইলে অমুখের রুচি এবং বহির্কর্মানু ও উত্তাপে অমুখের উপশম ইত্যাদি খুজার কতকগুলি বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ ।

সমগুণ বিশিষ্ট ঔষধ । জননেজিয় এবং মুত্র যন্ত্রের উপর খুজার কার্যের সঙ্গে ক্যানাবিস্ সাটাইবা, ক্যাছারিস্ কোপেইবা, মার্কিউ-রিরাস্, পিটোসেলিনাম্ এবং পাল্‌সেটিগার কার্যের বিশেষ সাদৃশ্য আছে । অঁচিলের ত্রায় ফুসুভীর উপর হিহার কার্যের সঙ্গে নাইট্রিক্ অ্যাসিডের কার্যের অনেকটা সাদৃশ্য আছে । এতদ্ভিন্ন কোন কোন বিষয়ে হিহার কার্যের সঙ্গে ষ্টাকিসেগ্রিয়া এবং সাল্‌ফারের কার্যের সাদৃশ্য আছে ।

প্রতিষেধক ঔষধ । ক্যামোমিলা, ক্যাম্ফার, মার্কিউরিয়াস্, পাল্‌সেটিলা, সাল্‌ফার ।

ডাইলুশন বিচার । ১ম হইতে ৩০ পর্যন্ত সমুদয় ডাইলুশনই ব্যব-হৃত হইয়া থাকে । ৩য় এবং ৬ষ্ঠ ডাইলুশনই সচরাচর অধিক ব্যবহৃত হইয়া

থাকে। লেখক ৬ এবং ১২ ডাইলুশনই অধিক ব্যবহার করিয়া থাকেন। ইহার ২০০ ডাইলুশন ব্যবহার করিয়া চক্ষুর পাতার মধ্যদেশ এবং যোজক বিলীয় উপর গরমীর ব্যারাম জনিত শ্লেষ্মিক ফোটকের (Mucous tubercles) ৩৪টি যোগীর চিকিৎসায় বিশেষ ফল পাওয়া গিয়াছে। খুঁজার মূল আরোক একটা তুলিতে লইয়া আঁচিলে লাগাইলে আঁচিল মরিয়া বা চুপিয়া বাইতে দেখা যায়। পুরুষ বা স্ত্রী জননেজিয়ে উক্ত প্রকারের শ্লেষ্মিক ফোটক বা আঁচিল হইলে উক্ত প্রকারে মূল আরোকের বাহু প্রয়োগ দ্বারা বিশেষ উপকার দর্শিতে দেখা যায়।

বিরেট্রাম্ বিরাইড্,—বিরেট্-বির্

(VERATRUM VIRIDE,—VER. VIR.)

আমেরিকার কাদা বিশিষ্ট এবং ভিজা ভূমিতে এই গাছ জন্মে। ইহার শুকনা মূল প্রফুল্লিবিটে ভিজাইয়া মূল আরোক প্রস্তুত হয়।

সাধারণ ক্রিয়া। মস্তিষ্ক এবং কসেরুকা মজ্জার, বিশেষতঃ নিউ-মোগাস্ট্রিক্ নার্ভুর (Pneumogastric nerve) উপর ইহার কার্য অতি প্রবল, যাহার দরুণ মস্তিষ্ক এবং কসেরুকা মজ্জা সম্বন্ধীয় নার্ভুর উৎপত্তি স্থান, গতি উৎপাদনের সহায়কারী নার্ভ্বে এবং রক্তসঞ্চালনের সহায়কারী সমুদয় বস্তুর পক্ষাঘাত হইয়া মস্তিষ্ক ও অন্ত্রান্ত বস্ত্রে অত্যন্ত রক্তাধিক্য বা রক্তাবরোধ এবং তদরুপ প্রদাহ হয়। যে সকল বস্তু নিউমোগাস্ট্রিক্ নার্ভুর (Pneumogastric nerve) কার্যাবধীন, (যথা হৃৎকুস এবং পাকস্থলী) সে সকল বস্তুই উক্ত প্রকারে আক্রান্ত হইয়া থাকে। বেলাডোনা এবং এই প্রকার অন্ত্রান্ত ঔষধ মস্তিষ্কে যে প্রকারের রক্তাধিক্য বা রক্তাবরোধ উৎপাদন করিয়া মস্তিষ্কে প্রদাহ উৎপাদন করে, বিরেট্রাম্ বিরাইড্ সে রূপ না করিয়া নার্ভ্বে মণ্ডলীর পক্ষাঘাত উৎপাদন করিয়া মস্তিষ্কের উক্ত প্রকার অবস্থা আনয়ন করে। ইহা গতিশক্তি উৎপাদনের সহায়কারী নার্ভুগুলির জ্বলিতা বা বলক্ষয় উৎপাদন করিয়া আক্ষেপ উৎপাদন করার দরুণ শরীরের

নানী স্থানে কোরিয়ার (Chorea) দ্বার খেঁচনীর উল্লেখ হইয়া থাকে ।
হৃৎপিণ্ড এবং রক্ত-সঞ্চালনের সহায়কারী বস্তুর উপর ইহার কার্য অতি
প্রবল হওয়ার দরুন হৃৎপিণ্ডের উচ্চ শক্তি বিশিষ্ট প্রবল স্পন্দন ও নাড়ী
ক্রান্তগামী হয় এবং শ্বাস প্রশ্বাস মুহু মুহু ও বিলম্বে বিলম্বে বহিয়া থাকে ।

সাধারণ প্রাকৃতিক লক্ষণ ।

মন । সর্বদা ব্যগড়া করার স্বভাব এবং প্রলাপ বলা; মস্তিষ্কে
রক্তাধিক্য বা রক্তাবরোধ হেতু উন্মত্ততা (বেল) ।

মস্তক । মাথাধরা এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে মাথাবোরা; মাথায়
বেদনা ঘাহা ঘাড় হইতে আরম্ভ হয় (সাক্সনেরিয়া); মাথায় পূর্ণ এবং ভারি
বোধ; মাথায় অতিরিক্ত পরিমাণে রক্তাধিক্য বা রক্তাবরোধ (একন্-
বেল); মাথায় সমুখভাগে অভ্যন্ত বেদনা এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে বমন
(আইরিস); মস্তিষ্কের আবরক স্নায়ু প্রদাহ; প্রবল জ্বর; মাথায় প্রবল
রক্তাধিক্য বা রক্তাবরোধ এবং তৎপর মাথা বারংবার এদিক ওদিক
ঘুরাণ; বমন; অথবা মুখমণ্ডল কণ এবং শীতল; নাড়ী মৃদুগতি বিশিষ্ট
এবং শ্বাস কষ্ট ।

চক্ষু । চক্ষুর তারা বিকৃত (এইলাছ্, বেল, সিকুটা, ওলিয়াম্, ট্রায়ন);
চক্ষে কম দেখা, বস। অবস্থা হইতে দাঁড়াইলে বা দাঁড়াইবার চেষ্টা করিলে বা
চলিয়া বেড়াইলে ঘাহা অধিক অস্থির হয়; কোন বস্তুর দিকে অনেকক্ষণ
জাকাইয়া থাকিলে উক্ত বস্তু ভাল দেখিতে পাওয়া যায় না ।

মুখমণ্ডল । মুখমণ্ডল আরক্ত এবং উলটলে (বেল, ব্যাপ্ট),
শিটা, শীতল, নীলের আভাযুক্ত এবং শীতল বর্ণবাহী আবৃত (বিরেট-
আল ব); মুখমণ্ডলের পেশীর আকস্মিক স্পন্দন (আগারিকান, সিকুটা,
ইগ্নেস্, নাক্স-বম) ।

মুখগহ্বর এবং গলার মধ্য । মুখগহ্বর এবং ওষ্ঠ শুষ্ক; মুখে
গাঢ় স্বেদার সঞ্চার; ছাল উত্তীর্ণা গেলে যে রূপ হয়, জিহ্বার সে রূপ অস্থির
হয় (কলোস্, আইরিস্, প্লাটিনা, সাক্সনেরিয়া, সাল্ক-আস); জিহ্বা হরিত্রা
বর্ণ এবং উহার মধ্যদেশে লাল দাগ পড়ে । মুখ গহ্বরের পক্ষান্তরে

এবং আহারবহা গলনালীতে জালা ও তদ্রূপ অনবরত ঢোক গিলিবার ইচ্ছা; আহারবহা গলনালীর আক্ষেপ এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে কখন কখন গলা দিয়া ফেণাযুক্ত রক্ত মিশ্রিত স্লেষ্মা নির্গত হয়, কখন-বা স্লেষ্মা নির্গত হয় না।

পাকস্থলী এবং উদর । প্রায় অনবরতই কষ্টদায়ক হিকা (সিকুটা, হায়োস, ইগনেস, সাল্ফ-আস্); প্রবল বমনোবেগ এবং বমন ও উহার সঙ্গে সঙ্গে গীতল ঘর্ম (বিরেট্-অল্‌ব্, টেবেকাম্); সামান্য পরিমাণে আহার বা পানীয় দ্রব্য উদরস্থ হইলেই বমন দ্বারা উঠিয়া পড়ে; পাকস্থলীর নিঃস্রব্ধে অত্যন্ত কষ্টদায়ক প্রবল বেদনা; পাকস্থলীতে মোচড়ান বা ছিঁড়িয়া ফেলার ভাব বেদনা। নাভির ডাইনামিকে বেদনা বাহা কুঁচকি পর্যন্ত বিস্তৃত হয়; বস্তিকোটরের উপরিভাগে আড়াআড়ি বেদনা এবং টিটানি; অন্ত্র প্রদাহ (Enteritis) এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে প্রবল জ্বর এবং রক্তবহা নালীর অতিরিক্ত উত্তেজনা, বমন এবং কাল্‌চে রক্ত ভেদ।

মল । আঙ্গিক জ্বর বা জ্বরবিকারে কাল্‌চে রক্ত ভেদ, রাত্রিতে এবং প্রাতঃকালে বাহা অধিক হয়।

স্ত্রী জননেন্দ্রিয় । রজঃস্রাব অনিত অস্থির এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে মস্তিষ্কে অত্যন্ত রক্তাধিক্য (বেল্); স্ত্রীলোকের সম্মান শ্রেণবের পর উন্নততা (বেল্, হায়োস, প্রাটিনা, ট্রায়ম); আক্ষেপ বা কন্‌বাল্‌সল্।

শ্বাস যন্ত্র । শ্বাস প্রশ্বাস কষ্টকর, মৃদু এবং অত্যন্ত চেষ্টাশাধ্য (এই শেষেবনে শ্বাস প্রশ্বাস প্রতি মিনিটে ৪৯ হইতে ১৬ বারের নামে); বৃক্ক কষ্টগ্রস্তত্ব; বৃক্ক রক্তাধিক্য বা রক্তাবরোধ (একন্)।

হৃৎপিণ্ড এবং নাড়ী । হৃৎপ্রদেশে অনবরত জ্বালাযুক্ত শূণ্‌শূণ্‌ বেদনা; হৃৎপিণ্ড উচ্চ শব্দে এবং প্রবলবেগে স্পন্দন করে ও উহার সঙ্গে সঙ্গে রক্ত সঞ্চালনের অত্যন্ত উত্তেজনা (একন্, বেল্)।

গ্রীবা এবং পৃষ্ঠদেশ । ঝড়ি এবং ঝড়ে অত্যন্ত কন্‌কনানি।

অঙ্গ প্রত্যঙ্গ । পা, হাত এবং পায়ের আঙ্গুলে ঝিল ঝলা; অঙ্গ প্রত্যঙ্গে গ্যাল্‌বানিক্ বাটারী নামক যন্ত্রের ঝাঝাঝি ভাব ধাক্কা লাগা।

চর্ম । গায় ফুস্‌ফুস্‌; হানজর, আরক্ত জরের ফুস্‌ফুস্‌, বসন্ত এবং

উহার সঙ্গে সঙ্গে প্রবল জ্বর এবং ধমনির অতিরিক্ত উত্তেজনা ও কখন কখন কুস্কুড়ী প্রকোশ পাইবার পূর্বে আক্ষেপ (Convulsions) হয় ।

জ্বর । শীতবোধ এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে বমনোদ্বেগ; সমুদয় শরীর শীতল; মুখমণ্ডল, হাত এবং পায়ের পাতায় শীতল ঘর্ষ (আর্দ্র, ক্যান্ফার, টেবেরকাম্, বিরেট্রাম্ আল্‌বাম্); জ্বর এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে নাড়ী পূর্ণ, কঠিন এবং ক্ষতগামী (একন্, বেল); উত্তেজনা জনিত জ্বর এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে মস্তিষ্কে রক্তাধিক্য বা রক্তাবরোধ ও তদ্রূপ আক্ষেপ (শিশু বা ছোট বালক বালিকাগণের); প্রচুর ঘর্ষ এবং তদ্রূপ অত্যন্ত দুর্বলতা বা বলক্ষয় (কম) ।

ব্যবহার । ফেটিক, ছাম, বসন্ত ইত্যাদি এবং অজ্ঞাত প্রকারের জ্বর বাহাতে ধমনির অত্যন্ত উত্তেজনা থাকে; ফুফুস প্রদাহ; কুক্ষ্মাস্বরক ঝিল্লী প্রদাহ; রক্তাধিক্য, রক্তাবরোধ, মস্তিষ্কের নিম্নভাগ, বৃক, মেরুদণ্ড এবং পাকস্থলীতে যাহা অধিক হয়; কোরিয়া (Chorea); আক্ষেপ বা কন্‌বাল্‌সন্স; হৃতিকাবস্থার আক্ষেপ; মৃগীর আক্ষেপ; মস্তিষ্ক এবং কমে-ককা মজ্জাবস্ক ঝিল্লী প্রদাহ; হৃতিকাবস্থার উদ্ভ্রততা; পক্ষাঘাত; বাত-রোগ; হৃৎপিণ্ডের প্রদাহ; হৃৎহাবরক ঝিল্লী প্রদাহ; পাকস্থলী প্রদাহ; পাকস্থলীতে বেদনা ইত্যাদি অস্থখে বিরেট্রাম্ বিরাইড্ ব্যবহার্য্য ।

বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ । মুখমণ্ডল, গ্রীবা, হাত এবং পায়ের আঙ্গুলের আক্ষেপিক স্পন্দন এবং বিকৃতি; কোরিয়া (আগারিকান্, সিকুটা, ইগ্নেস্, নাক্স-বম্); দুর্বলকারক উদবাসরের দরুণ রক্তাঘাত জনিত আক্ষেপ; শুষ্ক খাইলে ঘেঁষা হয়, রোগীর (শিশু) শরীর সেরূপ কাঁপে, বাহার দরুণ মনে হয় যেন তাহার আক্ষেপ হইবে; পক্ষাঘাত; অঙ্গ প্রত্যঙ্গে টন্-টনানি; মস্তিষ্কে রক্তাধিক্যের ধাতু; মস্তিষ্কের নিম্নভাগ, বৃক, মেরুদণ্ড এবং পাকস্থলীতে রক্তাধিক্য বা রক্তাবরোধ; শোথ এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে জ্বর; বলা অবস্থা হইতে দাঁড়াইলে, চলিয়া বেড়াইলে, সন্ধ্যার সময় এবং নড়া-চড়াতে অস্থখের বৃদ্ধি ইত্যাদি বিরেট্রাম্ বিরাইডের কতকগুলি বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ মধ্যে পরিগণিত ।

সমগুণ নিশিষ্ট ঔষধ । বিরেট্রাম্ বিরাইডের কার্য্যের সঙ্গে

একোনাইট, আন্টিমোনিয়াম টার্টারিকাম্, বেলাডোনা, ডিজিটালিস, অেল্‌সিনিয়াম্, হেলিওথ্যাম্, টেবেকাম্ এবং বিরেট্রাম্ আধামের কাষের সাধুত আছে ।

ডাইলুশন বিচার । ১ম দশমিক ডাইলুশনই সচরাচর অধিক ব্যবহৃত হইয়া থাকে । কোন কোন চিকিৎসক ইহার ৩য় এবং ৬ষ্ঠ ডাইলুশনও ব্যবহার করিয়া থাকেন । বিসর্প, বসন্ত এবং সামান্ত প্রকারের রক্তাধিক্য এবং প্রমাহে ইহার অমিশ্র মূল আরোক, বা মূল আরোক জলে বিশাইয়া লোশন (Lotion) প্রস্তুত করিয়া আক্রান্ত স্থানে লাগাইলে প্রদাহাদির অনেক হ্রাস হয় এবং ইহা দ্বারা প্রদাহাদি একেবারে সারিয়াও যাইতে পারে ।

জিঙ্কাম্ মেটেলিকাম্,—জিঙ্ক-মেট্

(ZINCUM METALLICUM,—ZINC. MET.)

কোন এক বিষমত হোমিওপ্যাথিক ঔষধানয় হইতে আদত জিঙ্কের পরিতৃপ্ত শুঁড়া ক্রয় করিয়া উহাতে যথা নিয়মে সুগার অব্‌মিক্ বিশাইয়া ৩য় শতভাগিক ক্রম পর্য্যন্ত ইহার শুঁড়া প্রস্তুত হইয়া থাকে । ৩য় শতভাগিক ক্রমের শুঁড়া হইতে যথা নিয়মে ৪র্থ শতভাগিক ক্রমের আরোক প্রস্তুত হয় ।

সাধারণ ক্রিয়া । মস্তিষ্ক এবং কসেদকা মৰ্জা সম্বন্ধীয় স্নায়ু-মণ্ডলের উপর ইহার কার্য্য অতি প্রবল, বাহ্যিক দ্রবণ মস্তিষ্ক, মেডুলা অব্‌লংগেটা (Medulla Oblongata) এবং কসেদকা মৰ্জা উত্তেজিত হইয়া মস্তিষ্কের অবসন্নতা এবং স্নায়ুর উৎপত্তি স্থানের দুৰ্বলতা উৎপাদন করে । মস্তিষ্কের দুৰ্বলতার পক্ষেই হোমিওপ্যাথিক মতে জিঙ্কাম্ বিশেষ উপকারী । ক্লোরোসিসের (Chlorosis) রোগে যেমন হয়, এই ঔষধেও রক্তের সঞ্জন অবস্থা উৎপাদন করে ।

সাধারণ প্রাকৃতিক লক্ষণ ।

মন । স্মরণ শক্তির দুৰ্বলতা, (অনাকার্ড, ক্লিফোর্ড, ল্যাক্, বাজ্-হফ্, মার্ক্) ; দিনের বেলা ঘাড়া করা যায়, উহার সমুদয়ই ক্লিয়া বাতরা ; সৰ্ব্বদা

বক্ বক্ করা, হতাশের ভাব, বিশেষতঃ সন্ধ্যার সময় ; সহজেই রাগান্বিত হওয়া ; বিরক্ত হইয়া দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ ; মানসিক চিন্তা কষ্ট সাধ্য (জেল্-স্, নাক্স-বন্, কন্-আন্, থুন্) ; বিবেচনা শক্তির বিনাশ এবং অন্ধচেতনার জ্ঞান নিজার ভাব (ওপিয়াম্, নাক্স-বন্) ; কার্য্য কর্ণ করিতে অনিচ্ছা ।

মস্তক । মাথা ঘোরা এবং তন্দ্ররূপ চলিবার সময় বাম দিকে টলিয়া পড়া ; বাহ্যিক মাথাঘোরা, বাহ্যিক আক্রমণের পূর্বে নাসিকার গোড়ার প্রবল আকারের চাপাবোধ এবং একগাছি হুতা দ্বারা কসিয়া বাধিলে যেরূপ হয়, তুই চক্ষু সেরূপ কসিয়া বাধার জ্ঞান অনুভূত হইয়া উহার পরক্ষণই অত্যন্ত বমনোদ্বেগ, মুচ্ছার্ত্তাব এবং হস্তের কম্পন ; নাকের গোড়ার চাপাবোধ, বাহ্যিক দর্শন মনে হয় যেন নাক চাপিয়া মাথার মধ্যে আনিবে (ক্যালী-বাই) ; সন্ধ্যার সময় কপালের কোন এক নির্দিষ্ট ক্ষুদ্রাংশে চাপাবোধ ; একপেশে (আধ্ কপালিয়া) মাথা ধরা (Hemicrania), মধ্যাহ্নে আহ্বারের পর বাহ্যিক বুদ্ধি হয় ; মাথায় ছিঁড়িয়া ফেলা বা হুল ফুটানের জ্ঞান বেদনা ; সামান্ত পরিমাণে মদ্য পান করিলেই মাথা ধরা (মাক্স-বন্, রডো-ডেগ্গে-ন্) ; মাথায় তালুতে কসিয়া ধরা বা ছিঁড়িয়া ফেলার জ্ঞান চাপাযুক্ত বেদনা ; ছাল উঠিয়া ক্ষত হইলে যেরূপ হয়, স্পর্শ করিলেই মাথার উপরি-ভাগে সেরূপ টাটানি বা চড়্-চড়ানি, সন্ধ্যার সময় বাহ্যিক বুদ্ধি হয় ; মাথায় তালুর চুল পড়িয়া যাইয়া তালু খালি হয় (ব্যারাইটা-কার্ক্) এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে মাথার হাড়ে টাটানি ।

চক্ষু । চক্ষুর যোজক ঝিল্লীর প্রদাহ (Conjunctivitis) এবং উহা লালবর্ণ বাহা নাকের নিকটবর্ত্তী কোণেই অধিক হয় ; বাণির কণা প্রবেশ করিলে বেরূপ হয়, চক্ষে সেরূপ যাতনা যাহা সন্ধ্যার সময় এবং রাতে বুদ্ধি হয় এবং উহার সঙ্গে চক্ষু দিয়া জল পড়া (আস্, কষ্ট্, পাল্-স্) ; প্রাতঃকালে এবং সন্ধ্যার সময় চক্ষু ও চক্ষুর পাতায় আলাহুতব এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে উহাতে শুক ও চাপাবোধ (আলাম্, আস্, সাল্-ফ্) ; শৈশবাবস্থার চক্ষু প্রদাহের পর চক্ষুর পাতায় দানার জ্ঞান কুক্ষুদী (Granular lids) ; চক্ষে, প্রধানতঃ ডাইন চক্ষে, চুলকানি, কামড়ানী এবং স্ফু-স্ফুদী ; চক্ষুর নাকের নিকটবর্ত্তী কোণে চুলকানি, সূচীবিধানের জ্ঞান বেদনা এবং স্ফু-স্ফুদী ও

উহার সঙ্গে সঙ্গে চক্রে ঝাপসা দেখা; চক্ষুর উপরের পাতার গম্ভীরতা; জ্বর জ্বরীবোধ (কষ্ট, জেল্‌স); রক্তিতে চক্ষুর পাতার পাতার লালিরা থাকি (কষ্ট, প্রাক্, লাইকোপ্, মার্ক্, রাস্টন্স, পাল্‌স, সাল্‌ক্) এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে চক্রে চাপাবোধ এবং টাটানি; চক্ষুর নাকের নিকটবর্তী কোণের মধ্য-দেশে পক্ষীর জ্বর ফুড়ী বা স্বীতি (Pterygium); চক্রে আলোক সহ না হওয়া (Photophobia) (একন্, বেল্, মার্ক্, সাইলিসি, সাল্‌ক্)।

কর্ণ । ডাইন কর্ণের মধ্যে পটহের (Tympanum) নিকটবর্তী স্থানে শ্রুতী বিধানের জ্বর অভ্যস্ত যাতনা; কর্ণশূল, বিশেষতঃ শিক্ত বা ছোট বালক বালিকাগণের (পাল্‌স)।

নাসিকা । নাকের মধ্যে জ্বালা এবং টাটানি; নাক বন্ধ হইয়া থাকে (নাস্‌বন্, সাইলিসি)।

মুখমণ্ডল । মুখমণ্ডল পর্যায়ক্রমে লাল এবং শিউ হই (একন্); মুখমণ্ডলের হাড়ে ছিঁড়িয়া কেবার জ্বর বেদনা বা টাটানি; ওষ্ঠ শুষ্ক এবং কাটাযুক্ত (আস্, ব্রাই)।

মুখগহ্বর এবং গলার মধ্য । দাঁতের গোড়ার কসিরা ধরা, ছিঁড়িয়া কেবার জ্বর, নপদসিরা বেদনা; সামান্ত স্পর্শ করিলে বা চাপিলেই মাড়ি দিয়া রক্ত পড়ে (কার্কো-বেজ্, মার্ক্, নাইট্রিক্-আস্, কন্স); মুখে প্রচুর গালের স্কার এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে গালের মধ্যে হান্না দেওয়ার জ্বর হুড়্‌হুড়ী। গলার মধ্যে শুকাইত্ব এবং গলার মধ্যের পশ্চাৎ দেশে স্ফোর স্কার; গলার মধ্যে ক্ষত, বেদনা এবং টাটানি; গলার মধ্যে ছিঁড়িয়া কেলা এবং কসিরা ধরার জ্বর বেদনা, বাহ্য গলার মধ্যের পশ্চাৎদিকেই অধিক অগ্রভূত হয় এবং বাহ্য কোন দ্রব্য গিলিবার সময় অধিক অগ্রভূত হয়, কিন্তু চোক গিলিতে বিশেষ অগ্রভূত হয় না।

পাকস্থলী এবং উদর । মুখে গোলতা স্বাদ (নেট্রোমিউর, মার্ক্); হঠাৎ বাহ্য কোন বস্তুই নিবারণ করা যায় না (ব্রাই, কেরান্, আরোড্, লাইকোপ্); ক্ষুধা শূন্যতা (আলাস্, আস্); পিপাসা এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে হাতের তালুতে জ্বালাহুত্ব; টক বা কাঠ উদ্‌গার (কার্কো-বেজ্, কন্স, নাস্‌বন্); মিষ্টদ্রব্য খাইলে বৃক জ্বালা; বমনোদগেগ এবং বমন

(আন্টি-টার্ট, ইপিকাক্, লোবিলিয়া); কাঠবমী হইতে হইতে গলা দিয়া রক্ত মিশ্রিত স্বেদ্য নির্গমন; পাকস্থলী হইতে গলার মধ্য পর্য্যন্ত যেন ক্রমি বেড়াইতেছে এরূপ অমৃত্ত্ব হইয়া, বাহার দরুণ কাশির উদ্রেক হয়; পাকস্থলী এবং উদরোৰ্দ্ধ প্রদেশে জ্বালামুগ্ধব (আস্, ক্যাস্, আইরিন্)।
 • আহারের পর উদরের দুই পার্শ্বে খিল ধরার জ্বায বেদনা এবং খাঁস কষ্ট; উদরের ডাইন পার্শ্বে ঘাটিয়া ধরা (আস্, ব্রাই, চায়না, মার্ক্, সাল্ফ্); উদর পূর্ণ, ক্ষীত এবং বিস্তৃত; আহারের পর উদরে চাপাবোধ এবং কসিয়া ধরা (কার্কো-বেজ্, চায়না, নাক্স-বম্); অস্ত্রে অধিক পরিমাণে দ্রুতিত বায়ুর সঞ্চার হেতু শূলবেদনা, সঞ্চার সময়ই বাহার অধিক উদ্রেক হয়; উদরের মধ্যে গড়্ গড়্, কল্ কল্ শব্দ হওয়া বা পেট গুলিরে উঠা (আলোজ্, লাইকোপ্, সাল্ফ্); শুষ্কতার দিয়া বারবার উচ্চ স্বৰ্গজ-যুক্ত দ্রুতিত বায়ু নিঃসরণ (আলোজ্, ব্রাই); উদরে ছুরী দিয়া হানার জ্বায প্রবল বেদনা।

মল এবং মলদ্বার। শুষ্কতারে জালা এবং চুলকানি (সাল্ফ্); ক্রমি থাকিলে যেরূপ হয়, শুষ্কতারে সেক্ষণ হামা দেওয়ার জ্বায হৃদ্বৃদ্ধী (সিপিরা, স্পাইজেল্); অনিবার্য কোষ্ঠবদ্ধ; মল সরু কঠিন শুষ্ক ভাঙ্গা, নেত্র (আমন্-মিউর, নেট্রাম্-মিউর) বাহা অতি কষ্টে নির্গত হয় বা সজোরেরে যেন না বিলে নির্গত হয় না; কোষ্ঠ পরিষ্কার হয় না (সাল্ফ্)।

মূত্রযন্ত্র। বাম মূত্রকোষ প্রদেশে চাপা বোধ; মূত্রাধারে প্রবল চাপ পড়া; প্রাতঃকালেই মূত্র ঘোলাটিয়া, চিকণ মাটির রঙ্গের জ্বায; পঞ্চাংগিকে হেনিয়া বসিলেই কেবল মূত্র ত্যাগ করিতে পারা যায়; চলিবার সময়, কাশিবার সময় এবং হাঁচি দেওয়ার সময় অসাড় মূত্র নির্গমন (কষ্ট্, নেট্রাম্-মিউর, সাল্ফ্)।

জননেন্দ্রিয়। পুরুষের পুরুষাঙ্গ অনেকক্ষণ ধরিয়া খাড়া হইয়া থাকে; অণুকোষে কসিয়া ধরার জ্বায বেদনা বা বাতনা বাহা শুক্রনিঃসারক মূত্র (Spermatic Cord) পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়; খেঁড়িয়া যাইয়া বা ঘোচড়াইয়া পড়িয়া একশিরার ব্যারাগ (Orchitis); একটা অণুকোষ উপ-রেণু দিকে আকৃষ্ট; সহজেই স্ত্রী সহবাসের ইচ্ছার উদ্রেক হয়; স্ত্রীসহবাসের

সময় সামান্য আলিঙ্গনেই ধাতু নিঃসরণ, অথবা ধাতু অনেক কষ্টে নির্গত হয় বা ধাতু একেবারেই নির্গত হয় না ; কোন কারণ ব্যতীত প্রচুর পরিমাণে ধাতুনিঃসরণ ; শুক্রকরণ (Spermatorrhoea) ; যন্ত্র না দেখিয়াও অগাড়ে ধাতু নিঃসরণ, মুখমণ্ডল শিটা, যেন বলিয়া যায় এবং চক্ষু নীলের রেখা দ্বারা পরিবেষ্টিত। রাত্রিতে জ্বীলোকের পুরুষ সহবাসের অতিরিক্ত বা অনিবার্য ইচ্ছা, যাহা গৃহ করিতে না পারিয়া বোজী হস্তমৈথুন করিবার প্রয়াস পায় ; নিয়মিত সময়ের অনেক পূর্বে রজঃস্রাব অথবা একবারে রজঃ-রোধ ; কষ্টকর রজঃস্রাব এবং বাধকের বেদনা (Painful Menstruation) ; রজঃস্রাবের সময় বড় বড় রক্তের চাপ নির্গমন ; শ্বেত প্রদর এবং তদ্রূপ বোনিঘার দিয়া স্লেয়ার স্রাব গাঢ় পদার্থ নির্গমন ; বোনিঘার দিয়া রক্ত মিশ্রিত স্লেয়ার স্রাব পদার্থ নির্গমন (আলাম) ; রজঃস্রাবের পর ক্ষতকারক শ্বেত প্রদর নিঃসরণ (পাল্‌স) ; যোনির চুলকানির রূপ হস্তমৈথুনের ইচ্ছা হয় ; বাম ডিম্বকোষে ছিদ্র করার স্রাব বেদনা, চাপিলে যাহার উপশম হয় এবং যাহা কেবল রজঃস্রাবের সময়ই একবারে থাকে না ।

শ্বাস ফল। বৃক্ জ্বালা এবং টাটানির স্রাব বেদনা ; বৃকের ডাইন পার্শ্বে স্তম্ভবিধানের স্রাব ঘূর্ণশ্বে বেদনা ; বৃকে আঁটা এবং কষ্ট বোধ ; শুক আক্কেপিক কাশি (হায়োস্, সিলিয়া, সাইলিস, সাল্‌ক্) এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে গলা দিয়া রক্ত মিশ্রিত স্লেয়া উঠা ; কাশির সময় রোগী (শিশু) পুরুষাক বা বোনিতে হাত রাখে ; রজঃস্রাবের সময় এবং উহার পূর্বে কাশি, মিষ্ট দ্রব্য পাইলে যাহার বৃদ্ধি হয় ।

জ্বংপিণ্ড । জ্বংপ্রদেশে কসিয়া ধরা বা স্তম্ভবিধানের স্রাব বেদনা বা ব্যতনা ; জ্বংস্পন্দন, কিন্তু তদ্রূপ বিশেষ কষ্ট অনুভূত হয় না ।

ঘাড় এবং পৃষ্ঠদেশ । ঘাড় এবং পৃষ্ঠদেশের পেশীতে বেদনা ও তদ্রূপ ঘাড় এবং পৃষ্ঠদেশ সকালনে অগতি ; বলিয়া লিখিলে বা অন্য কোন প্রকারের পরিশ্রমে ঘাড়ের শ্রান্তিবোধ ; চলিবার সময় কোমরের পশ্চাৎদেশে পেন্টলিয়া ব্যাঘরা বা মোচড়াইয়া পড়ার স্রাব বেদনা ; ডাইন স্কন্ধাহির নীচে চাপিয়া বা কসিয়া ধরার স্রাব বেদনা ; বলিয়া থাকিলে বা চলিয়া বেড়াইলে পৃষ্ঠদেশ এবং কোমরের পশ্চাৎভাগে বাটিয়া ধরার স্রাব প্রবল বেদনা ।

অঙ্গ প্রত্যঙ্গ । সন্ধি শক্ত হয় বা উহা নোয়ান যায় না এবং সন্ধি-
ঠিক উপরিতাগে আড়া আড়ি ছুরী বিধানের জ্বায় প্রবল বেদনা ; অঙ্গ
প্রত্যঙ্গে হুর্ল ও আন্তিবোধ এবং মোচড়াইয়া পড়িলে বা বেঁতজিয়া
গেলে যেমন হয়, সেময় অমুভূত হয় ; হাত পায়ের পাতা ঠাণ্ডা ; সমুদয়
অঙ্গ প্রত্যঙ্গে কসিয়া ধরা বা ছিঁড়িয়া ফেলার জ্বায় বেদনা (জাই, কলোস্,
পাল্‌স্, সাল্‌ফ্) ; সমুদয় সন্ধিতে অত্যন্ত চুলকানি । লিখিবার সময় হাতে
হুর্ল বোধ এবং উহার কাঁপনি (নেট্রাম্-মিউর) ; ক্রীলোকের রজঃস্রাবের
সময় অঙ্গ প্রত্যঙ্গে উক্ত প্রকারের বেদনা ; হাতের আঙ্গুলের প্রথম সন্ধিতে
ছিঁড়িয়া ফেলার জ্বায় বেদনা । পায়ের শিরায় ক্ষতি এবং বিস্তৃতি
(হোমামেলিস্, পাল্‌স্) ; পায়ের শোধ (এপিস্, অর্স্, রাস্-টক্) ; উরু
এবং হাঁটুর পশ্চাৎভাগে চুলকানি ; নিম্নাঙ্গে ভারিবোধ ; পায়ের টিবিয়া
(Tibia) নামক হাড়ের আশ্রয় বেদনা ; পায়ের গোড়াড়ীর বিসর্পের জ্বায়
প্রবাহ ; পায়ের অস্থির রক্তের জ্বরিক সঞ্চালন (নেট্রাম্-মিউর) ; পায়ের
পাতার পক্ষাঘাত এবং উহার হুর্লতা ও কম্পন ; পায়ের গোড়াড়ীতে ক্ষত
হওয়া বা ছিঁড়করার জ্বায় বেদনা (পাল্‌স্) ; পায়ের আঙ্গুলের ফাঁকে ফাঁকে
ছাল উঠিয়া যাওয়ার জ্বায় ক্ষত (আগারিকাশ্, নাইট্রিক্-অ্যাস্, পাল্‌স্) ;
পায়ের পাতায় প্রচুর বর্ষ (নাইট্রিক্-অ্যাস্, মিলিয়া, সাইনিস, সাল্‌ফ্) ।

নিদ্রা । নিদ্রা দ্বারা রোগী আপনাকে আপনি স্তম্ভ মনে করে না ;
ভয়ানক স্বপ্ন দেখিয়া ঘুম ভাঙ্গিয়া যায় ; ঘুমেরঘোরে চমকিয়া বা চীৎকার
করিয়া কাদিয়া উঠা ; ঘুমেরঘোরে অঙ্গ প্রত্যঙ্গে হঠাৎ ধাক্কা লাগার জ্বায়
ঝাকনি ।

জ্বর । পৃথদেশের উপরিভাগ হইতে শীত কম্প নিম্নদিকে বিস্তৃত
হয় ; কাছিতে বর্ষ ।

ব্যবহার । রক্তাক্ততা জনিত অমুখ ; সন্ধির অবসন্নতা ;
ফোটক বিশিষ্ট রোগের ফোটক সম্পূর্ণ বিকাশ না পাইতে পারিলে ;
শোধ ; পক্ষাঘাত ; আকোপ বা কনবাল্‌সন্স্ ; বাত রোগ ; পায়ের আঙ্গু-
লের ফাঁকে ফাঁকে ছাল উঠিয়া যাওয়ার জ্বায় বা ; ক্রীলোকের পুরুষ
সহবাসের অত্যন্ত ইচ্ছা বা কামোদ্ভূততা ; শ্বেত প্রদর ; রজঃরোধ ; কষ্টকর

রক্তস্রাব এবং বাধকের বেদনা (Painful Menstruation) ; শুক্রকরণ (Spermatorrhoea) ; একশিরার ব্যসারাম (Orchitis) ; কোষ্ঠবদ্ধ ; কৃমি ; মেরুবস্তুর উত্তেজনা ; মস্তিষ্কের অসুখ ইত্যাদিতে জিকাম্ ব্যবহার্য্য ।

বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ । শরীরের নানা স্থানের গেম্বর স্পন্দন এবং ঝাকনি (আগারিকান্, সিকুটা) ; বেদনাদি যেন চর্ম এবং মাংসের মধ্যবর্তী স্থানে অনুভূত হয় ; রাজিতে ঘূমের অবস্থার সমুদয় শরীরে হঠাৎ ঝাকি লাগার ভায় অনুভূত হয় ; রক্তাক্ততা ; মস্তিষ্কের অবসন্নতা ; মধ্যাহ্নে আহ্বারের পর এবং সন্ধ্যার কিছুকাল পূর্বে, মন্যপানে, নান্দ-বমিকা থাকিলে, কিশোর কালীন, বসিয়া থাকিলে, উচ্চতাতে এবং রক্তস্রাবের সময় অসুখের বৃদ্ধি এবং ক্যান্ডার থাকিলে, বহির্কীরূতে এবং ষাণ্ডার সময় অসুখের উপশম ইত্যাদি জিকামের কতকগুলি বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ মধ্যে পরিগণিত ।

সমগুণ বিশিষ্ট ঔষধ । জিকামের কার্য্যের সঙ্গে কুপ্রাম্ এবং প্রাকামের কার্য্যের বিশেষ সাদৃশ্য আছে । এতদ্বির কোন কোন বিষয়ে ইহার কার্য্যের সঙ্গে কার্কো-বেলিটেবিলিস্, ইগ্নেনিয়া এবং নান্দ-বমিকার কার্য্যের সাদৃশ্য আছে ।

প্রতিষেধক ঔষধ । ক্যান্ডার, হিপার সাল্ফ্, ইগ্নেনিয়া ।

ডাইলুশন বিচার । ডাক্তার হিউজ্ (Dr. Hughes) বলেন যে, ইহার নিয় (১ম, ২য়, ৩য়) ক্রমের গুঁড়াই সচরাচর ব্যবহৃত হইয়া থাকে । শিশু গণের পীড়ায় ৩০ ডাইলুশন বিশেষ উপকারী ইহা পরীক্ষা করা দেখা গিয়াছে । ৩য় ক্রমের গুঁড়া, ৬, ১২ এবং ৩০ ডাইলুশনই লেখক অধিক ব্যবহার করিয়া থাকেন ।

তৃতীয় ভাগ ।

তৃতীয় শ্রেণীর ঔষধ

অর্থাৎ

যে সকল ঔষধ ১ম এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর ঔষধ অপেক্ষা

কম ব্যবহৃত হইয়া থাকে ।

অসিডাম্ ফ্লুরোরিকাম্, - ফ্লুরোরিক্ অসিড্, - ফ্লুর-অ্যাস্

(ACIDUM FLUORICUM, — FLUORIC ACID, — FLUOR-AC.)

কোন এক বিষমত হোমিওপ্যাথিক ঔষধালয় হইতে আদিত ফ্লুরোরিক্ অসিড্ ক্রয় করিয়া উহা হইতে ১ ভাগ লইয়া ৯ ভাগ চুয়ান জলে মিশাইলে ১ম দশমিক ক্রমের আরোক প্রস্তুত হয়। এই নিয়মে দ্বিতীয় এবং তৃতীয় দশমিক ক্রম পর্যন্ত চুয়ান জলে প্রস্তুত করিয়া ১ম, ২য় এবং ৩য় ক্রম পর্যন্ত গুটাপার্চা (Guttapercha) নির্মিত শিশিতে রাখিবে। ঐষ ডাইলুশন ডাইলুট্ স্পিরিটে এবং ডংপর রেক্টিফাইড্ স্পিরিটে ডাইলুশন প্রস্তুত করিতে হয়।

সাধারণ ক্রিয়া । সমুদয় শরীরের উপরই ইহার কার্য দেখিতে পাওয়া যায়, বাহ্যিক লক্ষণ স্নায়িক সিস্টী, গ্রন্থি, অস্থি ইত্যাদি প্রবলরূপে আক্রান্ত হইয়া শরীরের বিকৃত পরিপোষণের দ্বার অবস্থার লক্ষণাদি প্রকাশ পাইয়া থাকে।

সাধারণ প্রাকৃতিক লক্ষণ ।

মন । অসাধারণ একগুঁয়েমী; সকল বিষয়েই নির্ভর এবং স্বয়ং

বাঁহা করা যায় তাহাতেই মনের তৃপ্তি ; চিন্তা উৎপাদক ভাবের উদয় এবং সর্বদা ভয়ের আশঙ্কা ।

মস্তক । কপালের দুই পার্শ্বে চাপিয়া ধরার দ্বারা বেদনা বাঁহা মধ্য-
বেশ হইতে বহির্দেশে বিস্তৃত হওয়ার দ্বারা অল্পভূত হয় ; মাথার পশ্চাৎ-
ভাগে চিন্মা এবং চাপাবোধ ; মাথার চুল পড়িয়া যায় ; কর্ণের পশ্চাৎবেশের
হাড়ে পোকাকার ধরা (Oaries) ; মাথার হাড়ের ঘোড়ে ঘোড়ে আগাগোড়া
বেদনা ।

কর্ণ । উভয় কানেই অসহ্য চুল্কানি ।

চক্ষু । মনে হয় যেন কেহ সজোরে চক্ষুর পাতা খুলিয়া ফেলে,
এবং তদ্রূপ মনে হয় যেন চক্ষের মধ্যে দিগ্ধ বাতাস বহিতেছে ; বালি
প্রবেশ করিলে যেরূপ হয়, চক্ষের মধ্যে সেরূপ অল্পভূত হয় (শেষ, হিপ-
সাল্‌ফ, সাল্‌ফ ।

নাসিকা । তরল সর্দি এবং নাক দিয়া জলবৎ তরল প্রচুর স্রোতা
নির্গমন, নাসিকা লাগবণ, ক্ষীত এবং প্রদাহযুক্ত ।

মুখগহ্বর এবং গলার মধ্য । দাঁতে উচ্ছাসভব ; মুখে অতি-
রিক্ত পরিমাণে লালের সঞ্চার ; প্রাতঃকালে জিহ্বা এবং দাঁত স্রোতা দ্বারা
আবৃত ; দাঁত শীঘ্র শীঘ্র পোকাকার ধরে (Caries) ; জিহ্বার চতুর্দিক গভীর
ক্ষাতিযুক্ত এবং উহার মধ্যভাগে বৃহৎ আকারের পচাযুক্ত ক্ষত । সামান্য
ঠাণ্ডা লাগিলেই গলার মধ্য প্রদাহযুক্ত হইয়া উহাতে বেদনার উদ্বেক হয়
এবং তদ্রূপ কোন প্রবীণিবার ব্যাধাত জন্মে ; গলার মধ্যের সঙ্কোচন
এবং উহাতে আঁটাবোধ ; প্রাতঃকালে গলা খেকুর দিলেই গলা দ্বারা
রক্তমিশ্রিত স্রোতা নির্গত হয় ।

মুখমণ্ডল । দ্রুতগোচ্য বালক বালিকার মুখমণ্ডলে শুষ্ক খোঁসা এবং
চুলকানি বিশিষ্ট ক্ষুদ্রী ; মুখমণ্ডল এবং কপালের চর্মে সপূর্ব ব্রণের দ্বারা
ক্ষুদ্রী ; শৈশবাবস্থার পরমীর ব্যারাম (Infantile Syphilis) ।

পাকস্থলী এবং উদর । ক্ষুধা সর্বাংশেই প্রবল ; অত্যন্ত নিশাল
এবং ঠাণ্ডা প্রবীণ পানের ইচ্ছা ; বারম্বার উল্গার উঠা ; বমনোদ্বেগ, উল্গার
উঠা এবং অগ্নিবোধ ; আঁটারের সামান্য অনিয়ম হইলেই বমন এবং

আসিডাম্ ফ্লুরোরিকাম্ ।

৫৮৫

অধিক পরিমাণে মল ভেদ এবং দাঁতের পূর্বে পেটকামড়ানী ; উদরোৰ্দ্ধ প্রদেহে পূর্ণ এবং চাপাবোধ ; আহারের আভ্যন্তরিক কালে পাকস্থলীতে ভারিবোধ । ব্যায়ামের শুষ্কতার দিয়া দূষিত বায়ু নিঃসরণ এবং উদগার উঠা, যাহার দরুণ রোগী অনেক উপশম অমুভব করে ; উদরের শোথের জায় ক্ষীতি এবং তদরূপ উদরে কসিয়া বা ঘাটিয়া ধরার জায় অমুভূত হওয়া ।

মল । কোষ্ঠবদ্ধ ; মল কঠিন ; বিলম্বে বিলম্বে মল ত্যাগ (বাই) ।

মূত্রযন্ত্র । প্রচুর পরিমাণে ফিকা রঙ্গের পরিষ্কাররূপে মূত্রত্যাগ, যাহার দরুণ রোগী উপশম অমুভব করে ; মূত্র ত্যাগের সময় এবং উহার পর মূত্রনালীতে অসহ্য জ্বালামুভব (ক্যাছ) ।

জননেন্দ্রিয় । পুরুষের স্ত্রীসহবাসের অতিরিক্ত ইচ্ছা এবং স্নাত্তিতে পুরুষের অত্যন্ত খাড়া হয় ; স্ত্রীসহবাসের সময় অত্যন্ত সুখবোধ এবং অনেকক্ষণ ধরিয়া স্ত্রীসহবাসের ইচ্ছা ; স্ত্রীসহবাসের সময় ধাতু অনেক গোণে নির্গত হয় বটে, কিন্তু সুখবোধ হইলে পরিষ্কাররূপে ধাতু নির্গত হয় এবং ধাতু নিঃসরণের পর কোন প্রকারের অসুখ অমুভূত হয় না । স্ত্রীলোকের নিয়মিত সময়ের অনেক পূর্বে রজঃস্রাব ; প্রচুর বা অতিরিক্ত পরিমাণে রজঃস্রাব ; রক্ত গাঢ় এবং চাপ চাপ, থানা থানা ; ক্ষতকারক স্বেতপ্রদর নিঃসরণ এবং তদরূপ ঘোনিষারের চুলকানি ; স্তনের বোটা ক্ষত ও ফাটা-যুক্ত এবং উহাতে চুলকানি ।

অঙ্গ প্রত্যঙ্গ । ডাইন্ স্কন্ধের সন্ধিতে বেদনা যাহা হাতের আঙ্গুলের দিকে বিস্তৃত হয় এবং তদরূপ মনে হয় যেন বাহ্য মধ্য দিয়া বাতাস বহিয়া যাইতেছে ; বাম হাতের তর্জনীতে বেদনা ; উক্ত অঙ্গুলীর মধ্যদেশে আগাগোড়া বেদনা ; নখ মট্কা হয় বা সহজে ভাঙ্গিয়া যায় ; আঙ্গুলহাড় (Whitlow) ; নখকোণী (Onychia) । পা হইতে উদর পর্যন্ত স্থানের শোথের জায় ক্ষীতি ; পায়ের পাতার তলায় জ্বালা এবং উহাতে হঠাৎ বিধানের জায় অমুভূত হওয়া ; পায়ের পাতা উষ্ণ এবং জ্বালামুক্ত ; পায়ের আঙ্গুলের কঁাকে কঁাকে ক্ষত ; পায়ের শিরার ক্ষীতি এবং বিস্তৃতি ।

নিদ্রা । সন্ধ্যার সময় নিদ্রাবেশ বা ক্লিমান ; নিদ্রানুভূতি এবং

নিজার ইচ্ছা শূন্যতা ; অল্প কালের জন্য নিজা হইলেও রোগী আপনাকে আপনি জ্ঞান মনে করে ; শেষ রাত্রিতে ভোর হওয়া হওয়া সময়ে স্বপ্ন দেখা ।

জ্বর । সমুদয় শরীর উষ্ণ এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে বমনোদ্বেষ্ট ; প্রচুর পরিমাণে টক এবং হর্গন্ধযুক্ত ঘর্ম্ম ; অপরাহ্নে প্রচুর ঘর্ম্ম ।

ব্যবহার । শরীরের যে প্রকার পরিপোষণের অভাবে সাইলিসিয়া, ক্যাকেরিয়া ইত্যাদি ব্যবহার্য্য, সেপ্রকার অস্থি ফ্লুয়োরিক্ আসিড্ ও ব্যবহার্য্য । অস্থি, বিশেষতঃ লম্বা অস্থি অস্থ্য ; নালী বা (Fistula) ; আঙ্গুল হাড় (Whitlow) ; নখকোণী (Onychia) ; অজীর্ণ রোগ ; বহুমূত্র (Diabetis) ; শিরার ক্ষীতি এবং বিস্তৃতি ; পারা (Mercury) এবং সাইলিসিয়ার (Silicea) অপব্যবহার জনিত অস্থ্য, হুইস্কি (Whisky) নামক মদ্যপানে অত্যাচার জনিত যকৃতের প্রদাহ এবং কঠিনতা ইত্যাদি অস্থ্যে ফ্লুয়োরিক্ আসিড্ ব্যবহার্য্য ।

বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ । ক্লান্ত না হইয়া পেশী সঞ্চালনের ক্ষমতা ; অঙ্গসংযোগ বা গা মাটিমাটি করা ; শক্তির হানি বা বিনাশ ; কোন ক্ষত শুকাইয়া যাইয়া উহার দাগের চতুষ্পার্শ্ববর্তী স্থান লালবর্ণ হয় এবং অত্যন্ত চুলকায় । বৃদ্ধ বয়সের অস্থ্য ; গরমীর ব্যারাম বা পারাজনিত অস্থ্যের দরুন অকালে বৃদ্ধাবস্থা প্রাপ্ত হওয়া । প্রাতঃকালে, বিশ্রামে, বসি অবস্থা হইতে উঠিলে, দাঁড়াইলে, বসিয়া থাকিলে অস্থ্যের বৃদ্ধি এবং নড়াচড়া এবং চলিবার সময় অস্থ্যের উপশমন ইত্যাদি এই ঔষধের কতকগুলি বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ মध्ये পরিগণিত ।

সমগুণবিশিষ্ট ঔষধ । সাইলিসিয়া, আসিনিয়, ক্যাকেরিয়া-কার্প, ক্যাকেরিয়া কফরেটা, ফস্ফাস্, মার্কিউরিয়াস্, সাল্ফার ইত্যাদি ঔষধের কার্যের সঙ্গে ফ্লুয়োরিক্ আসিডের কার্যের সাদৃশ্য আছে ।

ডাইলুশন বিচার । এম এবং ততোধিক দশমিক ক্রমের আরোক নামের করিয়া পুরাতন উদরাময়, গরমীর ব্যারাম জনিত জ্বর এবং গলায় বদনের ক্ষত ও অস্থি পোকায় ধরা (Caries) ইত্যাদি পরবর্তী পীড়াতে বিশেষ উপকার পাওয়া যায় । আঙ্গুল হাড়, নখকোণী, নেত্র এবং দন্তনালী,

শিরার ক্ষীণি এবং বিস্তৃতি, মাথার চুল পড়িয়া যাওয়া ইত্যাদি অন্তর্গত ৬
হইতে ৩০ ডাইলুশন দ্বারা বিশেষ ফল পাওয়া যায় ।

আসিডাম্ অক্সালিকাম্,-অক্সালিক্ আসিড্,-অক্স-আস্

(ACIDUM OXALICUM,-OXALIC ACID,-AC. OX.)

কোন এক বিষন্ত হোমিওপ্যাথিক ঔষধালয় হইতে আদত চাকা অক্সালিক্ আসিড্ ত্রয় করিয়া উহার এক ভাগ, ৯ ভাগ বেক্টিকাইড্ স্পিরিটে (১ গ্রেইন্ অক্সালিক্ আসিড্, ৯ ফোঁটা (মিনিম্) বেক্টিকাইড্ স্পিরিটে) মিশাইয়া ১ম দশমিক ক্রমের আরোক প্রস্তুত হয় । ১ম দশমিক ক্রমের ১ ফোঁটা, ৯ ফোঁটা বেক্টিকাইড্ স্পিরিটে মিশাইয়া যথানিয়মে ২য় দশমিক ক্রমের আরোক প্রস্তুত হইয়া থাকে । এরূপ ৩য় এবং ততোধিক দশমিক ক্রমের আরোক প্রস্তুত হইয়া থাকে । এতদ্বির যথানিয়মে স্বগার অব্ মিক্সের সঙ্গে মিশাইয়া ইহার গুঁড়াও প্রস্তুত হইতে পারে ।

সাধারণ ক্রিয়া । মস্তিষ্ক এবং কসেরুকা মজ্জার উপর ইহার কার্য্য অতি প্রবল । মস্তিষ্কের উপর ইহার কার্য্য আরো প্রবল, যাহার দরুণ মস্তিষ্ক এবং কসেরুকা মজ্জার মেরু (Cerebro-spinal axis) কার্য্য করিবার ক্ষমতা বিনাশ করিয়া ইহা জীবন হঠাৎ বিনাশ করিয়া থাকে । ইহা প্রবল আক্কেপিক অস্থি উৎপাদন করে, যাহার দরুণ বুকের পেশীতে আক্কেপ অধিক অগ্ৰভূত হয়, অঙ্গ প্রত্যঙ্গ শক্ত হয় বা উহা নোয়ান যায় না, আক্রান্ত স্থানে স্পর্শগান থাকে না, স্নায়ুশূল এবং পক্ষাঘাতের লক্ষণাদি প্রকাশ পায় । ইহা শ্বাসযন্ত্রের প্লেগ্মিক ঝিল্লী আক্রমণ করিয়া উহার প্রদাহ উৎপাদন করে এবং অধিক মাত্রায় ইহা দ্বারা বিযাক্ত হইলে আহার-বহা নালীর প্লেগ্মিক ঝিল্লী আক্রান্ত হইয়া প্রদাহযুক্ত হইয়া থাকে ।

সাধারণ প্রাকৃতিক লক্ষণ ।

মন । চিন্তা করিয়া কোন বিষয়ে ভাব জুটাইবারে অশক্তি ; মনের অন্ত্যস্ত চঞ্চল্য ; শীঘ্র শীঘ্র চিন্তা এবং কার্য্য করা (কফিয়া) ; বেদনাদির

বিষয় চিন্তা করিলেই যেন বেদনাদির (জীলোকের) পুনরাব্রূষণ হয় (ব্যারাইটা-কার্ক) ।

মস্তক । মাথাঘোরা; শরন করিয়া থাকিলে মাথা কিম্ব কিম্ব করে; মাথায় খালি খালি বোধ; মস্তিষ্ক একবারে রক্তশূন্য হইলে ঘেরূপ হয়, সেরূপ মুচ্ছার ভাব; কপাল এবং মাথার উপরিভাগে যুগ্মবেদনা এবং ভারিবোধ; কানের পশ্চাৎভাগে ক্ষুদ্র বিদ্যাইরা রাখিলে ঘেরূপ হয়, মাথায় সেরূপ কসিয়া বা চাপিয়া ধরার দ্বারা বেদনা ।

চক্ষু । পুস্তকাদি পড়িবার সময় অক্ষরগুলি যেন জ্বলিয়া যায়; চক্ষে অন্ধকার দেখা, উহার সঙ্গে সঙ্গে মাথাঘোরা এবং ঘর্ষ; উভয় চক্ষুর কোটরের মধ্যে বেদনা, বাম চক্ষুর কোটরেই যাহা অধিক অনুভূত হয় ।

নাসিকা । হাঁচি; সর্দি এবং নাক দিয়া প্রচুর পরিমাণে স্লেখা নির্গমন; নাকের ডাইন পার্শ্ব লালবর্ণ, উজ্জ্বল এবং ক্ষীত যাহা নাকের আগা হইতে আরম্ভ হয় (বেল্) ।

মুখমণ্ডল । মুখমণ্ডল শিটা বা ফিকা এবং নীল বর্ণ; মুখমণ্ডলে উষ্ণতা; মুখমণ্ডলে পূর্ণবোধ; মুখমণ্ডল ঘর্ষিত (টেবেকাম, বিরেট্‌আন্) ।

মুখগহ্বর এবং গলার মধ্য । মাড়ি হইতে রক্ত পড়া এবং মাড়ির স্থানে স্থানে বেদনা; মাড়িতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ক্ষত; জিহ্বা ক্ষীত, বেদনায়ুক্ত, লালবর্ণ, শুষ্ক এবং জ্বালাযুক্ত; জিহ্বা ক্ষীত এবং গাঢ়, সাদা লেপযুক্ত; মুখে টক স্বাদ (ক্যাক্স-কার্ক, ব্যাগ্-কার্ক, নাক্স-বন্); মুখে প্রচুর পরিমাণে লাল উঠা (আয়োড, মার্ক, নাইট্রিক-ক্লোরাইড); গলার মধ্য এবং পাকস্থলীতে জ্বালা; গলার মধ্যে ছাল উঠা বা চাচিয়া কেলার দ্বারা অনুভূত হয়; গলার মধ্যে গাঢ় স্লেখার সঞ্চার; গিলিতে অত্যন্ত কষ্ট বা বেদনানুভব ।

পাকস্থলী এবং উদর । ক্ষুধার বৃদ্ধি; ক্ষুধা এবং স্বাদ একবারে থাকে না; পিপাসা এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে মাথাঘোরা, ক্ষুধাশূন্যতা, বমনোদ্যোগ এবং শূল বেদনা; বৃকজালা, সঞ্চার সময় যাহার বৃদ্ধি হয়; কাঠি উল্গার বা টক উল্গার উঠা; প্রত্যেকবার আহারের পর উল্গারে স্বাদশূন্য বায়ু নিঃসরণ; বায়বীয় হিষ্কা (ইথেন্স, হায়োস্); বমনোদ্যোগ এবং বায়-

হার বমন; পেটে খালিবোধ, বাহার দৰুণ রোগী বারবার বাইতে বাধ্য হয়; পাকস্থলীর মধ্যে চাপিয়া ধরার ভায় প্রবল বেদনা; পাকস্থলীর মধ্যে জ্বালাহুতব (অসি, কলচ, মার্ক-কর); পাকস্থলীতে অত্যন্ত টাটানি, বাহার দৰুণ সামান্য স্পর্শনেই পাকস্থলীতে ভয়ানক বেদনার উদ্রেক হয়; বহুত প্রদেশে হৃদী বিধানের ভায় বেদনা, দীর্ঘ নিশ্বাসে বাহার উপশম হয়; উদরের বাম পার্শ্বে ক্রমাগত বেদনা এবং হৃদী বিধানের ভায় বাতনা; নাভিপ্ৰদেশে শূল বেদনার ভায় বেদনা (কলোস); অতি কষ্টে গুহ্বার দিয়া দূষিত বায়ু নির্গত হওয়া; উদরে জ্বালা এবং বেদনা।

মল । অনবরত অসাড়ে বা অনিচ্ছাপূর্বক মল নির্গমন; মল কালচে, কাদার ভায় এবং পরিমাণে অধিক; রক্তমিশ্রিত স্লেয়া ভেদ; কাকি পান করিলেই উদরাময়; শয়ন করিলেই উদরাময় পুনরায় আরম্ভ হয়; গুহ্বে চাপিয়া ধরার ভায় বেদনা এবং শূলানি; কৌণপাড়া।

মূত্রযন্ত্র । মূত্রকোষ প্রদেশে বেদনা; বারবার প্রচুর পরিমাণে পরিকার শুকনা ঘানের রসবিশিষ্ট মূত্র ত্যাগ; মূত্রের সঙ্গে অক্সালেট্‌স্ থাকে (Oxaluria); মূত্রনালীতে ক্ষত হওয়ার ভায় জ্বালা; মূত্র ত্যাগের সময় পুরুষদের মাথায় বেদনাহুতব।

জননেন্দ্রিয় । পুরুষের জীসহবাসের অত্যন্ত ইচ্ছা; অণুকোষে ভাবি বোধ এবং উহাতে ঘোচড়াইয়া পড়া বা থেঁতলিয়া যাওয়ার ভায় বেদনা; শুক্রনিঃসারক মূত্রে (Spermatic Cord) আগাগোড়া খোঁচা বিধার ভায় বেদনা (ক্রিমোটস, স্পঞ্জ)।

শ্বাসযন্ত্র । কণা বলিবার সময় হবভঙ্গ এবং কণ্ঠনালীতে যেন স্লেয়া সঞ্চিত রহিয়াছে এরূপ অহুত্ব হয়; প্রবল পরিশ্রমে অনবরত শুক কাশি; শ্বাস কষ্ট এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে কণ্ঠনালীতে সঙ্কোচক বেদনা এবং উহাতে সাঁই সাঁই শব্দ হওয়া; ডাইন দিকে যন্ত্রণাদি অধিক অহুত্ব হয়; হৃৎস্পায়ুশূল; মধ্যে মধ্যে উপশম বোধ; বাম হৃৎকুসে এবং হৃৎপিণ্ডে হৃদী-বিধানের ভায় প্রবল বেদনা যাহা উদরোৰ্দ্ধ প্রদেশ পর্য্যন্তও বিস্তৃত হয়; হৃৎস্পায়ুশূল (Angina Pectoris); বুকে ভাবিবোধ এবং জ্বালাহুত্ব যুল্‌যুশে বেদনা।

হৃৎপিণ্ড এবং নাড়ী । হৃৎপ্রদেশে খোঁচা বিধার দ্বায় বেদনা ; হৃৎস্পন্দন, যাহার দরুণ মনে হয় যেন হৃৎপিণ্ড অনবরত ধড়ফড় করিতেছে ; নাড়ী ক্রতগামী, সূক্ষ্ম ও নুণ্ডপ্রায় এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে সমুদয় শরীরে শীতল ও চট্‌চটিয়া বর্ষ (টেবেকাম, বিরেট্-আৰ্) ।

গ্রীবা এবং পৃষ্ঠদেশ । হই স্বকের মধ্যবর্তী স্থানে বেদনা যাহা কোমর পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয় ; বুক হইতে স্ফীতি পর্য্যন্ত স্ত্রী বিধানের দ্বায় অনুভূত হয় ; পৃষ্ঠদেশে প্রথমে বেদনা যাহা ক্রমে ক্রমে উরুদেশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয় এবং তদরূপে অত্যন্ত কষ্টানুভব বা মাতনা, যাহার দরুণ উপশম পাণ্ডার আশায় রোগী রানঘার পাশে পলিবর্জন কবে বা নানা ভাবে থাকে ও কোঁপায় বা কোঁকার ; কঁচুকের দুর্বলতা বা তাই ইত্যাদি নিম্ন শাখা পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয় ; পৃষ্ঠদেশে এত দুর্বল হইয়া পড়ে যে উহার দরুণ রোগী মোজা হইয়া দাঁড়াইতে বা বসিতে পারে না ; কপেরুকা মর্জ্জাব প্রদাহের দরুণ পক্ষাঘাত এবং অঙ্গ প্রত্যঙ্গ শক্ত হয় বা উহা নোয়ান যায় না ; মধ্যে মধ্যে শ্বাস কষ্ট ।

অঙ্গ প্রত্যঙ্গ । অঙ্গ প্রত্যঙ্গে এক বিশেষ প্রকৃতির অবশবোধ । স্বক হইতে হাতের আঙ্গুলের আগা পর্য্যন্ত অবশবোধ ; বাহুতে ছুরী দিয়া কাটার দ্বায় বেদনা ; হৃৎস্বায়শূল ; সজোবে খেঁতলিয়া গেলে বা মোচড়াইয়া পড়িলে যেরূপ হয়, ডাইন মণিবন্ধে সেরূপ বেদনা ; রোগী মণিবন্ধ প্রসারণ করিতে চাহে ; রোগী হাত দিয়া কোন দ্রব্য ধরিতে পারে না ; হাতে গারিবোধ এবং উহা মৃতবৎ ঠাণ্ডা ; আঙ্গুল এবং নখ নীলবর্ণ ; আঙ্গুল স্পন্দন করে । পা ইত্যাদি নিম্ন শাখা ঠাণ্ডা, নীলবর্ণ এবং উহার চালনা শক্তির সম্পূর্ণ বিনাশ ; পা ইত্যাদি নিম্ন শাখায় অবশবোধ এবং উহা শক্ত হয় বা নোয়ান যায় না ; বাম হাঁটুর বহির্দেশের পেশীর অগ্রভাগে ভয়ানক সঙ্কোচক বেদনা ।

চক্ষু । দাড়ি গোপ কামাইবার সময় মনে হয় যেন গালাদি স্থানের ছাল উঠিয়া বাইতেছে ; চক্ষু চক্কাকারে কৌচক হইয়া যায় ।

নিদ্রা । হাইতোলা ; দিনের বেলা নিদ্রাবেশ ; হৃৎস্পন্দন হইয়া রাত্রিতে ঘুম ভাঙ্গিয়া যায় ।

জ্বর । শীত এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে হাঁচি ; শীত এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে শরীরের কাঁপনি এবং মুখমণ্ডল লাগবর্ণ ; কসেরূপা মজ্জার নিম্ন দিক হইতে উর্দ্ধদিকে হামা দেওয়ার ভায়ে শীতবোধ ; প্রত্যেকবার শারীরিক পরিশ্রমে উষ্ণাত্তব ; শরীরে দমকা উষ্ণাত্তব এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে ঘর্ম্ম ; শীতল চট্‌চটিয়া ঘর্ম্ম ।

ব্যবহার । হৃৎসায়ুশূল ; পক্ষাঘাত, বিশেষতঃ যাহা শরীরের নিম্নাংশ হইতে উর্দ্ধদিকে বিস্তৃত হয় ; মস্তিষ্ক এবং কসেরূপা মজ্জার প্রদাহ (Myelitis) । কসেরূপার সায়ুশূল ; পাকস্থলী এবং অন্ত্রের প্রদাহ (Gastritis and Enteritis) ; পাকস্থলীতে বেদনা ইত্যাদি অস্থখে অক্জালিক্ আসিড্ ব্যবস্থা । ওলাউঠার যে অবস্থায় হাইড্রোসারেনিক্ আসিড্ ব্যবহৃত হয়, অনেক সময় সেই অবস্থায় অক্জালিক্ আসিড্, ৩য় ক্রমের শুঁড়া, ১ গ্রেইন্‌ মাত্রায় ব্যবহার করিয়া বিশেষ ফল পাওয়া যায় ।

বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ । অঙ্গাদিতে এক বিশেষ প্রকৃতির অবশবোধ যাহা প্রায় পক্ষাঘাত বলিয়াই অনুভূত হয় এবং যাহা নিম্নাঙ্গ হইতে উর্দ্ধাঙ্গে বিস্তৃত হয় ; লক্ষণাদি ক্রমাগত বর্তমান না থাকিয়া সময়ে সময়ে প্রকাশ পায় ; শরীরের স্থানে স্থানে স্পন্দন বা হুচী বিধানের ভায়ে ঘাতনা, কোন কোন স্থানে যাহার উল্লেখ হয় এবং যাহা কএক পলক বা সেকেন্ডের অধিক অবস্থিতি করে না । বেদনা যন্ত্রণাদির কথা স্মরণ বা চিন্তা করিলেই উহার উল্লেখ হয় (ব্যারাইটা-কার্ক) ; চিনি, কাফি, মদ্য ইত্যাদিতে অস্থখের বৃদ্ধি । বহির্বাযুতে অস্থখের উপশম ইত্যাদি অক্জালিক্ আসিডের কতকগুলি বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ ।

সমগুণবিশিষ্ট ঔষধ । অক্জালিক্ আসিডের কার্যের সঙ্গে আসিনিকের কার্যের বিশেষ সাদৃশ্য আছে । এতদ্বিত্তি কোন কোন বিষয়ে ইহার কার্যের সঙ্গে মার্কিউরিয়াম্ কেরোসাইবাসের সন্ধক আছে ।

প্রতিষেধক ঔষধ । চা খড়ি অথবা চুন ; কার্বোনেট্ অব ম্যাগ্নেসিয়া অক্জালিক্ আসিডের প্রতিষেধক ঔষধ ।

ডাইলুশন বিচার । ওলাউঠাতে ২য় এবং ৩য় ক্রমের শুঁড়াই সচরাচর ব্যবহৃত হইয়া থাকে । কোন কোন চিকিৎসকের মতে ইহার ১২

ক্রমের আরোক অধিক উপকারী। যে প্রকার পক্ষাঘাত নিরাস হইতে শরীরের উদ্ধারকে বিস্তৃত হয়, তাহাতে এই ঔষধের ১ম এবং ২য় দশমিক ক্রমের শুঁড়া, ১ গ্রেইন্ মাত্রায় বিশেষ উপকার দর্শে।

আসিডাম্ সাল্‌ফিউরিকাম্,—সাল্‌ফিউরিক্ আসিড্,—সাল্‌ফ-অ্যাস.

(ACIDUM SULPHURICUM,—SULPHURIC ACID,—AC. SULPH.)

কোন এক বিষমত হোমিওপ্যাথিক ঔষধালয় হইতে আদত (Strong) সাল্‌ফিউরিক্ আসিড্ ক্রয় করিয়া উহার ৫ ফোঁটা (মিনিম্), ২ ড্রই ড্রাম ২৫ মিনিম্ চূরান জলে মিশাইয়া ১ম দশমিক ক্রমের আরোক প্রস্তুত হইয়া থাকে। ইহার ১ম শততমিক ক্রমের আরোক যথানিয়মে চূরান জলে প্রস্তুত হইয়া থাকে। ৫ ভাগ রেক্‌টাইড্ স্পিরিট্, ৯৫ ভাগ চূরান জলে মিশাইয়া উহা দ্বারা ৩য় দশমিক এবং ৩য় শততমিক ক্রমের আরোক প্রস্তুত হইয়া থাকে। ৪র্থ শততমিক ক্রমের আরোক যথা নিয়মে ডাইলুট্ স্পিরিটে প্রস্তুত হইয়া থাকে এবং ৫ম ও ততোধিক শততমিক ক্রমের আরোক যথা নিয়মে রেক্‌টাইড্ স্পিরিটে প্রস্তুত হইয়া থাকে। আদত সাল্‌ফিউরিক্ আসিড্ রক্তহীন এবং উহার আপেক্ষিক গুরুত্ব ১.৮৪৩ এবং উহাতে জল মিশাইলে উহা অত্যন্ত উষ্ণ হয়।

সাধারণ ক্রিয়া। স্নৈয়িক কিল্লী, বিশেষতঃ আহারবহা নালী (Alimentary Canal) এবং শ্বাস বহুর স্নৈয়িক কিল্লীর উপর ইহার কার্য্য অতি প্রবল। চর্ম্মের উপরও ইহার কার্য্য প্রবল বটে।

সাধারণ প্রাকৃতিক লক্ষণ ।

মন। সর্কদা খিট্ খিট্, বক্ বক্ করা, চিড়্ চিড়্ করা এবং রাগ করা (ক্রোধ, ক্রাম্); অধৈর্য্যতা; সমুদয় কার্য্যেই তাড়াতাড়ি করা (সাল্‌ফ্)।

মস্তক। ঘেন মস্তক ঢল্‌ঢলে হইয়াছে এক্রূপ অস্বস্ত হইয়াছে;

যদিও এণাশ হইতে ওপাশে মেন হঠাৎ সরিয়া পড়িয়া কপালে হঠাৎ থাকা লাগে এক্ষণ অস্থূত হয় (নাজ্-মক্, হায়োস্, সাস্টক্স্), বহির্বাষ্পে চলিয়া বেড়াইলে বাহার বৃদ্ধি হয় এবং ঘরের মধ্যে চূপ মারিয়া থাকিলে বাহার উপশম হয়; কপাল এবং কপালের দুই পার্শ্ব ও কর্ণের পশ্চাৎভাগে থাকা মারার ভায় কষ্টদায়ক বাতনা, পূর্বাঙ্গে এবং সন্ধ্যার সময় বাহার বৃদ্ধি হয়; শিরঃশীতা, বাহা ক্রমে ক্রমে বৃদ্ধি হয় এবং হঠাৎ দ্রুত হয়; পাকিয়া পূর্ব হইলে বেক্রপ হয়, সমুদয় মাথার বহির্দেশে সেক্রপ বেদনা, স্পর্শনে বাহা অধিক বেদনায়ুক্ত হয়।

চক্ষু । প্রাতঃকালে চলিয়া বেড়ানোর সময় ডাইন চক্ষুর বহির্দেশের কোণে মেন কাঁকড়াদির ভায় কোন পদার্থ লাগিয়া রহিয়াছে এক্ষণ অস্থূত হয়; চক্ষুর পুরাতন প্রদাহ; চক্ষু দিয়া জল পড়া।

কর্ণ । কানে কম শুনা (ক্যাক্-কার্ক্, সাল্‌ফ্‌)।

নাসিকা । শুকনা সর্দি এবং উহার দরুণ ঘ্রাণশক্তির হ্রাস বা অভাব এবং স্বাদশূন্যতা (আন্টি-টার্ট্, পাল্‌স্)।

মুখমণ্ডল । মুখমণ্ডল মৃতবৎ শিটা বা ফিকা; ডিমের সাদা লাল শুকাইয়া লাগিয়া থাকিলে বেক্রপ হয়, মুখমণ্ডলে সেক্রপ অস্থূত হয় (আলাম্)।

মুখগহ্বর এবং গলার মধ্য । নিশ্বাস প্রবাহে অত্যন্ত দুর্বল (অর্বিকা, হিপার সাল্‌ফ্‌, নাইট্রিক্-অ্যাস্, নাজ্-বম্); হস্তাহির নিম্নস্থিত গ্রন্থি হইতে জিহ্বা পর্যন্ত বেদনা; জিহ্বা পুড়িয়া যাওয়ার ভায় অস্থূত হয় (আইরিস্, ট্রাটিনা, পাল্‌স্, সাস্কুনেরিয়া); টক খাইলে বেক্রপ হয়, দাঁত সেক্রপ টক হয়; ঘূষে খা (বোরাক্স্, অ্যামোড্, হেলিবোরাস্, হাইড্রাট্); তালুকা এবং আহারবহা গলনালীর উপরিভাগের ত্রৈমিক স্নায়ু ক্ষীণ এবং উহাতে রক্তাবরোধ ও ক্ষত। গলার মধ্য ক্ষীণ, বাহার দরুণ মনে হয় মেন গলার মধ্যে ডেলার ভায় কোন পদার্থ লাগিয়া রহিয়াছে; গলার মধ্য অত্যন্ত বেদনায়ুক্ত, বাহার দরুণ কোন দ্রব্য গিলিবার ব্যাঘাত জন্মে (বেল্); গলার মধ্যে ছাল উঠিয়া যাওয়ার ভায় অস্থূত হয় (অর্জেন্ট্, এরাম্, নাজ্-বম্, সাস্কুনেরিয়া); হস্তাহির নিম্নস্থিত গ্রন্থির (Sub maxillary glands)

ক্ষীতি এবং প্রদাহ ; ডিপথিরিয়া রোগে গলার মধ্যের পশ্চাৎভাগে করলা লেবু ভায় হরিদ্রা বর্ণের প্লেয়ার ভায় পদার্থ যেন ঝুলিয়া পড়ে ।

পাকস্থলী এবং উদর । টক উল্গার উঠা (আলাম্, কার্কো-বেজ্, ফস্) ; প্রবল হিকা (গিকুটা, ব্রাই, হারোস্, ইমেস্, বিরেট্-আব্) ; ঝাভালদিগের বমন (নাস্-বম্) ; মদ্য না মিশাইয়া দিলে সকল প্রকারের পানীয় দ্রব্যেই পাকস্থলীতে অত্যন্ত ঠাণ্ডাবোধ হয় । উদরে দুর্গন্ধবোধ, বাহার দরুণ মনে হয় যেন রজঃস্রাব শীঘ্রই আরম্ভ হইবে ; এক দিকের কুঁচকি সম্বন্ধীয় অঙ্গবৃদ্ধি ।

মল । সর্সদাই নবম মল ভ্যাগ ; উদরাময় এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে অত্যন্ত দুর্বলতা ; নরম মলভ্যাগের পর পেটে খালি খালি বোধ ; গোলা-নীর ভায় ঘোলাটিয়া মল ভ্যাগ (একন্) ; শিশু বা ছোট বালক বালিকাপুত্রের মল বাফ্রাঙ্গের ভায় হরিদ্রা বর্ণ, গঁদের ভায় চট্‌চটিয়া আঠা ; মল নরম, কাইয়ের ভায়, হরিদ্রার আভাযুক্ত সাদা ; মল কতক কঠিন, কতক তরল এবং উহার সঙ্গে অধিক পরিমাণে তরল প্লেয়া ও রক্তের ছিট থাকে ; মল অত্যন্ত দুর্গন্ধযুক্ত ।

মূত্রযন্ত্র । মূত্রাধারে বেদনা বাহার দরুণ মূত্রের বেগ থামিয়া যায় ।

জননেন্দ্রিয় । স্ত্রীলোকের নিয়মিত সময়ের অনেক পূর্বে এবং প্রচুর পরিমাণে রজঃস্রাব (আস্, ক্যাক্-কার্ক্, নাস্-বম্) ; ক্ষতকারক, অথবা জালা উৎপাদক দ্রবের ভায় শ্বেতপ্রদর নিঃসরণ (ক্যাক্-কার্ক্, কোনাগান্, পাস্, সিপিয়া) ।

শ্বাসযন্ত্র । শ্বসতঙ্গ এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে গলার মধ্য এবং কণ্ঠ-নালীতে থল্‌থল্‌ বা খড়্‌খড়্‌ বোধ ; নিশ্বাস প্রবাহ ঘন ঘন ; বুকের মধ্যে উত্তেজনার দরুণ কাশি এবং শুষ্করণ প্রাতঃকালে গলা দিয়া কাল্‌চে রক্ত, বা হরিদ্রাবর্ণ, রক্তের ছিট বিশিষ্ট টক স্বাদের তবল প্লেয়া নির্গমন ; কাশির পর উল্গার উঠা ; কাশি এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে গলা দিয়া রক্তের ছিটযুক্ত প্লেয়া নির্গমন ; ফুফুস হইতে প্রচুর রক্তস্রাব ; ফুফুসের স্ফোটক রোগ (tuberculosis) ।

চক্ষু । শরীরের স্থানে স্থানে নীলবর্ণ আভাযুক্ত গোম্‌হা বা জরাহ

জার (Ecchymoses) দৃষ্ট হয় (আর্নিকা, ফস্‌, সিকেল্‌) ; থেঁতুলিরা গেলে বা মোচড়াইয়া পড়িলে আঘাত প্রাপ্ত স্থান সহজেই পচিবীর উপক্রম হয় (আস্‌) ।

নিদ্রা । অনেক রাত্রিতে ঘুম হয় এবং অতি প্রচুরে ঘুম ভাঙ্গিয়া যায় ।

জ্বর । শীতবোধ ঘরের মধ্যে বাহ্যে অধিক অনুভূত হয় এবং ঘরের বাহিরে বাহ্যের উপশম হয় ; অঙ্গ চালনার সময় শীতবোধ ; প্রচুর ঘর্ষ এবং তদ্রূপ অত্যন্ত দুর্বলতা ; রক্ত্রিতে প্রচুর ঘর্ষ (চায়না, ফস্‌, ফস্‌-আস্‌) ।

ব্যবহার । আঘাত প্রাপ্ত হওয়া, থেঁতুলিয়া যাওয়া বা মোচড়াইয়া পড়ার দরুন অস্থি ; সার্ভাসিক দুর্বলতা ; রক্ত্রাঘ বা পুঁ‌য়াদি রসক্ষয় হেতু জ্বর বা হেক্টিক্‌ ফিবার, (Hectic Fever) ; রক্ত্রোৎকাশ ; যক্ষাকাশ ; রক্ত্রাঘ ; উদরাঘ ; মুখে ঘা ; পাকস্থলীর অঘলের বারাম ; হিকা ; আস্ত্রিক-জ্বর ; চক্ষু প্রদাহ ইত্যাদি অস্থখে সাল্‌ফিউরিক্‌ আসিড্‌ ব্যবহার্য্য ।

বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ । প্রচুর ঘর্ষ ও তদ্রূপ অত্যন্ত দুর্বলতা এবং বলক্ষয় ও উহার সঙ্গে সঙ্গে মনে হয় যেন শরীর কাঁপিতেছে, কিন্তু শরীর বাস্তবিক কাঁপে না ; বেদনাদি ক্রমে ক্রমে আরম্ভ হয়, কিন্তু হঠাৎ দূরীভূত হয় ; ঘোনিঘার, শুষ্কহার, নাক ইত্যাদি দিয়া বে রক্ত্রাঘ হয়, উহার রঙ্গ কাল্‌চে (হামামেলিস্‌, ফস্‌) । বৃদ্ধ বয়সে, বিশেষতঃ বৃদ্ধা স্ত্রীলোকের শেষ রক্ত্রোপোষের সময় অস্থখে বিশেষ উপকারী । বহির্বায়ু-মধ্যাহ্নে আহ্বারের পর, ঠাণ্ডা বা আত্মবায়ুতে অস্থখের বৃদ্ধি ইত্যাদি সাল্‌ফিউরিক্‌ আসিডের কতকগুলি বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ ।

সমগুণ বিশিষ্ট ঔষধ । সুন্দর মিনারেণ্‌ আসিড্‌স্‌ (Mineral Acids) ; আর্নিকা, ডিজিটালিস্‌, পাল্‌সেটিল্য, সাল্‌ফাব ইত্যাদি ঔষধের কার্যের সঙ্গে সাল্‌ফিউরিক্‌ আসিডের কার্যের সাদৃশ্য আছে ।

প্রতিষেধক ঔষধ । পাল্‌সেটিল্য ।

ডাইলুশন বিচার । ডাক্তার হিউজের (Dr. Hughes) মতে ২য় এবং ৩য় দশমিক ডাইলুশন ব্যবহার্য্য । যক্ষাকাশে জ্বর এবং অন্যান্য রোগে দুর্বলকারক অর্থে ১২ ডাইলুশন ব্যবহার করিয়া লেখক বিশেষ উপকার পাইয়া থাকেন ।

আসিডাম্ কার্বোলিকাম্,-কার্বোলিক্ আসিড্,-কার্ব্-আস্

(ACIDUM CARBOLICUM,—CARBOLIC ACID,—AC. CARB.)

কোন এক বিস্কৃত হোমিওপ্যাথিক ঔষধালয় হইতে আদত কার্বোলিক্ আসিড্ ক্রয় করিয়া যথানিয়মে রেক্টিফাইড্ স্পিরিটে মিশ্রিত করিয়া ইহার মিশ্র আরোক বা ডাইলুশন প্রস্তুত হইয়া থাকে।

সাধারণ ক্রিয়া। মস্তিষ্ক এবং কংস্কেলা মজ্জা সঞ্চীয় স্নায়ুর উপর ইহার কার্য অতি প্রবল। উহা উক্ত স্নায়ু মণ্ডলীর জীবনী শক্তি হ্রাস করিয়া শরীরের ঘন এবং তরল পদার্থকে বিকৃত করে এবং তদনুযায়ী তরল পদার্থে উদ্ভিদ এবং জাতব পদার্থের বীজ উৎপন্ন হয়। এই প্রকারে আভ্যন্তরিক প্ররোগে শরীরের উপরে ইহা বিরূপ কার্য করিয়া থাকে কেবল যে তাহাই প্রতীত হয় এমন নহে, নিম্ন শ্রেণীস্থ উদ্ভিদ এবং জাতব দেহে ইহা রোগ আরামের ক্ষত বা ঔষধার্থ এবং রোগ নিবারক স্বরূপ বিরূপ কার্য করে তাহাও জানিতে পারা যায়। অতি অল্প পরিমাণ কার্বোলিক্ আসিড্ জলে মিশাইয়া উক্ত মিশ্র আসিড্ কোন প্রকার উদ্ভিদ বা জাতব দেহে ঢালিয়া দিলে উহা দ্বারা উদ্ভিদ পদার্থ এবং কীটাত্মক তৎক্ষণাৎ এক-বারে বিনষ্ট হয়। এই শক্তি নানা প্রকারের পচন ক্রিয়া দমন করে। এইরূপে ইহা পচন সংক্রমণ নিবারক বা প্রতিষেধক রূপে কার্য করিয়া থাকে। জাতব দেহের পচন ক্রিয়া নিবারণ করে বলিয়া পুঁথ দ্বারা বিধাক্ত হওয়ার দক্ষণ রোগ, মৃতদেহ ছেদন করা সময়ে অন্তের খোঁচাদি লাগিয়া বিধাক্ত বা, ছুইত্রণ বা পৃষ্ঠাঘাত (Carbuncle) এবং যে প্রকার ঘা শীঘ্র শীঘ্র বৃদ্ধি পাইয়া শীঘ্র শীঘ্র পচিয়া উঠে (Hospital Gangrene), সে সকল রোগে কার্বোলিক্ আসিড্ বিশেষ উপকারী।

সাধারণ প্রাকৃতিক লক্ষণ।

স্বাদ। কোন প্রকার চিন্তা বা মানসিক পরিভ্রমে অনিচ্ছা; অত্যন্ত শিট্‌শিট্‌, চিচ্‌, চিচ্‌ করা।

মস্তক। কপালের চতুর্দিকে এক গাছি রবারের কিতার দ্বারা

পাত কসিয়া বাঁধিয়া রাবিলে বেরূপ হয়, মাথার সেরূপ ভারিবোধ এবং ঘূর্ণঘূর্ণে বেদনা (অ্যাক্টি-টার্ট, চেলিডন্, মার্ক, নাইটিক্-আস, সালফ্); কপালের মধ্য দিয়া আঁড়া আঁড়ী কসিয়া ধরার জ্বর অহত্ব হয়; মাথার উপরিভাগের বাম পার্শ্বে ক্ষুদ্র ত্রণের জ্বর কোকা বা কুকুড়ী; মাথার ছাড়ের উপরে চুলকানি (কষ্ট, গ্রাফ, সিপিরা, সাইলিসি, সালফ্)।

চক্ষু । ডাইন চক্ষুর কোটরের উপরিভাগের মার্মুল (কলোস)।

নাসিকা । ঘ্রাণ, শক্তি স্বাভাবিক অপেক্ষাও অধিক তীক্ষ্ণ বা প্রেধর; নাসারন্ধ্র বন্ধ হইয়া থাকে; নাকের মধ্যে ক্ষত এবং উহা হইতে অত্যন্ত দুর্গন্ধযুক্ত পুণ্ডের জ্বর ক্রন্দ নিঃসরণ।

মুখমণ্ডল । মুখমণ্ডল শিটা বা ফিকা, অথবা আরক্ত ও টল টলে এবং আলায়ুক্ত।

গলার মধ্য । গলার মধ্যে বা বা টাটানি যাহা ডাইন পার্শ্বেই অধিক অহত্ব হয়। গলা খেকুর দিলেই গলা দিয়া পরিষ্কার সাধা স্বেদ্য নির্গত হয়।

পাকস্থলী এবং উদর । ক্ষুধা বা রুচি শূন্যতা; হইকি (Whisky) নামক মদ্য পানের ইচ্ছা (আসেরাম); অনবরত ঢেকুর বা উল্গার দ্বারা প্রচুর পরিমাণে দূষিত বায়ু উঠা; অত্যন্ত বমনোদ্বেগ এবং বমনের ইচ্ছা (অ্যাক্টি-টার্ট)। উদরের ডাইন পার্শ্বে বেদনা; উদরের ছই পার্শ্বে, প্রোণী প্রদেশে (Iliac Regions) বেদনা; পেটের মধ্যে গড়্ গড়্, কল কল শব্দ হওয়া এবং উহাতে মোচড়ানী ও পেট যেন ক্ষীত হইয়াছে এরূপ অহত্ব হয় (চারনা, লাইকোপ্)।

মল । শৈশবাবস্থার ওলাউঠা (Cholera Infantum) এবং পড়া ডিমের জ্বর দুর্গন্ধযুক্ত মলভেদ।

মূত্র । মূত্র কাল্চে, কাল্চে সবুজের আভাযুক্ত কটাবর্ণ; মূত্র কাল্চে ধূমের রঙ্গ বিশিষ্ট এবং ক্ষার গুণ বিশিষ্ট পদার্থ মিশ্রিত।

জননেন্দ্রিয় । স্ত্রীলোকের অতিরিক্ত পরিমাণে কাণ্ডে রক্ত-প্রাব; বহির্বার্যুতে চলিয়া বেড়াইবার সময় বাম ভিষকোষে বেদনা সাধা। শীত শীতই সাধিয়া যায়; হৃদিকা-জ্বর এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে বস্তিকোটরস্থ

যন্ত্রাদিতে পচনের লক্ষণ প্রকাশ পাওয়া ; জরায়ুর মুখের চতুষ্পার্শ্ববর্তী স্থানে ক্ষত (হাইড্রাট্) ।

স্থান যন্ত্র । নিশ্বাস প্রশ্বাস গৌ গৌ, বড় বড় শব্দ বিশিষ্ট (ওপি-য়াম্) ; অণুস্থায়ী খুশ্‌খুশে কাশি এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে গলার মধ্যে হুড়্ হুড়্ বা খুশ্‌খুশ্‌ করা ; বুক যেন অত্যন্ত কম প্রশস্ত একুণ অল্পভূত হয়, যাহার দরুণ মনে হয় যেন বুক ও উদর কোটরের মধ্যস্থিত গোল পেশী (Diaphragm) ক্ষুদ্র চাপিয়া রাখিয়াছে ।

পৃষ্ঠদেশ । পৃষ্ঠদেশ এবং অঙ্গ প্রত্যঙ্গের পেশীতে টাটানি ।

অঙ্গ প্রত্যঙ্গ । বাম বাহুতে অনবরত ভারি এবং প্রান্তিবোধ ; ডাইন বাহুর পেশীতে টাটানি ; বাম বাহুর সমুখ ভাগে কনকনিয়া বেদনা । কুঁচ্কির সন্ধি হইতে পা ইত্যাদি শরীরের নিম্ন শাখায় সীসার ভায় ভারি-বোধ ; বাম হাঁটুর সন্ধির হাড়ের (Patella) নীচে কনকনানি বা টাটানি ; মনে হয় যেন হাঁটুর সন্ধি সঞ্চালন করা যাইবে না, কিন্তু সঞ্চালনের সমর উক্ত প্রকারের বেদনা একবারেই অল্পভূত হয় না ; বাম পায়ের টিবিয়া (Tibia) নামক হাড় প্রথর বেদনা ।

চর্ম্ম । শরীরের নানা স্থানে চুলকানি (সালফ্) ; সমুদয় শরীরে কোম্বার ন্যায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফুসুড়ী যাহা অত্যন্ত চুল্‌কাই, ঘবিলে যাহার উপশম হয়, কিন্তু ঘবিবার দরুণ অক্রান্ত স্থানে জ্বালার উদ্বেক হয় (সালফ্) ।

ব্যবহার । আরক্ত জ্বর, ডিপ্‌থিরিয়া (Diphtheria), আয়িক জ্বর ইত্যাদি যাহাতে শরীরের কোন কোন অংশ বা যন্ত্রে পচা লাগে ; মৈত্রিক ঝিল্লী পচিয়া উঠা হইতে পচা তর্পকযুক্ত অম্লহ পূর্ব নির্গমন ; মৈত্রিক রোগ ; মুখে ঘা ; নর্দমার দোষজনিত অস্থখ ; মূত্রকোষের ট্রাইটস্ ডিজিজ (Bright's Disease) ; গোস বা চুলকানি ; গার চুলকানি বিশিষ্ট ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বর্ণের ভারি ফুসুড়ী (Prurigo) ; সম্ভূত বসন্ত (Variola Confluens) ; কণ্ঠ-নালা প্রদাহ (Laryngitis) ; বায়ুনল প্রদাহ ; জ্বরীর্ণ ; গর্ভাবস্থার বমন বা বমনোবেগ (Morning Sickness) ; উদরাময় ; বমন সম্বলিত শিরঃশীড়া ; মস্তিষ্ক এবং কসেরুকা মর্জ্জার উত্তেজনা ; জরায়ুর মুখের চতুষ্পার্শ্ববর্তী স্থানে ক্ষত ; ডিপ্‌থিরিয়া (Diphtheria) ; কোন কোন প্রকারের মেলেরিয়া জনিত

অর; পূর্ব দ্বারা রক্ত বিযাক্ত হওয়ার দরুণ যকুতে ফোড়া এবং আমাশয়; মস্তিষ্কের তরুণ শোথ; মূত্রাবরোধ হেতু ইউরিমিয়া (Uræmia) জনিত ঘোর অচেতনতা ইত্যাদি অল্পে কার্বোনিক্ আসিড্ ব্যবহার্য্য ।

বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ । অত্যন্ত অলসবোধ, গা মাটিমাটি করা এবং অত্যন্ত বলহীন; সামান্য চলিয়া বেড়াইতে অত্যন্ত ক্লান্তি বা শ্রান্তিবোধ; রোগী (স্ত্রীলোক) মনে করে যেন তাহার সর্দি লাগিয়াছে ইত্যাদি কার্বোনিক্ আসিডের কতকগুলি বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ মধ্যে পরিগণিত ।

সমগুণ বিশিষ্ট ঔষধ । স্বাস্থ্য মণ্ডলীতে কার্বোনিক্ আসিডের কার্য্য অনেকটা জেল-সিনিয়ামের কার্য্যের ছায়। পাকস্থলীর উপর ইহার কার্য্য অনেকটা ক্রিয়াজ্যোতি এবং কার্বো-বেজিটেবিলিসের ন্যায় । এতদ্বিন্ন কোন কোন বিষয়ে ইহার কার্য্যের সঙ্গে আদিনিক, ব্যাপ্টিসিয়া, ল্যাক্-সিস্, ফফরাস্, নাইট্রিক্ আসিড্, মিউরিয়াটিক্ আসিড্, রাস্টিক্ এবং সাল্ফারের কার্য্যের সাদৃশ্য আছে ।

প্রতিষেধ ঔষধ । শাকারেট্ অব্ লাইম্ গোল (Saccharate of lime in solution) সেব্য ।

ডাইলুশন বিচার । ১ম, ২য় এবং ৩য় ডাইলুশনই সচরাচর অধিক ব্যবহৃত হইয়া থাকে ।

আগারিকাশ্ মাস্কেরিয়াস্,—আগার-মাস্

(AGARICUS MUSCARIUS,—Agar. Musc.)

ইউরোপ, আফ্রিকা এবং আমেরিকার শুষ্ক ভূমিতে এই গাছ জন্মিয়া থাকে । ইংলণ্ডে এই গাছ সচরাচর জন্মে না । কিন্তু স্কটল্যাণ্ডে ইহা প্রচুর পরিমাণে জন্মিয়া থাকে । ইহার কাঁটা, কৌড়কের (Fungus) ছাল ফেলিয়া দিয়া ভালরূপে ধুইয়া বথানিয়মে ডাইলুট্ স্পিরিটে ভিজাইয়া ইহার মূল আরোক্ত প্রস্তুত হইয়া থাকে । ইহার শুকনা কৌড়ক বথানিয়মে সুগার অব্ মিক্সের সঙ্গে বিশাইয়া ইহার শুঁড়াও প্রস্তুত হইয়া থাকে ।

সাধারণ ক্রিয়া । মস্তিষ্কের উপর ইহার কার্য মদ্য (মদ্য), আকিস এবং তড়িৎ ন্যায়, বাহ্যর দরুণ নেহার ন্যায় হইয়া রোগীর চেতনা একেবারেই থাকে না । অনেক কাল ধরিয়া মদ্যপানে অভ্যাসের হেতু বেক্রম হইয়া, এই ঔষধও শরীরের সেরূপ বিকৃতাবস্থা উৎপাদন করে । স্থানিক প্রয়োজে শরীরের উপর ইহা এক উত্তেজক (Irritant) এবং ধ্বংসকারী বিষের ন্যায় কার্য করিয়া আক্রান্ত স্থানে প্রদাহ, বিকৃতি এবং কখন কখন উক্তস্থানের মৈত্রিক বিলীল পচন উৎপাদন করিয়া থাকে । কসেফকা মর্জা সম্বন্ধীয় দ্রাব্যগুলি ইহা দ্বারা অত্যন্ত প্রবলরূপে আক্রান্ত হইয়া থাকে । উক্ত দ্রাব্যগুলির মধ্যে গতি উৎপাদনের সহায়কারী দ্রাব্যই অধিক আক্রান্ত হইয়া থাকে, বাহ্যর দরুণ শরীর কম্পন, কোরিয়া (Chorea), আক্কেপ (Convulsions) ইত্যাদি অস্থির উৎপন্ন হয় । জ্ঞান উৎপাদক দ্রাব্যগুলিও ইহা দ্বারা আক্রান্ত হইয়া থাকে, বাহ্যর দরুণ কসেফকা মর্জা ও দ্রাব্যগুলিতে বেদনা এবং মেরুদণ্ডের উপর স্পর্শ করিলে টাটায় ও বেদনামুক্ত হয় । এই বেদনা কোমর প্রদেশস্থ মেরুদণ্ডেই অধিক অম্লভূত হয় ।

সাধারণ প্রাকৃতিক লক্ষণ ।

মন । সকল বিষয়েই উদাসীনতা ; কোন প্রকার প্রবৃত্তির উত্তর দেওয়ার অনিচ্ছা (কস্, কন্-আস্) ; প্রলাপ উক্তি এবং অনবরত পাগলের ন্যায় বক্ বক্ করা বা ছুটাছুটি করা ; সর্বদা বিছানা হইতে উঠিয়া বাওয়ার চেষ্টা ; শারিরীক শক্তির অত্যন্ত চালনা (বেল, হারোস্) ; সর্বদা চটিয়া বাওয়া ; একগোঁয়েমী ; বিমর্ষভাব ; অবাধাতা (ব্রাউ, ক্যান, নাক্স-বন্) ।

মস্তক । বহির্কায়ুতে চলিয়া বেড়াইলে মাথাধোরা (আন্টি ক্রুড, ক্যাল্-ক-কার্ক, সোনবেন্, সিপিরা, সাল্-ক্) ; স্রাবপানে মেলা হইলে বেক্রম হইয়া, সেরূপ পা টলা (ট্রামন্) ; ঘুর্ণ ঘূর্ণে মাথা ঘরা, কপালেই বাহা অধিক অম্লভূত হয়, বাহ্যর দরুণ রোগী মাথা এমিক ওমিক ঘুরাইতে বা নাড়িতে বা ঘুর্ণ পাওয়ার ন্যায় চক্ৰ বুজিতে বাধ্য হয় ; কপালের হাড়ের দুই পার্শ্ব হইতে নাকের গোড়া পর্যন্ত কমিয়া থরা ; যে সকল ব্যক্তি কোরিয়া (Chorea) রোগাক্রান্ত এবং বাহাদিপের অর হইলেই প্রলাপ (Delirium)

হয়, তাহাঙ্গিরের শিরঃস্নিড়া বা মাথার বেদনা (বেল্); শরীরের স্পন্দন; মাথার বরকের ন্যায় ঠাণ্ডাবোধ (বিরেট্-আল্‌ব্), প্রধানতঃ কপালের হাড়ের ডাইন পার্শ্বে কাঁটা বিঁধিয়া রাখার ন্যায় বেদনা বা বাতনা (জানি-কার্ড, কফিয়া, ইগ্‌নেস্); মাথার পশ্চাদ্দেশে ভারিবোধ, বাহ্যিক রূপে মাথা পশ্চাদ্গিকে টলিয়া পড়ে (চারনা)।

চক্ষু। চক্ষুর পাতার স্পন্দন (চিনিনাম্-সাল্‌ফ্); চক্ষুর গোলকের কন্‌কনানি ও স্পন্দন; চক্ষের আক্ষেপ এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে চক্ষুর ব্যবহার না হইলেও চক্ষে অত্যন্ত দুর্বলবোধ; চক্ষের সম্মুখে নানা প্রকারের চিহ্ন বা দাগ দেখা (কাইমষ্ট্); চক্ষুর সম্মুখে নানা প্রকারের কম্পমান রঙ্গ (Vibrating Spectra) দৃষ্ট হয় এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে মাথাধোরা; চক্ষুর সম্মুখে কাল দাগ বা জালের ভায় অথবা কুরাশার ভায় দৃষ্ট হয় (সাল্‌ফ্, সাইক্লোমেন, মার্ক, ফস্, সিপিয়া, সাইলিসি); চক্ষুর পাতার মধ্যবর্তী স্থান অপ্রশস্ত; চক্ষু অস্পষ্ট দেখা; সকল সময় এক প্রকার দূরে দেখা যায় না।

কর্ণ। অতিরিক্ত ঠাণ্ডা লাগিলে ঘেরূপ হয়, কান সেরূপ লালবর্ণ এবং উহাতে জ্বালা এবং চুলকানি।

নাসিকা। প্রাতঃকালে নাক ঝাড়িবার সময় নাক দিয়া রক্ত পড়া (আস্থা, ব্রাট্) এবং তৎপর নাক দিয়া ভয়ানক রক্তস্রাব; নাকে কোন প্রকার গন্ধই সহ্য হয় না (একন্, বেল্, কলোস্, কল্‌চ্, হিপ্-সাল্‌ফ্, লাইকোপ্)।

মুখগহ্বর এবং গলার মধ্য। জিহ্বা শুষ্ক (আস্, ব্যাপ্‌ট্, বেল্, ফস্, রাস্-টক্স্); জিহ্বা সাদা লেপযুক্ত; মাড়ি ক্ষীত; কোন প্রকার ধারক (Astringent) দ্রব্য খাইলে ঘেরূপ হয়, আহারবহা গলনালীর উপরিভাগে সেরূপ শুষ্কবোধ এবং উহার সঙ্কোচন। না কাশিলেও গলা দিয়া কঠিন স্লেমা নির্গত হয়।

পাকস্থলী এবং উদর। পচা ডিমের স্বাদ বিশিষ্ট উল্কার উঠা (আন্টি-টার্ট্, আগিকা, সোরিনাম্, সিপিয়া), অথবা পচা আতা ফলের গন্ধবিশিষ্ট উপকার উঠা; হিকা; বমনোদ্বেষ্ট এবং বমন; আহারেব ও ঘণ্টা পর পাকস্থলীতে জ্বালা বাহা ঘূশ্‌ঘূশে চাপাবোধে পরিণত হয় এবং উহার

সঙ্গে সঙ্গে বমনোদ্বেষ। যকৃতের রক্তাধিক্য বা রক্তাবরোধ এবং উহার বিবৃদ্ধি; যকৃত প্রদেশে স্থচীবিধানের জ্বায় বেদনা; অস্ত্রের মধ্যে গড়্ গড়্, কল্ কল্ শব্দ হওয়া (আলোজ্, লাইটকাপ্, সিপিরা, সালক্); বাম পার্শ্বের ক্ষুদ্র পাঁজবার হাড়ের নীচে স্থচীবিধানের ন্যায় অস্বভূত হয়। শুষ্কতার দ্বারা প্রচুর দ্বিষিত বায়ু নিঃসরণ; উদর ক্ষীত এবং বিতৃত ।

মল । মল পিত্তযুক্ত ঘাসের জ্বায় সহজবর্ণ (ইপিকাক্, ম্যাগ্-কার্ক্); প্রাতঃকালে ঘুম হইতে উঠিলেই উদরাময় (আলোজ্, পডোক্, কমেজ্, সালক্); আহারের পর উদরাময়; উদরে গড়্ গড়্, কল কল শব্দ সম্বলিত উদরাময় (আলোজ্); আক্ষেপিক শূলবেদনা সম্বলিত উদরাময় এবং দান্তের সময় শুষ্কতার দ্বারা দ্বিষিতবায়ু নিঃসরণ (কলোস্) ।

মূত্রযন্ত্র । মূত্রনালী দ্বারা আঁটাল চট্‌টিয়া স্লেথ্যা নির্গমন ।

জননেন্দ্রিয় । পুরুষের জীৱনহবাসের ইচ্ছা হয় বটে, কিন্তু জী আলি-
জননের সময় পুরুষাঙ্গ শিথিল হইয়া পড়ে (আর্জেট্-নাইটিক্, কানারাম্, ক্যালিডিয়াম্); জী সহবাসে ধাতু নির্গত হওয়ার পর অত্যন্ত দুর্বলতা এবং অলসবোধ (চারনা, কন্, ফন্-অন্, ষ্টাকিস্) এবং উরুদেশে অত্যন্ত দুর্বলবোধ ও বেদনা; জী সহবাস বিষয়ে অত্যাচার জনিত অশুখ (চারনা, কন্); জীলোকের অরাসুতে নিম্নদিকে সন্ধ্যারে তৈলিয়া নামার ন্যায় অত্যন্ত বেদনা বাহা সহ্য করিতে না পারিয়া রোগী ছট্‌কট্ করে; যোনি ও যোনিদ্বারে ভয়ানক চুলকানি (আশ্চা, কানারাম্, ক্রিরাজ্, নেট্রাম্-বিউব্, নাইটিক্, আস্) এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে পুরুষসহবাস এবং পুরুষ আলিঙ্গনের অত্যন্ত ইচ্ছা (ক্যাহ্) ।

শ্বাসযন্ত্র । সময়ে সময়ে প্রবল কাশির আক্রমণ হাঁচি হইয়া শেষ হয়; হঠাৎ আক্ষেপিক কাশি, পূর্ণাক্ষ বা দিনের বেলা বাহার বৃদ্ধি হয়; কণ্ঠনাথীতে কণ্ঠবোধ এবং সঙ্কোচক বাতনা, বাহার দরুণ শ্বাসরোধ হইবে বলিয়া ভয় হয় (একন্, ল্যাক্); বৃকে অত্যন্ত কণ্ঠ এবং সঙ্কোচক বাতনা (আর্স্, ফন্); শ্বাস কণ্ঠ ।

গ্রীবা এবং পৃষ্ঠদেশ । বাড় শক্ত হয় বা উহা নোয়ান যায় না (একন্); হই স্বক্কে মধ্যবর্তী স্থানে এক বিশেষ প্রকৃতির দুর্বলতা এবং শক্ত

বোধ যাহা বাড় পর্য্যন্তও বিস্তৃত হয়; মাথা হেট করিয়া অনেকক্ষণ ক্রমাগত উপুড় হইয়া থাকিলে যেক্রপ হয়, পৃষ্ঠদেশে সেক্রপ বেদনা (বাস্ টক্স); খেঁতলিয়া গেলে বা মোচড়াইয়া পড়িলে যেক্রপ হয়, পৃষ্ঠদেশের পেশীতে সেক্রপ অহুভূত হয়, যাহার দরুণ মাথা সম্মুখ দিকে বাঁকা হইয়া পড়িলে মনে হয় যেন পৃষ্ঠদেশেব পেশীগুলি খাট হইয়াছে; মাথা হেট করিয়া উপুড় হটিলে কসেরুকা মজ্জায় আগাগোড়া বেদনাহুভব; কসেরুকার মধ্যে খেঁচা বিধার জ্বায়া জ্বালায়ুক্ত বেদনা; মেরুদণ্ড স্পর্শ করিলেও বেদনায়ুক্ত হয় (সিমিসিক্, ফন্স); শরীর ফিরাইলে বা ঘুলাইলে মেরুদণ্ডে অত্যন্ত প্রবল বেদনার উদ্বেক হয়; পিপড়া হামা দিয়া গেলে যেক্রপ হয়, মেরুদণ্ডের মধ্যে সেক্রপ অহুভূত হয়; বহির্কর্ষুতে চলিবার সময় গুহ্বারের উপরিভাগে স্থচী বিধানের জ্বায়া হঠাৎ প্রবল বেদনা; কোমর এবং কোমরের নিম্ন প্রদেশে, ও গুহ্বারের ঠিক উপরিভাগে প্রবল বেদনা; পৃষ্ঠদেশ যেন শক্ত হইয়া থাকে যাহা বাড় পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়।

অঙ্গ, প্রত্যঙ্গ, হাত, পা ইত্যাদি । হাতের কাঁপনি (কন্স); বাম বাহু এবং সম্মুখ বাহুতে কদিয়া ধরার ন্যায় বেদনা; বাম সম্মুখ বাহু এবং কহুইয়ের পেশীতে কদিয়া ধরার জ্বায়া অহুভূত হয়; নিহারাক্রান্ত হইলে বা বরফে অনেকক্ষণ থাকিলে যেক্রপ হয়, হাত এবং হাতের আঙ্গুলে সেক্রপ লাল বর্ণ ক্ষীতি এবং উহাতে চুলকানি ও জ্বালাহুভব; ক্ষুদ্র সন্ধি-বাতের ন্যায় হাতের আঙ্গুল শক্ত হয় বা উহা নোয়ান যায় না। পাহার পেশীর (Gluteal Muscles) স্পন্দন; পা যেন শ্রান্ত এবং ভারি অহুভূত হয়; পা দুর্বল; শ্রান্ত হইলে যেক্রপ হয়, পায়, বিশেষতঃ, ডাইন উরুর সন্ধিতে সেক্রপ বেদনা; নিহারাক্রান্ত হইলে বা বরফে অনেকক্ষণ ভিজিলে যেক্রপ হয়, পায়ের আঙ্গুল সেক্রপ লালবর্ণ এবং উহাতে চুলকানি ও জ্বালাহুভব (এপিস)।

জ্বর । সামান্ত নড়াচড়াতেই শীতবোধ; বিছানায় কাপড় সামান্য উঠাইলেই শীতবোধ।

নিদ্রা । বারম্বার হাই তোলা; নিদ্রার অত্যন্ত ইচ্ছা; ঘুম হওয়া হওয়া সময়ে চক্কিয়া উঠা এবং শরীর স্পন্দন।

ব্যবহার । শৃগীরোগ; কোরিয়া (Chorea); কসেরুকা মজ্জায়

রক্তাধিক্য বা রক্তাবরোধ এবং উহার উত্তেজনা ; কসেদক রক্তের কোমলতা ; আত্মিক অর বা অর বিকার ; মদোন্মত্ততা (Delirium Tremens) ; সংন্যাস রোগ ; মাতালদিগের যন্ত্রের কার্য সম্বন্ধীয় অসুখ ; অক্লীর্ণ ; বাতরোগ ; চক্ষুর নানা প্রকারের রোগ ; আঙ্গুলের ফাঁকে ফাঁকে ছাল উঠিয়া বাওয়ার ন্যায় বা ; নিহারাক্রান্ত হওয়া (Frost-bite) জনিত অসুখ ; অনর্থক মোটা হওয়া (Obesity) ইত্যাদি অসুখে আগারিকাশ্ ব্যবহার্য :

বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ । শরীরের নানা স্থানের পেশীর স্বল্প-মান স্পন্দন ; রোগী (ব্রীলোক) মনে করে যেন অঙ্গ প্রত্যঙ্গ তাহার আপন নহে ; শরীরের উর্দ্ধ এবং নিম্নাঙ্গের পক্ষাঘাত ; চলিতে চলিতে বেথানে সেখানে টলিয়া পড়া ; সমুদয় শরীরের স্পন্দন ; পেশীর ভগ্নানক স্পন্দন (সিকুটা, কাইনষ্ট্, ট্রামন্) ; ঘুম হওয়া হওয়া সময়ে চমকিয়া উঠা এবং পেশীর স্পন্দন, (বেল, হায়োস্, ট্রামন্) ; শীত কম্প বাহা শরীরের উর্দ্ধভাগ হইতে নিম্নভাগে বিস্তৃত হয় ; চলিবার সময় অথবা সামান্য শারীরিক পরিশ্রমে ঘর্ম হওয়া ; নিহারাক্রান্ত (Frost-bite) হওয়ার স্থান স্থানে লালবর্ণ হওয়া এবং উহাতে চুলকানি এবং জালাহুভব ; বরফ বা বরফের সূচী বিঁধাইলে ঘেঁরুপ হয়, শরীরের স্থানে স্থানে সেরূপ অস্বভূত হয় ; মাতালদিগের শিরঃ-পীড়া । প্রাতঃকালে, আহারের পর, মৈথুন কার্যে অত্যাচারে, রাত্রিতে, শীতল বাতাসে, মানসিক পরিশ্রম বা চিন্তাতে, সূর্য্যের রশ্মিতে, বিপ্রায়ে, জল বৃষ্টি বা বজ্রাদি পতনের পূর্বে অসুখের বৃদ্ধি এবং নড়া চড়া বা চলিয়া বেড়াইলে অসুখের উপশম ইত্যাদি আগারিকাশের কতক গুলি বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ মধ্যে পরিগণিত ।

সমগুণ বিশিষ্ট ঔষধ । আগারিকাশের কার্যের সঙ্গে সিমি-সিফিউগা, ক্যানাবিস্ ইত্যিকা, হায়োসায়েরমাস্ এবং ওপিয়ামের কার্যের বিশেষ সাদৃশ্য আছে । এতদ্বির কোন কোন বিষয়ে ইহার কার্যের সঙ্গে ক্যাল্কেরিয়া কার্বোনিকা, সিকুটা, কফিয়া, কোনায়াস্, ল্যাকেসিস্, জাবরাশ্টি, নাক্স বমিকা, ফক্ষরাস্, ফক্ষরিক্ আসিড্, কাইনষ্টগ্, পাল্-সেটিল, টারেন্টুলা এবং ভিকানের কার্যের সাদৃশ্য আছে ।

প্রতিষেধক ঔষধ । ক্যান্ফার, কফিয়া, পাল্-সেটিল, সুরা ।

ডাইলুশন বিচার । ওর হইতে ৬ষ্ঠ ডালুইশনই সচরাচর অধিক ব্যবহৃত হইয়া থাকে । কোন কোন চিকিৎসকের মতে আগারিকাশের মূল আরোক দ্বারা মিশ্র আরোক অপেক্ষা অধিক উপকার দর্শে ।

আলোজ্,—আলোজ্

(ALOEES,—ALOE SOCOTRINA,—ALOE.)

সোকোট্রা দ্বীপে যে প্রকার আলোজ্ জন্মে (Socotrine Aloes) উহা বধা নিরমে প্রক্ স্পিরিটে ত্রিভাইয়া মূল আরোক প্রস্তুত হইয়া থাকে ।

সাধারণ ক্রিয়া । বস্তুতঃ উপর ইহার কার্য্য অতি প্রবল, বাহার দ্রুণ পিত্তের অতিরিক্ত সঞ্চায় হইয়া থাকে । দ্বিতীয়তঃ ইহা বৃহৎ অন্ত্রের পৈশিক অংশ এবং শুষ্ক আক্রমণ করে, বাহার দ্রুণ শুষ্ক অধিক পরিমাণে রক্তাধিক্য বা রক্তাবরোধ হইয়া অর্শরোগ হয় এবং বস্তিকোটরস্থ যন্ত্র, প্রধানতঃ স্ত্রীলোকের জননেন্দ্রিয় আক্রান্ত হইয়া থাকে । শুষ্কের উপর ইহার কার্য্যের বিষয় চিকিৎসকের বিশেষরূপে স্মরণ রাখা কর্তব্য ।

সাধারণ প্রাকৃতিক লক্ষণ ।

মন । মানসিক পরিশ্রমে অত্যন্ত অনিচ্ছা (নাক্স-বম), কারণ ইহা দ্বারা রোগী অত্যন্ত শ্রান্ত হইয়া পড়ে ; নড়িতে অনিচ্ছা ; পর্য্যায়ক্রমে মনের অবসন্নতা এবং চাঞ্চল্য ।

মস্তক । কপালের মধ্য দিয়া আড়াআড়ী বেদনা এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে চোকে ভারিবোধ এবং বমনোদ্বেগ (নাক্স-বম, পডোফ্) ; চক্ষু-কোটরে উপরিভাগে চাপিয়া ধরার দ্বারা ঘৃণা-বোধ বেদনা ; মাথার সম্মুখভাগে উক্ত প্রকারের বেদনা ; মাথার উপরিভাগে ভারিবোধ (ক্যাট্টে, সাল্ফ্) ; উচ্চতাতে মাথা বেদনার বৃদ্ধি এবং ঠাণ্ডা প্রয়োগে মাথা বেদনার উপশম (আস্) ; কোষ্ঠ পরিষ্কার না হওয়ার দ্রুণ মাথাধরা বা মাথা বেদনা ; পাকস্থলী এক অন্ত্রের অন্তর্গত মাথাধরা ।

চক্ষু । চক্ষুকোটরের মধ্যে বেদনা, বাঁহার দ্রবণ মনে হয় যেন বেদনা উক্ত স্থানের পেশীতে স্থিত ; এই বেদনা ডাইন পার্শ্বেই অধিক অনুভূত হয় (সিমিসিক্, স্পাইজেল্); পাখীর ডানা কাড়িলে যেদ্রবণ হয় চক্ষুর সম্মুখে সেদ্রবণ ধড়্ ফড়্ করা এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে মুখমণ্ডলে উচ্চাত্ত্ব ; চক্ষুর সম্মুখে যেন একটা হরিদ্রা বর্ণের আঙ্গুঠী নড়িতেছে এরূপ অনুভূত হয় ; রোগী চক্ষু ছোট করিয়া তাকাইতে বাধা হয় এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে কপালে বেদনা ; চক্ষে ভারি বোধ এবং বমনোদ্বেগ ।

মুখগহ্বর । দাঁতের অগ্রভাগের মধ্যদেশ ধারাল, বাঁহার দ্রবণ দ্বিহবার আঘাত লাগিয়া যা হয় ; মুখে ধাতুর স্বাদ এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে যুৎযুৎ শব্দ কাশি ।

পাকস্থলী এবং উদর । তিক্ত উদগার উঠা ; বক্ষাহির (Sternum) নীচে অত্যন্ত কষ্টদায়ক চাপাবোধ । বক্রত প্রদেশে অল্প, উষ্ণ, চাপা এবং কসিয়া ধরার ভাব অনুভূত হয় ; উদরের ডাইন পার্শ্বে পীজবার হাড়ের নীচে যুৎযুৎ বেদনা, দাঁড়াইলে বাঁহার বৃদ্ধি হয় ; উদর, বিশেষতঃ নাস্তিপ্রদেশ, বেদনামুক্ত ; উদরে মোড়ানোর জ্বর বেদনা, পেট কামড়ানো, বাঁহার দ্রবণ রোগী বসিয়া সম্মুখ পানে বাঁকিয়া পড়িতে বাধা হয় ; (কষ্ট, কলোস্, আইরিস্, বিরেট্-আক্) ; বাহ্যের বেগ, কিন্তু বেগ দিলে মল নির্গত না হইয়া কেবল কতক পরিমাণে দুৰ্গন্ধযুক্ত দূষিত বায়ু নির্গত হয় (ব্রাই) ; উদর ক্ষীত এবং বিস্তৃত (আন্টি-ক্রুড্, ব্রাই, চারনা), বিশেষতঃ উদরোৰ্দ্ধ প্রদেশ এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে উদরের নানা স্থানে দূষিত বায়ু (Flatus) ঘুরিয়া বেড়ায় (লাইকোপ্, হিপ্-পাল্ফ, পাল্ফ) ; শুষ্কতার দ্বারা আলা উৎপাদক, দুৰ্গন্ধযুক্ত দূষিত বায়ু নিঃসরণ বাঁহাতে পেটের বেদনার অনেক উপশম হয় ; দাত্তের সময়, উহার পূর্বে এবং পরে পেটকামড়ানো (মার্ক্) এবং মল ত্যাগের সময় প্রবল শব্দে দূষিত বায়ু নিঃসরণ (আগারি-কাশ, থুজা) ; উদরে দুৰ্জল লোপ, বাঁহার দ্রবণ মনে হয় যেন উদরাময় হইবে (কাইনট্) ; তলপেট এবং শুষ্ক ভারিবোধ ; মলত্যাগের সময় কৌণ পাড়ার সময় অথবা শরণাবস্থা হইতে উঠিবার সময়, স্পর্শ করিলে উদরের উপস্থিত পেশীতে বেদনার উদ্বেগ হয় ।

মল এবং মলদ্বার ; শুষ্ক উষ্ণ এবং ভারিবেশ ও উহাতে টাটানি ; শুষ্ক উষ্ণ এবং আলাহুতব (আস্) ; শুষ্ক দ্বারে চুলকানি এবং আলা (আস্, ক্যাঙ্ক, সাল্‌ক্) ; শুষ্ক দ্বারের সঙ্কোচক যন্ত্রের (Sphincter Ani) দুর্বলতা বা উহার শক্তির হ্রাস ; দিনের বেলা অনবরত বাহ্যের বেগ ; বাহ্যের বেগের দ্রুত রাত্রিতে ঘুম ভাঙ্গিয়া যায় ; বাহ্যের বেগের দ্রুত প্রাতঃকালে উঠার সময় বিছানা হইতে তাড়াতাড়ি পারধানার যাইতে বাধ্য হওয়া (আগা-রিকাশ্, পডোফ্, কমেঙ্ক্, সাল্‌ক্) ; বাহ্যের বেগের সঙ্গে সঙ্গে মূত্র নির্গমন ; উদরাময়ের বেগের জায় বাহ্যের বেগ, কিন্তু মল নির্গত না হইয়া কেবল উষ্ণ দূষিত বায়ু নির্গত হইয়া বেগের উপশম হয়, কিন্তু বারু নিঃসরণের পর আবার বাহ্যের বেগ পুনরায় আরম্ভ হয় ও মনে হয় যেন শুষ্ক দ্বারের উপরিভাগে একখানি কাঠ লাগিয়া রহিয়াছে (আনাকার্ড্) ; মল ত্যাগের পর মনে হয় যেন শুষ্ক আরো মল লাগিয়া রহিয়াছে (নাক্স-বম্) ; অসাড় বা অনিচ্ছাপূর্বক মল নির্গমন এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে দূষিত বায়ু নিঃসরণ (কস্-আস্) ; আহার বা পানের পরই বাহ্যের অত্যন্ত বেগ হয়, বাহার দ্রুত রোগী তাড়াতাড়ি পারধানার যাইতে বাধ্য হয় (কলোস্) ; বিনা বেগেই মল নির্গত হয় ; মল এবং মূত্র এক সঙ্গেই নির্গত হয় (হায়োস্) ; দাঁতের সময় অত্যন্ত দুর্বলতা এবং বলহীন ; মল পরিমাণে অল্প, কটার আভ্যন্তর, অর্ধ তরল ; মল উজ্জল হরিদ্রা বর্ণ (চেলিডন্), গোলাবির জায় ; তেলার জায় ; অলবৎ তরল ; ভিজা গোদের জায় অধিক পরিমাণে স্লেয়া মলত্যাগ ; শুষ্ক দ্বারে অর্শের বলি বাহির হয় (ক্যাক্-কার্ক্, ল্যাক্, পাল্‌স্, সাইলিসি) যাহা আঙ্গুর ফলের জায় ঝোপায় ঝোপায় প্রকাশ পায় (মিউর-আস্) এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে শুষ্ক অনবরত তৈলিয়া নামার জায় অশুভ হয় ।

মূত্রযন্ত্র । মূত্র ত্যাগের সময় মূত্র নালীতে আলাহুতব ।

জননেন্দ্রিয় । জীলোকের তলপেটে বেদনা, বাহার দ্রুত মনে হয় ; বন রজঃস্রাব শীঘ্রই আরম্ভ হইবে (কলোফিলাম্, সিমিসিক্, পাল্‌স্, সাক্স-নরিয়া) ; অরায়ু প্রদেশে পূর্ণ এবং ভারিবেশ এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে কোমর এবং কুঁচকি প্রদেশে প্রসব বেদনার জায় বেদনা, দাঁড়াইলে বাহার বৃদ্ধি হয় ; নিয়মিত সময়ের অনেক পূর্বে, প্রচুর রজঃস্রাব (আহ্, আমন-কার্ক্,

ক্যাঙ্কার্, নাক্স-বন্; খেত প্রদর এবং তদ্রূপ ঘোনিহার দিয়া রক্ত মিশ্রিত স্বেদ্য ভায় পদার্থ নির্গমন ও খেত প্রদর নিঃসরণের পূর্বে তল-পেটে শূল বেদনার ভায় বেদনা ।

প্রোবা এবং পৃষ্ঠদেশ । কোমরে বাতের বেদনা এবং উদার সঙ্গে পর্যায়ক্রমে শিরঃপীড়া ; বসিরা থাকিলে গুলু দ্বারের ঠিক উপরিতাণে চাপা এবং ভারিবোধ, নড়া চড়াতে বাহার উপশম হয় ।

কবহার । আমাশয় ; উদরাময় ; অশ্রোণ ; পেটকামড়ানী ; জর-রূর জড়তা ; রক্তস্রাব ইত্যাদি অস্থে আলোজ্ বাবহার্য্য ।

বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ । পৃষ্ঠদেশে বেদনা (বেল, মিথিসিক, নাক্স-বন্, পাল্‌স) ; অত্যন্ত বলক্ষয় এবং উদার সঙ্গে সঙ্গে বর্ষ (চায়না) ; বেদনাদি অলক্ষণ থাকে ; মোটা চর্কিযুক্ত শরীর এবং অগস বৃদ্ধ ব্যক্তি ; বৃদ্ধ বয়স । উষ্ণতা, উষ্ণ, ভিজা বায়ুতে, প্রাতঃকালে, অপরাহ্নে এবং সন্ধ্যার সময় ; বহির্বায়ুতে, নড়া চড়াতে, দাঁড়াইলে এবং আহারের পর অস্থখের বৃদ্ধি এবং সন্ধ্যার সময় ; বহির্বায়ুতে, নড়া চড়াতে, দাঁড়াইলে এবং আহারের পর অস্থখের বৃদ্ধি এবং ঠাণ্ডা প্রয়োগে, শীতকালে বা শীতল বাতাসে এবং দূষিত বায়ু (Flatus) নিঃসরণে অস্থখের উপশম ইত্যাদি আলোজের কতকগুলি বিশেষ প্রাকৃতিক নির্দিষ্ট লক্ষণ ।

সমুগ্ধ বিশিষ্ট ঔষধ । আলোজের কার্য্যের সঙ্গে ইন্ধুগাম্, কলিনগনিয়া, নাক্স-বমিকা এবং সাল্‌ফারের কার্য্যের বিশেষ সাদৃশ্য আছে । এতদ্বির কোন কোন বিষয়ে ইহার কার্য্যের সঙ্গে আর্সিনিক্, ক্রটন, চায়না, কলোসিয়, লাইকোপডিয়াম্, পডোক্সিগাম্ এবং গাল্‌গেটিনার কার্য্যের সাদৃশ্য আছে ।

প্রতিষেধক ঔষধ । সাল্‌ফার, মাষ্টার্ড (Mustard), বিনিগার, এবং বেজিটেবেল্‌ অসিড্‌স্ (Vegetable Acids) । ক্যান্‌ফার দ্বারা কতক-কণের ক্ষত্র উপশম হয় ।

ডাইলুশন বিচার । আমাশয় রোগে ৩, ৬ এবং ৩০ ডাইলুশনই অধিক ব্যবহৃত হইয়া থাকে । ডাক্তার ডানহাম্ (Dr. Dunham) এবং ডাক্তার ওয়েল্‌সের (Dr. Wells) মতে ইহার ২০০ ডাঃ দ্বারা অধিক উপকার

দর্শে । চিকিৎসার ফল দেখিয়া আমরা ডাক্তার ডান্হাম্ এবং ডাক্তার ওয়েল্‌স্ প্রভৃতি চিকিৎসক মহাশয়গণের উক্ত মতের পোষকতা করিতে পারি । অনেক কালের পুৰাতন আনাশয় রোগের চিকিৎসায় ২০০ ডাইলুশন ব্যবস্থা কবিতা অত্যন্ত ডাইলুশন অপেক্ষা অধিক ফল পাওয়া যাইতে দেখা যায় । আবার অনেক সময় তরুণ রক্তামশয় রোগে পেটকামড়াই এত প্রবল ও কষ্টকর হয়, যে কোন ঔষধ দ্বারাই উহার উপশম হয় না । এমতাবস্থায় আলোজ্ ২০০ ডাঃ, ৬ ফোঁটা মাত্রায়, ২১৩ মাত্রা সেবনে বিশেষ উপকার দর্শিতে দেখা যায় । এমনকি, অনেকের ১ মাত্রায়ই পেটকামড়াই সারিয়া যাইতে দেখা যায় ।

আলুমিনা,—আলাম্

(ALUMINA,—ALUM)

কোন এক বিশ্বস্ত হোমিওপ্যাথিক ঔষধালয় হইতে আদিত আলুমিনার গুঁড়া ক্রয় করিয়া উহার সঙ্গে যথা নিয়মে জ্বার অব্ মিক্ মিশাইয়া ৩য়-শততমিক ক্রম পর্য্যন্ত ইহাব গুঁড়া প্রস্তুত করিতে হয় ।

সাধারণ ক্রিয়া । গতি উৎপাদনের সহায়কারী ন্যায় ইহা দ্বারা সোজাসোজী আক্রান্ত হইয়া থাকে, যাহার দরুণ পক্ষাবাত উৎপন্ন হইয়া থাকে । কিন্তু শৈথিল্যিক কিল্লী (অল্প এবং যোনি দ্বারের শৈথিল্যিক কিল্লীই অধিক) ইহা দ্বারা বিশেষ রূপে আক্রান্ত হইয়া থাকে, যাহার দরুণ উক্ত অংশের নিঃসরণের পরিমাণের হ্রাস হইয়া উহাতে অত্যন্ত শুষ্কতা অমুভূত হয় এবং তদ্রূপ উহাতে অধিক বা সামান্য পরিমাণে উত্তেজনাও হইতে পারে ।

সাধারণ প্রাকৃতিক লক্ষণ ।

মন । স্বরণ শক্তির দুর্বলতা বা হ্রাস (আঘা, আনাকাড্, ক্রিফাজ্, লাক্, মার্ক্, নেট্রাম্-মিউর, নাক্স-গক্, ফস্-আম্); সময় যেন আন্তে আন্তে কাটে (নাক্স-বম্); অসহ ক্লান্তিবোধ (অরাম্); মনের ভাব সকল

সময়ে এক রকম থাকে না, অর্থাৎ রোগী কোন কোন সময়ে আপনার উপর অত্যন্ত বিশ্বাস করে, আবার কখন বা একবারে ভীত হয়; সর্বদা চিড়্ চিড়্, বক্ বক্ করা (কাম্); এক গৌরেশ্বরী (ব্রাই, নাক্স-বম্, কাম্); মানসিক অবসন্নতা (পাল্‌স্); ভবিষ্যতের বিপদের আশঙ্কা (আনাকাড্, অস্, চিনিনাম্ সাল্‌ফ্, ক্যাক্-কার্ক্)।

মস্তক। মাথাঘোরা, যাঁহার দক্ষণ মনে হয় যেন চতুঃপার্শ্ববর্তী বস্ত্র চক্রাকায়ে ঘুরিতেছে (আর্গিকা, বেল, কোনায়াম্, ব্রাই, নাক্স-বম্) এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে বারম্বার বমনোদ্বগ হইতে হইতে মূর্ছার ভাব (লোবি-লিথ) ; প্রাতঃকালে মাথাঘোরা (ফন্, নাইটিক্-অস্), চক্ষু মেলিলে মাথা ঘোরা (ল্যাক্) ; অচেতনতাব ভাব নিদ্রা এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে সমুখ পানে টলিয়া পড়ার ভাব ; মস্তিষ্কে স্থী বিধানের ভ্রায় প্রথমে বেদনা এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে বমনোদ্বগ ; দাঁড়াইয়া বা বসিয়া থাকিলে কপালে জ্বালাযুক্ত, বা চাপিয়া ধরাব ভ্রায় বেদনা এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে উষ্ণাভব, বহির্বাণুতে যাহার উপশম হয় ; মাথার উপরিভাগে চিড়িক্ মাঝার ভ্রায় বা দপ্‌দপিয়া বেদনা ; আঁটা টুপী পরিলে যেকপ হয়, কপালে সেকপ চাপা বোধ ।

চক্ষু। চক্ষে জ্বালা এবং চাপা বোধ (অস্); চক্ষে কম বা ঝাপসা দেখা, যাঁহার দক্ষণ রোগী চক্ষু বারম্বার মুছিয়া ফেলিতে বাধ্য হয় এবং চক্ষু বাহা মুছিয়া ফেলিলেই সারিয়া যায় (ক্রোকাশ্, পাল্‌স্); প্রদীপের আলোক যেন সূর্য্য বা চন্দ্ৰের বেটেক মণ্ডলেব ভ্রায় মণ্ডল দ্বারা পরিবেষ্টিত বলিয়া অনুভূত হয় ; ঘুম হইতে জাগিলে চক্ষুর পাতায় পাতায় লাগিয়া থাকে (আন্টি-ক্রুড্, সাইলিস, সাল্‌ফ্) এবং চক্ষু মেলিলে চক্ষে জ্বালাযুক্ত ও আলোক পানে তাকাইতে অশক্তি (একন্, বেল্, লাইকোপ্); চক্ষুর পাতা পুষ্ক হয় (পাল্‌স্, গ্রাফ্); চক্ষুর পাতা শুষ্ক এবং জ্বালাযুক্ত ।

কর্ণ। সন্ধার সময় এক কান লালবর্ণ এবং উহাতে উষ্ণাভব; সন্ধার সময় বা রাত্রিতে কানের মধ্যে স্থী বিধানের ভ্রায় বাতনা ।

নাসিকা। চট নাসাবন্ধুর সম্ভাবর্ত্তী ছাড় ক্ষীত, লালবর্ণ এবং স্পর্শনে বেদনাযুক্ত (অস্, মার্ক্); নাকের বাম পাতার ক্ষীতি এবং কঠিনতা ; নাকের আগা ফাটাযুক্ত : নাসাবন্ধু ক্ষত (আন্টি-ক্রুড্,

অরাম্ গ্রাফ্, ক্যালী-বাই, নাইট্রিক্-অস্, পাল্‌স্) ; নাসিকার পুরাতন শৈল্পিক রোপ্, এবং তদ্রূপ নাসাবদ্ধেব মধ্যে মরা চানড়ার ছায় খোঁসা বা চুমটী বিশিষ্ট ক্ষত ও নাক দিগা হরিত্রা বর্ণের গাঢ় শ্বেদা নির্গমন (ব্যারাইটা-কার্ক্, গ্রাফ্, হিপ্-সাল্‌ফ্, ক্যালী-বাই, মার্ক্, পাল্‌স্) ।

মুখমণ্ডল । ডিমের লাল লাগিয়া শুকাইয়া থাকিলে যেরূপ হয়, মুখমণ্ডলে সেকপ কসিয়া বা চাপিয়া ধবাব ছায় অন্তর্ভূত হওয়া (ব্যারাইটা-কার্ক্, ক্যালেন্ড্, গ্রাফ্, সাল্‌ফ্-অস্) । নিম্ন মাড়ির অনিচ্ছাপূর্বক আক্ষেপিক স্পন্দন বা সঞ্চালন ।

মুখগহ্বর এবং গলার মধ্য । দাঁত যেন নড়ে এবং স্বাভাবিক অপেক্ষা অনেক লম্বা হইয়াছে একপ অন্তর্ভূত হয় (কার্কো-আনিমেগ্, মার্ক্, নাইট্রিক্-অস্) ; মুখে লালের অধিক সঞ্চাব, অগচ মুখে শুষ্কবোধ ; মাড়ি ক্ষীত এবং উহা স্ফীত রক্ত পড়া (মার্ক্, নাইট্রিক্-অস্) ; গলার মধ্য লালবর্ণ এবং ক্ষীত (বেল্, লাক্, মার্ক্) ; সন্ধার সময় গলার মধ্যে অত্যন্ত শুকাইয়া, বাহার দ্রুপ রোগী গলা থেকুব দিয়া বারম্বার গলার মধ্য পরিকার কবিত্তে বাধ্য হয় ; প্রাতঃকাল এবং সন্ধার সময় গলার মধ্যে আঁটাল শ্লেষ্মাব সঞ্চাব (আমন্‌মিউব্, ক্যালী-বাই) ; এক-খানি কাঠের চৌচ বিবিধা থাকিলে যেকপ হয়, গলার মধ্যে সেকপ অন্তর্ভূত হয় (আর্জেন্ট্-নাইট্রিক্, নাইট্রিক্-অস্, হিপ্-সাল্‌ফ্) ; গিলিবীর সময় আচাববহা গলনালীর উপরিভাগ চইতে পাকস্থলী পর্য্যন্ত সঙ্কোচনের ছায় অন্তর্ভূত হওয়া (লাইকোপ্) ; ডেলার ছায় কোন পদার্থ লাগিয়া থাকিলে যেকপ হয়, গলার মধ্যে সেকপ চাপা বোধ এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে গলার মধ্যে টাটানি, শ্বশ্বে এবং শুষ্ক বোধ ।

পাকস্থলী এবং উদর । ক্ষুধা বা রুচী একবারেই থাকে না, (অস্, কাক্-কার্ক্, চায়না, নেট্রাম্-মিউর, সাল্‌ফ্) ; মাংসে অরুচি (আণিকা, কার্কো-পেজ্, গ্রাফ্, সাল্‌ফ্) ; ময়দা কি চা খড়ি, কাঠের কয়লা এবং এই প্রকার অন্যান্য প্রকারের অপাক কারক দ্রব্যে স্পৃহা ; টক্ উদার উঠা (কার্কো-বেজ্, ফস্, নাক্স-বম্, সাল্‌ফ্) ; বৃক্‌ জ্বালা ; পাকস্থলীর সঙ্কোচন এবং মোচড়ান যথা আচাববহা গলনালী দিয়া গলার মধ্য পর্য্যন্ত বিস্তৃত

হয়। মাথা হেট করিয়া উপুড় হইলে উদরের ডাইন পার্শ্বে খেঁৎলিয়া বাগুয়া বা মোচড়াইয়া পড়ার ভ্রায় বেদনা এবং সোজা হইলে উক্ত প্রদেশে হঠাৎ বিধানের ভ্রায় বাতনা; অল্প বৃদ্ধিতে (Hernia) বেরূপ হয়, উদরের ডাইন পার্শ্বের আব্দোমিনেল্ রিংয়ের (Abdominal Ring) স্থানে সেরূপ বাটিয়া বা চাপিয়া ধরার ভ্রায় বেদনা (কোকাস্, নাইটি ক্-আস্, নাক্স্-বম্)।

মল । গুহের জড়তা (ক্যাম্ফার, ওপিয়াম্, দিপিরাম্), বাহার দরূণ নরম মল ত্যাগ করার সময়ও অত্যন্ত কৌণ্ পাড়িতে হয় (কার্কো-বেজ্, চায়না); অঙ্গের মধ্যে অধিক মল সঞ্চিত না হইলে বাহ্যেব বেগ হয় না, অথবা মল ত্যাগের ক্ষমতাও থাকে না; গুহদ্বারে চুলকানি এবং জ্বালা (আস্, সিনা, গ্রীক্, সাল্ফ্); মল ত্যাগের পর গুহদ্বারে ছাল উঠিয়া যায় এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে গুহেব সঙ্কোচন এবং গুহদ্বারে বাটিয়া ধরা (নেট্রাম্ মিউর); মল ভেড়ার মলের ভ্রায় কঠিন গুট্টলে (ওপিয়াম্, প্লাথাম্); মল ত্যাগের সময় গুহদ্বারে কর্তনবৎ বেদনা এবং তৎপর রক্ত পড়া (মার্ক্, নাক্স্-বম্); যে সকল জীলোক শিশুগণকে শুন দ্বন্দ্ব পান করার তাহাদিগের কোষ্ঠবদ্ধ (ওপিয়াম্, নাক্স্-বম্)।

মূত্রযন্ত্র । মল ত্যাগের সময় কৌণ্ পাড়া কালীন মূত্র নির্গমন, অথবা কৌণ্ না পাড়িয়া রোগী মূত্র ত্যাগ কবিত্তে পারে না; মূত্রাধার এবং জননেস্ত্রিয়ে দুর্বল বোধ।

জননেস্ত্রিয় । দিনের বেলায় জীলোকেব পচুর পরিমাণে, (আগা-রিকান্) ক্ষতকারক বা উগ্র স্বেতপ্রদব নিঃসরণ যাহা পায়ের পাতা পর্যন্ত বহিয়া পড়ে; উগ্র, ক্ষতকারক স্বেত প্রদর এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে জননেস্ত্রিয়ে জ্বালাগুক্ত বাতনা; যোনিদ্বাৰাদি ক্ষীত এবং ক্ষতযুক্ত হয় (কোনারাম্, স্যারোড্, ক্রিগাজ্, মার্ক্, কস্, পাল্ফ্), বাহার দরূণ সময় সময় অত্যন্ত কষ্ট অনুভূত হয় এবং ঠাণ্ডা জল দ্বারা আক্রান্ত স্থান ধোয়াইয়া দিলে বাহার উপশম হয়; কষ্টকর স্বপ্ন রজ্জ্বস্রাব এবং তদরূপ কিকারজ বিশিষ্ট রক্তস্রাব (কস্); রজ্জ্বস্রাবের পর শরীর এবং মন উভয়েরই অবসন্নতা (আবন্-কার্ক, কার্কো-আনিবেল্, ককিউলাস্)।

খাদ্যবস্ত্র । ক্রমাগত গুল্ গুল্ শুক কাশি এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে

বসন এবং স্বাস্থ্যেরোধ হওয়া; রাক্তিতে শুষ্ক কাশি (সিহিসিক্, হায়োস্, লাইকোপ্) এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে গলার মধ্য শুষ্কানুভব; কাশি এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে গলার মধ্য এবং বুকে বেদনা ও অনিচ্ছাপূর্বক বা অসাড়ো বৃদ্ধি নির্গমন (কষ্ট্, কল্চ্) ; প্রতিদিন প্রাতঃকালে অনেকক্ষণ ধরিয়া শুষ্ক কাশি, অতি কষ্টে কতক পরিমাণে সাদা স্লেয়া নির্গত হইয়া বাহার শেষ হয়; মাথা হেট করিয়া উপুড় হইয়া থাকিলে উদরের বাম পার্শ্ব হইতে বৃকের মধ্যভাগ পর্য্যন্ত স্থচী বিধানের জায় বেদনা বা যাতনা ; কথা বলিলে বৃকের টাটানি বৃদ্ধি পায়; কোন ভারি দ্রব্য উঠাইলে বৃকে টাটানির বৃদ্ধি বা টাটানির উদ্বেগ হয় (রাস্টক্স) ।

পৃষ্ঠদেশ । খেঁতলিয়া গেলে বা মোচড়াইয়া পড়িলে যেরূপ হয়, পৃষ্ঠদেশ এবং কোমরের পশ্চাৎদেশে সেরূপ বেদনা; কোমর প্রদেশস্থ মেরুদণ্ডের মধ্য দিয়া তন্তু লোহ বিধাইলে যেরূপ হয়, পৃষ্ঠদেশে সেরূপ যাতনা ।

অঙ্গ, প্রত্যঙ্গ, হাত, পা ইত্যাদি । পেশী ইত্যাদি খেঁতলিয়া গেলে বা মোচড়াইয়া পড়িলে যেরূপ হয়, স্বক্কের সন্ধিতে সেরূপ বেদনা, বাহ উপরের দিকে উঠাইলে বাহা অধিক অশুভূত হয়; হাতের আঙ্গুলের নখের নীচে চর্কণবৎ বেদনা । পায়ের আঙ্গুল লালবর্ণ হয় এবং চুলকায় (আগারিকাশ্) ; শরীরের নিম্নাংশে অত্যন্ত ভারিবোধ, বাহার দক্ষণ উহা সঞ্চালন করিতে অত্যন্ত কষ্ট অশুভূত হয় বা উহা একবারেই সঞ্চালন করা যায় না । চলিয়া বেড়ানোর সময় হেলিয়া টলিয়া পড়া বা পা কাঁপা, বাহার দক্ষণ রোগী বসিয়া পড়িতে বাধ্য হয়; সন্ধ্যার সময় উক্ত লক্ষণ প্রকাশ পায় ; দিনের বেলা ভিন্ন বা চক্ষু না মেলিয়া রোগী চলিতে পারে না ; বসিয়া থাকিলে পায় ঝি ঝি ধরে বা একবারে অবশ ও অসাড় হয়; বসিয়া থাকিলে পায় অত্যন্ত ক্লান্তি বা শ্রান্তিবোধ ; পা এবং উরুদেশে অনেকক্ষণ ধরিয়া কসিয়া ধরা, বাহার দক্ষণ মনে হয় যেন উহাতে খিল ধরিয়াছে এবং বাহা নিম্নদিকে বিস্তৃত হয়; হাঁটু কাঁপে; পায়ের ডিমে বারম্বার খিল ধরা; চলিবার সময় পায়ের গোড়াড়ীতে (Heel) অবশবোধ; অত্যন্ত কোমল এবং স্ফীত হইলে যেরূপ হয়, পায়ের পাতার তলায় সেরূপ বেদনা (আন্টি-ক্লড্) ।

চর্ম্ম । সমুদয় শরীরে অসহ বেদনা, বিশেষতঃ শরীর উত্তম্প হইলে

বা বিছনায় শয়ন করিয়া থাকিলে ; যে পর্য্যন্ত রক্ত না পড়ে, রোগী সে পর্য্যন্ত শরীর চুলকায় এবং চুলকানের পর অত্যন্ত জ্বালায় উদ্বেক হয় (ক্রিমোটস্, মার্ক্, মেজিরিয়াম্, সাল্ফার) ; গায় শুক টেটারের ত্রায় (Tettary), চুলকানি বিশিষ্ট কুস্তুভী ।

নিদ্রা । নিদ্রা উদ্বিগ্নযুক্ত এবং নিদ্রাবস্থায় গোলমালে বোধ ও স্বপ্ন দেখা ; চোবের বিষয় স্বপ্ন দেখা ।

ব্যবহার । পুৰাতন আকাবের অস্থখ, বিশেষতঃ বায়ুনলপ্রদাহ, আহারবহা গলনালীৰ উপরিভাগেৰ শ্লেষ্মাজনিত অস্থখ ; শ্বেতপ্রদর এবং প্রমেহ রোগ ; কোষ্ঠবদ্ধ ; সীসাজনিত শূলবেদনা ; বকৃতের অস্থখ ; কন্দে-
রুকাব বিকৃতাংশ জনিত অস্থখ ; লোকোমটোর আটাক্সি (Locomotor Ataxy) নামক পক্ষাঘাত ; ক্লোরোসিস (Chlorosis) ; অরায়ু তানদ্রষ্ট হওয়া (Prolapsus Uteri) ইত্যাদি অস্থখে আনুগুণ্য ব্যবহার্য্য ।

বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ । অত্যন্ত শ্রান্তি এবং অবসন্নবোধ, বাহ্যর দৰ্শন রোগী বসিয়া পড়িতে বাধ্য হয় (চারনা, সাল্ফ) ; কোন প্রকারের প্রবল কঠিন ব্যায়াম চইয়া গেলে ঘেঁরুপ হয়, চলিবার সময় সেরূপ পা কাঁপে ; অলসবোধ বা গা মাটি মাটি করা এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে শবীরের কম্পন (চারনা, সাল্ফ) ; কন্দে-রুকা মজ্জার অস্থখের দৰ্শন পক্ষাঘাত ; রোগী চক্ষু বুজিয়া চলিতে পারে না ; সর্কদা ক্লান্তিবোধ এবং নিদ্রার ভাব । জীর্ণ শীর্ণ শরীর, বৃদ্ধ বয়স ; শৈশবাবস্থা (কোষ্ঠবদ্ধ), যৌবনাবস্থায় (মূত্রিকা পাণ্ডুরোগ) ; রোগের বারম্বার পুনরাক্রমণ । প্রাতঃকালে ঘুম ভাঙ্গিলে, সন্ধ্যার সময়, দিনের বেলায় (শ্বেতপ্রদর) ; শীতকালে, অমাবস্থা পূর্ণিমা তিথিতে, একদিন অন্তর একদিন, নড়াচড়াতে, ঠাণ্ডা দ্রব্য খাইলে, গোল আলু খাইলে, মাংসের কোল খাইলে অস্থখের বৃদ্ধি এবং বহির্বাযুতে, ঠাণ্ডা জলে স্নান করিলে, উষ্ণ দ্রব্য খাওয়ার সময় অস্থখের উপশম ইত্যাদি আনু-
গুণ্য কতকগুলি বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ ।

সমগুণবিশিষ্ট ঔষধ । আনুগুণ্য কার্যের সঙ্গে ব্যারাইটা-
কার্ক্, প্রায়াম্ এবং কোনায়ামের কার্যের বিশেষ সাদৃশ্য আছে । গুহের
উপর ইহার কার্য অনেকটা বিরেট্রাম্ আগ্নায়ামের ত্রায় । এতদ্বির কোন

কোন বিষয়ে ইহার কার্যের সঙ্গে অরাম্, গ্রাফাইটিস্, ব্রাইওনিয়া, ফেরাম্, ইপিকাকিউএনা, ল্যাকেসিস্, ফক্ষরাস্, মার্কিউরিয়াস্, নাক্স-বমিকা, পাল্‌সেটলা এবং সাল্‌ফারের কার্যের সাদৃশ্য আছে।

প্রতিষেধক ঔষধ । ব্রাইওনিয়া, ক্যাম্ফার, ক্যামোমিলা, নাক্স বমিকা, ইপিকাকিউএনা ।

ডাইলুশন বিচার । ৬,১২ এবং ৩০ ডাইলুশনই অধিক ব্যবহৃত হয় ।

আনাকার্ডিয়াম্ ওরিয়ান্টেল্,-(ভেলা গোটা),-আনাকার্ড্

(ANACARDIUM ORIENTALE,—ANAC.)

ভেলা গোটার বহির্দেশের খোসার মধ্যের কোষে যে এক প্রকার রস থাকে, তাহাই হোমিওপ্যাথিক মতে ঔষধার্থ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এই রস দ্বারা রক্তকণক কাপড়ে চিহ্ন দিয়া থাকে। এই রস বথ্য নিয়মে হৃগ্নাব্ মিস্কের সঙ্গে মিশাইয়া ইহার ঙ্‌ড়া প্রস্তুত হইয়া থাকে। ইহার আরোকও প্রস্তুত হইতে পারে।

সাধারণ ক্রিয়া । জ্ঞান উৎপাদনের সহায়কারী ঝায়ুমণ্ডলে ইহার কুর্য্য অতি প্রবল, যদ্বারা ইহা মস্তিষ্ক এবং বিশেষ বিশেষ জ্ঞানেন্দ্রিয়কে অসন্ন করিয়া মস্তিষ্ক এবং সমুদয় ঝায়ু মণ্ডলীর দুর্বলতা উৎপাদন করে। চক্ষের উপরও ইহার কার্য্য অতি প্রবল।

সাধারণ প্রাকৃতিক লক্ষণ ।

মন । স্মরণ শক্তির অত্যন্ত দুর্বলতা বা হ্রাস (আগ্‌নাশ্, আদ্বা, ক্রিয়াজ্, লাক্, মার্ক্, নেট্রাম্-মিউর, নাক্স-মফ্, ফস্-মাস্); মনের উদ্বেগ বা চিন্তা এবং ভবিষ্যতে কোন বিপদ ঘটিবে এরূপ আশঙ্কা (আস্, আলাম্, ক্যাক্-কার্ক্, চিনিনাম্-সাল্‌ফ্); শপথ করা এবং অভিশাপ দেওয়ার অনিবার্য্য ইচ্ছা (বিরেট্-আব্); অত্যন্ত খিট্‌খিট্‌ করা, রাগান্বিত হওয়া এবং প্রতিবাদ করার স্বভাব (ব্রাই, ক্যাম্, নাক্স-বম্, হিপ্-সাল্‌ফ্, ক্যালী-ক্লোরেট্);

রোগী মনে করে যেন তাহাকে জুইটা ইচ্ছার পরিচালনা কবিতেছে, বাহার একটীতে, একটা কার্য্য করিতে বলে, অপরটা উহা করিতে বারণ করে ; চলিবার সময় মনে হয় যেন এক ব্যক্তি পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিতেছে, বাহার দক্ষণ ভয়ের উপর হয় ; পৃথিবীর সমুদয় বিষয় হইতে বিচ্ছিন্ন হওয়ার ইচ্ছা এবং আপনার উপর এত অবিশ্বাস হয় যে, উহার দক্ষণ রোগীকে যে কার্য্য করিতে বলা যায় সে যেন তাহা সুসম্পন্ন করিতে পারিবে না তাহার একরূপ বিশ্বাস হয় ; ভ্রম (হায়োস্, ট্রামিন্) ।

মস্তক । সমুদয় জ্ঞানেন্দ্রিয়ের দুর্বলতা ; মাথার উপরিভাগের বাম পার্শ্বে যেন একখানি কাঠের চৌচ বিধাইয়া রাখিয়াছে এরূপ অনুভূত হয় এবং তদক্ষণ উক্ত স্থানে চাপাবোধ ; কাশির সময় বা দীর্ঘ নিশ্বাস টানিবার সময় মাথার উপরিভাগে চাপিয়া ধরার জায় বেদনা ; কাঁটা মারিয়া রাখিলে বেরূপ হয়, কপালের জুই পার্শ্বে সেরূপ চাপিয়া ধরার জায় ঘৃণ্মুণ্ণে বেদনা (আগারিকাম্, আর্পিকা, কফিয়া, ইগ্‌নেস্) ।

চক্ষু । ডাইন চক্ষুর কোটরের ঠিক উপরের কিনারায় ঘৃণ্মুণ্ণে চাপাবোধ ; চক্ষে আপ্সা বা অস্পষ্ট দেখা ; চক্ষুর তারা সঙ্কুচিত ; সন্ধ্যার সময় প্রদীপের চতুর্দিক যেন সূর্য্য বা চন্দ্ৰের বেটকের জায় একটা বেটক দ্বারা পরিবেষ্টিত বলিয়া দৃষ্ট হয় ।

কর্ণ । ক্ষত হইলে বেরূপ হয়, দাঁতে দাঁতে চাপিলে বা কামড়াইলে কানে সেরূপ বেদনা ; কানে গুণ্ গুণ্, ভন্ ভন্ শব্দ হওয়া ।

নাসিকা । প্রাতঃকালে ঘুম হইতে উঠিলে নাকে যেন সোলা পোড়ার গন্ধের জায় কার্বনিক গন্ধ লাগে ; নাকে অনববত পারমা বা মুরগীর গুয়ের গন্ধের জায় গন্ধ লাগে, আপন গায়ের কাপড় সোঁকাইলে বাহা অধিক অনুভূত হয় ।

মুখগহ্বর এবং গলার মধ্য । সামান্য ঘবিলেই মাড়ি দিয়া রক্ত পড়ে ; মুখের মধ্যে অত্যন্ত কষ্টদায়ক ফোকা পড়া (নাইট্রিক-আস্) ; হয় মুখে কোনও স্বাদ থাকে না, নতুবা মুখে এবং আহারে অত্যন্ত বিশি স্বাদ । টাচিয়া কেলিলে বেরূপ হয়, গলার মধ্যে সেরূপ অনুভূত হয় ।

পাকস্থলী এবং উদর । মধ্যাহ্নে আহারের সময় সমুদয় উপদ্রব

বা লক্ষণ অনুষ্ঠ হর এবং আহায়ের প্রায় ২ ঘণ্টা পর উহা পুনরায় আরম্ভ হয় ; হিঙ্গা, উদগার উঠা, বমনোবেগ এবং বমন । একখানি চোঁচ বা কাঠের টুকরা অস্ত্রে মোচড়াইয়া ঝাঁপাইয়া দিলে যে রূপ হয়, নাভির চতুর্স্পর্শবর্তী স্থানে সেরূপ বেদনা বা যাতনা, উদরে অনবরত গড়্, গড়্, কল কল শব্দ হওয়া (লাইকোপ্) ।

মল এবং মলদ্বার । বারবার অত্যন্ত বাহ্যের বেগ, কিন্তু বারবার মল ভ্যাগের জন্ত কোঁথ পাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বেগ কমিয়া যায় এবং মল এক-বারেই নির্গত হয় না ; শুধু যেন কোন শক্তি থাকে না এবং মনে হয় যেন শুধু একটি ডেলার জায় কোন কঠিন পদার্থ বা একখানি কাঠের টুকরা লাগিয়া থাকিয়া গুল্মদ্বার রুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে (আলোজ্) ; শুধুর জড়তা, এমন কি সামান্য পরিমাণ মলও অতি কষ্টে নির্গত হয় (আলাম্) ।

শ্বাসযন্ত্র । একখানি ছিপি বা ডেলার জায় কোন পদার্থ লাগিয়া থাকিলে যে রূপ হয়, বুকের ডাইন পার্শ্বে সেরূপ ঘূর্ণঘূর্ণে চাপাবোধ ; হৃৎপ্রদেশে স্থচী বিধানের জায় প্রথর বেদনা, কোমরের পশ্চাৎদেশ পর্যন্ত বাহা বিস্তৃত হয় ।

গ্রীবা এবং পৃষ্ঠদেশ । ঘাড় শক্ত হয় বা উহা নোয়ান যায় না (রাস্টন্স) ; বাম কক্ষাঙ্কিতে স্থচী বিধানের জায় ঘূর্ণঘূর্ণে বেদনা, আন্তে আন্তে বাহা রোগীকে আক্রমণ করে ।

অঙ্গ, প্রত্যঙ্গ, হাত, পা ইত্যাদি । কোন একটা ভরি বস্তুর হঠাৎ আঘাত লাগিলে যে রূপ হয়, বাম বাহির মধ্যভাগে সেরূপ বেদনা ; হাতে অত্যন্ত শুকাইয়া যাইতে ; হাতের পাতা এবং হাতের আঙ্গুলের সন্ধিতে থিল ধরার জায় যাতনা । কসিয়া বন্ধনী (Bandage) বাঁধিয়া রাখিলে বা কসিয়া ধরিলে যে রূপ হয়, বসিয়া থাকিলে হাঁটুর সন্ধিতে সেরূপ বেদনা, বা হাঁটুর সন্ধি শক্ত হয় বা উহা নোয়ান যায় না ; হাঁটুতে পক্ষাঘাতের জায় অশাড় এবং অবশবোধ ও উহার সঙ্গে সঙ্গে হাঁটুতে ক্লান্তিবোধ এবং হাঁটু শক্ত হয় বা উহা নোয়ান যায় না, যাহার দরুণ রোগী চলিতে পারে না ; গোড়াড়ী (Heel) হইতে ডিম পর্যন্ত পারের সমুদয় অংশে সবিরাম আকারের থিল ধরার জায় কসিয়া ধরা ; চলিয়া বেড়াইবার সময় অথবা বসি অবস্থা হইতে দাঁড়াইলে পায়ের ডিমে (খোড়ার) থিলধরা ; পাছার বাম দিকের পেশীতে

(Left Gluteal muscles) যেন একখানি কাঠ কুটির। রহিয়াছে এমন অস্থ-
কৃত হয়; উরুদেশে কষ্টদায়ক ঘুশ্ ঘুশে রকমের চাপাবোধ, থাকিয়া থাকিয়া,
কখন কখন বাহার হঠাৎ উদ্বেক হয়; পায়ের টিবিয়া (Tibia) নামক হাড়
কসিয়া ধরার জার কষ্টদায়ক বেদনা।

চর্ম্ম । শরীরের স্থানে স্থানে দাঁদের জার সাদা ফুসুড়ী বা দাগ পড়া;
অত্যন্ত চুলকানি বিশিষ্ট ফুসুড়ী; চর্ম্মের চুলকানি, চুলকাইলে বাহার বৃদ্ধি
হয়; গায় স্পর্শ জ্ঞান শূন্যতা সম্বলিত কুষ্ঠ রোগের (Anæsthetic Lepra)
জার ফুসুড়ী।

ব্যবহার । নানা প্রকারের উন্নততা; এই ঔষধের মনের প্রাকৃ-
তিক লক্ষণ সম্বলিত নানা প্রকারের ভ্রাসবিক অস্থ; হৃৎপিণ্ডের অস্থ; ;
পেটের অস্থ অনিত এবং ভ্রাসবিক শিরঃপীড়া; স্মরণ শক্তির দুর্বলতা, হ্রাস
বা একবারে বিনাশ; আক্রান্ত স্থানে স্পর্শ জ্ঞান শূন্যতা সহ কুষ্ঠরোগ
(Anæsthetic Lepra); দাঁদের জার কোন কোন প্রকারের চর্ম্মরোগ
ইত্যাদিতে আনাকাড়িয়াম্ ব্যবহার্য্য।

বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ । সমুদয় শরীরের দুর্বলতা, বাহার
দ্রুণ রোগী দিবা রাত্রিই বসিয়া বা শুইয়া থাকিতে চাহে (ককিউল);
নীচের ঘর হইতে সিঁড়ি ভাঙ্গিয়া উপরের ঘরে উত্তীয়ার সময় অবসন্নতা বা
মূর্ছার ভাব; একখানি কাঠের চৌচ বিধিয়া থাকিলে যেকোন হয়, শরীরের
স্থানে স্থানে সেরূপ চাপিয়া ধরা বা বিঁধানের জার বেদনা বা যাতনা; যেন
কর যেন আক্রান্ত স্থান একটা লোহের নাগ বা লোহের পাত দিয়া কসিয়া
বাঁধা রহিয়াছে; আক্রান্ত স্থানে পক্ষাঘাতের জার দুর্বলতা এবং কম্প-
মান দুর্বলতা; হঠাৎ ঠাণ্ডা বাতাস গায় সহ হয় না; সহজেই সর্দি লাগে
(বেল); ভ্রাসবিক এবং হিষ্টিরিয়া আক্রান্ত রোগী, বৃদ্ধ বয়সে, গর্ভাবস্থার
এবং বাহাদিগের মনোঅনুততা (Hypochondriasis) থাকে, ভাহাদিগের
পক্ষে বিশেষ উপকারী। প্রাতঃকালে এবং সন্ধ্যা হইতে রাত্রি দুই প্রহর
পর্যন্ত, বসি বা শয়নাবস্থা হইতে উঠিলে অস্থধের বৃদ্ধি এবং রাত্রি দুই প্রহ-
রের পর, দিনের বেলা, শয়ন করিয়া থাকিলে, অথবা বর্ষণে অস্থধের উপশম
ইত্যাদি আনাকাড়িয়ামের কতকগুলি বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ।

সমগুণ বিশিষ্ট ঔষধ। বস্তিকের উপর আনাকাউরিনের কার্য কক্ষরিক্, আসিঙ্ক্ এবং জিকের ভায়। চর্মের উপর ইহার কার্য এপিস্, ক্রোটন্, রাস্টক্স্, মেজিরিয়াম্ এবং আর্টিকার ভায়। এতদ্বিন্ন কোন কোন বিষয়ে ইহার কার্যের সঙ্গে একোমাইট্, আসিনিক্, ক্যালকেরিয়া, কার্বোনিফা, নাল্-মফাটা এবং নাল্ বমিকার কার্যের সাদৃশ্য আছে।

প্রতিষেধক ঔষধ। কফিয়া, ক্যাম্ফার।

ডাইলুশন বিচার। ৬, ১২ এবং ৩০ ডাইলুশনই সচরাচর অধিক ব্যবহৃত হইয়া থাকে। স্মরণ শক্তির হ্রাস বা বিনাশে কখন কখন ২০০ ডাইলুশন দ্বারা অত্যন্ত ডাইলুশন অপেক্ষা অধিক উপকার পাওয়া যায়।

ব্রোমিয়াম্,—ব্রোমিন্,—ব্রোমিন্.

(BROMIUM,—BROMINE,—BROM.)

কোন এক বিষন্ত হোমিওপ্যাথিক ঔষধালয় হইতে আদিত ব্রোমিন্ ক্রম করিয়া উহার ১ ফোঁটা (মিনিম্), ২৯৯ ফোঁটা (মিনিম্) চূর্ণান জলে মিশাইয়া ইহার ১ম শততমিক ডাইলুশন প্রস্তুত হইয়া থাকে। ইহার ৩য় দশমিক ক্রম যথানিয়মে ডাইলুট্ স্পিরিটে প্রস্তুত হয়। ৪র্থ এবং ততোধিক ক্রমের আরোক যথানিয়মে রেক্টিফাইড্ স্পিরিটে প্রস্তুত হইয়া থাকে। ইহার প্রথম শততমিক ক্রমের আরোক চূর্ণান জলে প্রস্তুত হওয়ার দক্ষণ ইহা অনেক দিন ভাল থাকে না। অতএব উক্ত ক্রম আবশ্যক হইলে সদ্য সদ্য প্রস্তুত করিয়া লওয়া উচিত।

সাধারণ ক্রিয়া। ঐন্দ্রিয়িক বিলীল উপর, বিশেষতঃ স্নায়বস্ত্রের ঐন্দ্রিয়িক বিলীল উপর, ইহার কার্য অতি প্রবল। বায়ুনলের উপরিভাগ বা কর্ণনালীই ইহা দ্বারা অধিক আক্রান্ত হইয়া উহা অভ্যন্ত প্রদাহযুক্ত হয় এবং উহাতে এক কৃত্রিম পর্দা উৎপন্ন হয়, যাহার দক্ষণ সপর্দা ঘূড়ী কাশি (Membranous croup) এবং ডিপ্‌থেরিয়া (Diphtheria) রোগে ইহা দ্বারা বিশেষ উপকার দর্শিতে দেখা যায়। আভ্যন্তরিক প্ররোগে ইহা

ক্ষতকারক বিষের ভ্রায় কার্য্য করিয়া থাকে, বাহার লক্ষণ পাকস্থলীর প্রবল প্রদাহ হইয়া অত্যন্ত অবসন্নতা এবং চরম বা পতনাবস্থার (Collapse) লক্ষণাদিই প্রকাশ পায়।

সাধারণ প্রাকৃতিক লক্ষণ ।

মন । মানসিক পরিভ্রমের ইচ্ছা।

মস্তক । শিরঃশীড়া; সূর্য্যের উত্তাপে কপালে অত্যন্ত ভারি এবং চাপা বোধ, ছায়াতে বাহার উপশম হয়; দুধ খাইলে শিরঃশীড়া।

চক্ষু । ডাইন চক্ষু দিয়া জল পড়া এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে অশ্রু-নিঃসারক গ্রন্থি (Lachrymal Gland) ক্ষীতি; বাম চক্ষুর মধ্য দিয়া স্ফী-বিধানের ভ্রায় বাতনা অমুভূত হওয়া।

কর্ণ । বাম কর্ণমূলস্থ গ্রন্থির কঠিন ক্ষীতি বাহ্য স্পর্শনে উচ্চ বলিয়া অমুভূত হয়; বাম কর্ণমূলস্থ গ্রন্থি পাকিয়া উহাতে পূঁব হয়, উহার মুখ অত্যন্ত নিখল হয়, উহা হইতে জলের ভ্রায় ক্ষতকারক কলতানি পড়ে এবং উহাতে ক্ষীতি কঠিন থাকে ও কোন মতেই কমে না; আরক্ত অরের পর কর্ণমূলস্থিত গ্রন্থির ক্ষীতি।

নাসিকা । প্রবল সর্দি ও ডাইন নাসারন্ধ্র কঙ্ক হয়, উহাতে আপা গোড়া ক্ষত হয় ও তৎপর বাম নাসারন্ধ্র অক্রান্ত হয়; নাক দিয়া প্রচুর তরল স্লেমা নির্গমন এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে হাঁচি (একন, জেল্‌স্); অনেক দিন ধরিয়া অনিবার্য্য সর্দি; নাকের মধ্যে এবং নাসারন্ধ্রের ধারে ক্ষতের ভ্রায় জ্বালা এবং টাটানি (এইলাস্, এরাম্, সিপা); নাক ক্ষীত এবং উহাতে ক্ষত, টাটানি ও মরা চামড়ার ভ্রায় চুম্‌টী পড়া বাহ্য তুলিয়া কেহিলে রক্ত পড়ে এবং বেদনাযুক্ত হয় (নাইট্রিক্-অ্যাস্)।

মুখমণ্ডল । সুখার্কিত ধূসরের আভাযুক্ত মেটে রঙ্গ বিশিষ্ট; মুখ মণ্ডলে বেন মাকড়ের জাল লাগিয়া রহিয়াছে এক্রপ অমুভূত হয় (ব্যারাইটা-কার্ক, কার্বল্‌স্, গ্রান্‌)।

গলার মধ্য । গলার মধ্যে ঢাচিয়া কেলার ন্যায় অমুভূত হয়; মুগ্‌গহ্বরের পশ্চাৎ ভাগ এবং আহাৰবহা গলনালীর উপরিভাগের স্নৈমিক কিল্লীর ক্ষীতি।

উদর । উদর ক্ষীত ও বিস্তৃত এবং গুহ্বার দিয়া প্রচুর পরিমাণে দূষিত বায়ু নিঃসরণ (অলোজ্, আণিকা, চায়না) ।

মল এবং মলদ্বার । অর্শরোগ এবং উহার দরুণ গুহ্বারে অত্যন্ত বেদনায়ুক্ত বলী বাহির হওয়া, কিন্তু রক্ত পড়ে না (Blind Piles) এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে কাল মলত্যাগ ।

জননেন্দ্রিয় । জীলোকের বোনিদ্বার দিয়া সজোরে এবং উচ্চ শব্দ করিয়া দূষিত বায়ু নিঃসরণ (লাইকোপ্) ; নিয়মিত সময়ের অনেক পূর্বে এবং অতিরিক্ত পরিমাণে রজঃস্রাব (আস্, ক্যালক্-কার্ক্, নাক্স-বহ্) ; অত্যন্ত উজ্জল লাল বর্ণের রজঃস্রাব (বেল্, ইপিকাক্) ; রক্ত বেদ আন্তে আন্তে চূয়াইয়া পড়ে এবং তদ্রূপ অত্যন্ত নিস্তেজতা এবং বলহীন (কার্কো-আনিমেল্, চায়না), অথবা রজঃস্রাবের সময় রক্তের সঙ্গে পর্দার জায় ছেকড়া ছেকড়া পদার্থ নির্গমন (সাইক্রেমেন্) ; রজঃস্রাবের পূর্বে এবং রজঃস্রাবের সময় জরারূতে প্রবল সঙ্কোচক বেদনা, বাহ্য অনেক ঘণ্টা ব্যাপিয়া থাকে এবং যাহা সারিয়া গেলেও পেটে টাটানি থাকিয়া যায় ।

শ্বাস যন্ত্র । কণ্ঠনালী বা বায়ুনলের উপরিভাগে ঠাণ্ডা বোধ ; নিশ্বাস টানিবার সময় শীতবোধ ; কণ্ঠনালী বা বায়ুনলের উপরিভাগে আঁটাবোধ ; কণ্ঠনালী বা বায়ুনলীর পশ্চাদ্দেশে হৃদী বিধানের জায় অস্বভূত হয় এবং লাল বা চোক গিলিবার সময় উহাতে আঁটাবোধ ; কণ্ঠনালী বা বায়ুনলীর উপরিভাগে টাটিয়া কেলা বা ছাল উঠিয়া বাওয়ার জায় অস্বভূত হয়, যাহার দরুণ সঙ্কায় সময় কাশিএ উদ্রেক হয় (কার্কো-বেজ্) ; বায়ুনল বা উহার উপরিভাগে হৃৎ হৃদী, যাহার দরুণ কাশির উদ্রেক হয় ; বায়ুনলীতে সঙ্কোচন অথবা বায়ুনলের উপর বেদ গলার মধোর চাপ পড়ে এক্রণ অস্বভূত হয় ; অরভঙ্গ, যাহার দরুণ রোগী স্পষ্টরূপে কথা বলিতে পারে না ; অর শূভতা ; কাশি এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে গিলিবার সময় বেদ হঠাৎ শ্বাসরোধ হইয়া আইসে ; নিশ্বাস প্রবাস ঘন ঘন এবং নিশ্বাসের জন্ত ব্যাকুলতা ; সময়ে সময়ে সজোরে গভীর নিশ্বাস টানিবার প্রয়োজন হইয়া পড়ে ; শ্বাসকষ্ট ; গভীর নিশ্বাস টানিতে অশক্তি ; মনে হয় বেদ শ্বাসনলী

গুলি ধূম ধারা পত্রিপূর্ণ রহিয়াছে (ব্যারাইটা-কার্ক, নেট্রাম-বাস) ; ডাইন-ফুসুসই অধিক আক্রান্ত হইয়া থাকে ।

নিদ্রা । কান বস্তুর কঠে যন্ত্রণার সঙ্গে সঙ্গে অনবরত হাঁহিতোলা এবং নিদ্রাবল্য (আণ্টি-টার্ট) ।

চর্ম । গলার সম্মুখস্থিত থাইরয়েড্ গ্রন্থি (Thyroid Gland), অণ্ড-কোষ, হরাস্থির নিরস্থিত (Sub-maxillary Glands) ও কর্ণমূলস্থিত গ্রন্থির ক্ষীতি এবং কঠিনতা (ব্যারাইটা-কার্ক, ক্যাঙ্ক-কার্ক, কোনারাম, আরোড্, প্রাক্, নেট্রাম-কার্ক) ; বাহু এবং মুখ মণ্ডলে ত্রণ (সাইলিনিস) ।

ব্যবহার । বায়ুনল এবং কঠনালী বা বায়ুনলের উপরিভাগে প্রদাহ জনিত অশ্রু ; কঠনালী প্রদাহ (Laryngitis) ; ঘুংড়ীকাশি ; ডিপ-থিরিয়া ; বায়ুনলের প্লেথ্রা জনিত রোগ এবং ফুসুস প্রদাহ ; সপর্ক কঠকর-রক্তস্রাব (Membranous Dysmenorrhœa) ; গলগণ্ড (Goitre) ; অণ্ড-কোষ, কর্ণমূলস্থিত গ্রন্থি, হরাস্থির নিরস্থিত গ্রন্থির ক্ষীতি এবং কঠিনতা ইত্যাদি অশ্রুে ব্রোমিন ব্যবহার্য্য । ঘুড়ী কাশিতে স্পঞ্জিয়ার পর ইহা দ্বারা বিশেষ উপকার দর্শে ।

বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ । বেদনা যন্ত্রণাদি দূরীভূত হইয়া গেলে অত্যন্ত দুর্বলতা এবং অলসবোধ ; বাহু বরফের ভ্রার নীতল, অথবা কেবল সম্মুখ বাহু বা হাত নীতল । সন্ধ্যাকাল হইতে রাত্রি দুই প্রহর পর্যন্ত অশ্রুধের বৃদ্ধি ; বাম পার্শ্ব অধিক আক্রান্ত হয় ; নড়া চড়া, চলিয়া বেড়ান এবং ছোড়ার চাপিয়া বেড়াইলে অশ্রুধের উৎপন্ন ইত্যাদি ব্রোমিনের কতকগুলি বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ ।

সমগুণবিশিষ্ট ঔষধ । আরোডিন্, স্পঞ্জিয়া ।

প্রতিষেধক ঔষধ । বমন উৎপাদক ত্র্যবা বা ঔষধ । ব্রোমিনের ধূক শৌকিয়া বিমুক্ত হইলে আকোনিয়ার ধূম টানিলে বিশেষ উপকার দর্শে ।

ডাইলুশন বিচার । ১ম, ২য় এবং ৩য় শতভাগিক ডাইলুশনই সচরাচর অধিক ব্যবহৃত হইয়া থাকে । কোন কোন চিকিৎসক ইহা ১ম, ২য় এবং ৩য় দশমিক ডাইলুশনও ব্যবহার করিয়া থাকেন ।

কার্বো আনিমেলিস্,-কার্বো আনিমেল্

(CARBO ANIMALIS,—ANIMAL CHARCOAL,—CARB.-AN.)

গরুর চৰ্ম পোড়াইয়া উহা দ্বারা এই ঔষধ প্রস্তুত হয়। যথানিয়মে অগ্নির অব- মিকের সঙ্গে মিশাইয়া ৩য় শতভাগিক ক্রম পর্য্যন্ত ইহার শুঁড়া প্রস্তুত হয়। ৩য় শতভাগিক ক্রমের শুঁড়া হইতে যথানিয়মে ইহার ৪র্থ শতভাগিক ক্রমের আরোক প্রস্তুত হইয়া থাকে।

সাধারণ ক্রিয়া। গ্রন্থি এবং পরিপাক কার্য্য সম্বন্ধীয় যন্ত্রের উপ- র্যই ইহার কার্য্য সৰ্ব্বপ্রধান, বাহার দ্রবণ গ্রন্থি গুলি ক্ষীত, প্রদাহযুক্ত ও কঠিন হয়, উহাতে ক্ষত হইয়া থাকে এবং পরিপাক সম্বন্ধীয় যন্ত্র আক্রান্ত হইয়া অজীর্ণের লক্ষণাদি প্রকাশ পাইয়া থাকে। গ্রন্থি গুলির কঠিনতা উৎপাদন করিয়া তৎপর উহাকে কঠিন কর্কট রোগে (Scirrhus Cancer) পরিণত করা এই ঔষধের একটি বিশেষ প্রাকৃতিক গুণ বা শক্তি মধ্যে পরিগণিত।

সাধারণ প্রাকৃতিক লক্ষণ।

মন। একাকী থাকিবার ইচ্ছা (হারোস্, ইগ্নেনস্, রাস্টক্স্); সৰ্ব্বদা বিষমভাব এবং চিন্তাযুক্ত থাকা; কথোপকথনে অনিচ্ছা; রাত্ৰিতে চিন্তা বা মনের উবেগ, বাহার দ্রবণ মনে হয় যেন রক্ত গরম হইয়া ফুটিতেছে এবং বাহার দ্রবণ রোগী শয়নাবস্থা হইতে উঠিয়া বসিতে বাধ্য হয়।

সম্ভবক। প্রাতঃকালে মাথার গেলমেনে বোধ, বাহার দ্রবণ রোগী জাগরিত কি নিদ্রিতাবস্থায় আছে সে কিছুই স্থির করিতে পারে না; মাথা হেট করিয়া উপুড় হইয়া থাকার পর মাথা খাড়া করিলে মাথাবোঁরা এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে বমনোবেগ; রাত্ৰিতে মাথায ভারিবোধ এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে শ্রান্তিবোধ; মাথা হেট করিয়া উপুড় হইলে কপালে ভারিবোধ, বাহার দ্রবণ মনে হয় যেন চক্ষুর উপরিভাগে একটী ভারি দ্রব্য চাপিয়া রহিয়াছে; মাথার উপরিভাগে বেদনা, বাহার দ্রবণ মনে হয় যেন মাথার হাড় ভাঙিয়া থাও থাও হইয়াছে; মাথার ডাইন পার্শ্বে ছিঁড়িয়া ফেলার ভাব বেদনা।

চক্ষু। চক্ষুর সম্মুখে যেন একখানি জাল ঝুলান রহিয়াছে, একরূপ অস্বস্ত হইতে হয়।

কর্ণ । কানে গোলমেলে গুনা; রোগী বৃত্তিতে পারে না শব্দ কোন দিক হইতে আসিতেছে ।

নাসিকা । প্রাতঃকালে নাক দিয়া রক্ত পড়া (ব্লাই, ক্যাক্-কার্ক) এবং রক্তস্রাবের পূর্বে মাথাগোরা ও মাথার গোলমেলে বোধ; সর্দি এবং তন্দ্ররূপ গলার মধ্যে চাঁচিয়া ফেলার স্রাব অম্লভূত হয়, সন্ধার সময়, স্নাত্তিতে এবং গিলিবার সময় বাহার বৃদ্ধি হয়; নাকের আগা লালবর্ণ এবং স্পর্শনে বেদনায়ুক্ত হয়; নাকের চর্মে বাটাবোধ এবং উহা কাটিয়া যাওয়া; নাকের মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ত্রণ; নাকের আগায় কঠিন, নীলের আভাযুক্ত ক্ষীতি বা আব (Tumour) ।

মুখমণ্ডল । মুখাকৃতি রূক্ষ, মাটির রঙ্গের স্রাব; মুখ মণ্ডলের বিশর্প এবং মুখমণ্ডলে তামার রঙ্গের ফুসুড়ী; যুবা, গণ্ডমালা ধাতু বিশিষ্ট লোকের মুখমণ্ডলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ত্রণ; ওঠে ফোকা বা কাটা ।

মুখগহ্বরে এবং গলার মধ্যে । জিহ্বার আগায় জালাহুত্ব এবং মুখগহ্বরে ছাল উঠিয়া যাওয়ার স্রাব অম্লভূত হয় (ক্যাক্-কার্ক, কলোস্); দাঁত নড়ে এবং কোন দ্রব্য চিখাইবার সময় দাঁতে অত্যন্ত বেদনা (মার্ক্, নাইট্রিক্-অ্যাস্); প্রত্যহ প্রাতঃকালে মুখে তিক্তবাদ (নাক্স-বন্, ক্যাক্-কন্, পাল্‌স্); হৃৎকের মধ্যে জালাযুক্ত ফোকা । গলার মধ্যে স্লেয়ার সন্ধার; বারবার থক্ থক্ করিয়া কালিয়া স্লেয়া তোলা; গলার মধ্যে জালা (অ্যাস্, ক্যাক্, ক্যাপ্); গলার মধ্যে ছাল উঠিয়া যাওয়ার স্রাব অম্লভূত হয়, বাহা পাকস্থলী পর্যন্ত বিস্তৃত হয় এবং গিলিবার সময় বাহার বৃদ্ধি হয় না; বুক জালায় ঘেরূপ হয়, গলার মধ্যে সেরূপ জালাহুত্ব, আহারের পর বাহার উপশম হয় ।

পাকস্থলী এবং উদর । অনেককণ পূর্বে বাহা যাওয়া গিয়াছে তাহার স্থান বিশিষ্ট উদগার উঠা (অ্যাক্টিক্-কুড্, পাল্‌স্); বুকজালা (ক্যাক্-কন্); বাস খাওয়ার অনেককণ পর পর্যন্তও বমনোবেগ (কার্কো-বেজ্) । উদর অত্যন্ত ক্ষীত এবং বিদূত; উদরে প্রচুর দ্বিভ বায়ুর সন্ধার (জালাজ্, কার্কো-বেজ্, চায়না, লাইকোপ্); মিড্‌ডাইলে ঘেরূপ হয়, তলপেটের ডাইন পার্শ্বে সেরূপ বাতনা; শুষ্ক ঘারের ঠিক উপরিভাগের

মধ্য ও বোনিয়ার দিয়া গুহবার পর্যন্ত ছিঁড়িয়া ফেলার ভায় বেদনা ; কঠিন আকারের বাগীতে পুঁথ হয়, অথবা কুচিকিংসার উহাতে ক্ষত হইয়া উহার ধার কাগচে হয় এবং উহা হইতে ছানার জলের ভায় ছেক্কা ছেক্কা পদ্ধির ভায় দুর্গন্ধযুক্ত পদার্থ এবং পুঁথ নির্গত হয় ।

মল এবং মলদ্বার । গুহ এবং গুহদ্বারে আলাসুতব (আস্, ক্যাক্স, ক্যাপ্স) ; গুহদ্বার দিয়া তরল আঁটাল পদার্থ চূরাইয়া পড়া (সাই-লিসি) ; গুহদ্বারে অর্শের অত্যন্ত ক্ষীত বলী, চলিবার সময় বাহাতে অত্যন্ত আলায় উদ্রেক হয় ; মল পরিমাণে অল্প এবং গোণে নির্গত হয় ; মল জ্যাপের সময় রক্ত পড়ে ।

মূত্রযন্ত্র । প্রস্রাব কর্তার সময় মূত্রনালীতে আলা এবং টাটানি (ক্যানারিস্-স্যাট) ; রাত্রিতে বারবার প্রস্রাব করা ।

জননেন্দ্রিয় । পুরুষের ধাতু নিঃসরণ ; পুরুষাঙ্গে দুর্লববোধ ; শারীরিক এবং মানসিক দুর্লভতা ; পরমীর বা এবং বাগী (Syphilis and Buboes) । জীলোকের নিয়মিত সময়ের অনেক পূর্বে এবং প্রচুর রক্ত-প্রাব (আমন্-কার্, আস্, বোয়াল্, ক্যাক্স-কার্, নাল্-বন্) ; রক্ত-প্রাবের সময় রোগী এত দুর্লভ হইয়া পড়ে যে উহার দরণ সে কথা বলিতেও অত্যন্ত কষ্ট অনুভব করে (আলাস্, ককিউলাস্) ; শ্বেতপ্রদর, বাহা বিছানার কাপড়ে লাগিয়া হরিদ্রাবর্ণ হয় (ক্রিয়াজ্) ; জরারুর জীবার কঠিনতা এবং উহাতে ক্ষত (কোনারাম্) এবং উহাতে আলাসুতব (আস্) ; জরাদ্বারে আলা আরম্ভ হইয়া উক্ত পর্যন্ত বিস্তৃত হয় ; বস্ত্রিকোটর এবং গুহদ্বারের ঠিক উপরিভাগে প্রস্রাব বেদনার ভায় বেদনা ; বোনিয়ার দিয়া চট্‌চটিয়া আঁঠা রক্ত মিশ্রিত ক্রেন নিঃসরণ, বাহার দরণ রোগী অত্যন্ত দুর্লভ হইয়া পড়ে ; জরারুর কর্কট রোগ (Uterine Cancer) ; যে সকল জীলোক আপন সন্তানগণকে স্তন দুগ্ধ পান করার তাহারিগের স্তনে ছুরি বিধানের ভায় বেদনা, চাপিলে বাহার বৃদ্ধি হয় ; স্তনের স্থানে স্থানে কঠিন এবং বেদনাত্মক হয় ; সন্তান প্রসবের পর একমাস কাল স্তন বিসর্পের ভায় ক্ষীভ এবং প্রদাহযুক্ত থাকে (Erysipolatus Inflammation) ; স্তনে কোড়া বা আবেয় ভায় কঠিন ক্ষীতি এবং স্তনের চর্ম অসম ও চল্‌চলে ; স্তনে

জালাযুক্ত বেদনা; শুনে মলিন নীলের আভাযুক্ত দাগ পড়ে; শুনে বেদনা, যাহার দক্ষণ বোগলের দিকে কসিয়া ধরার স্থায় অল্পভূত হয়; রাত্রিতে বর্ষা; মানসিক অবসন্নতা বা বিমর্ষতাব; শুনের ক্রিয়াস্ কর্কট রোগ (Scirrhus Cancer of the breast)।

শ্বাসযন্ত্র। প্রাতঃকালে ঘুম হইতে উঠিলে গলার মধ্য এবং শ্বাসযন্ত্রে ছাল উঠিয়া যাওয়ার স্থায় অল্পভূত হয় ও স্বরভঙ্গ (কষ্ট, কফিয়া, কন্স); স্বরভঙ্গ, সন্ধ্যার সময় বাহার বৃদ্ধি হয় (কার্ফো-বেজ); খুণ্খুশে কাশি এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে কণ্ঠনালী বা বায়ুনলের উপরিভাগ ও বৃকে আঁটাবোধ; অত্যন্ত প্রবল শুষ্ক কাশি, যাহার দক্ষণ উদর এরূপ আলোড়িত হয় যে উহার দক্ষণ মনে হয় যেন উদর খন্দিয়া পড়িবে এবং বাহার দক্ষণ রোগী অল্প চাপিয়া ধরিয়া রাখিতে বাধ্য হয়; যে পর্য্যন্ত শ্বাসাদি নির্গত না হয়, সে পর্য্যন্ত বৃকের মধ্যে সাঁই সাঁই শব্দ হয়; প্রাতঃকালে ঘুম হইতে উঠিলে এবং প্রায় সমুদয় দিনই উক্ত লক্ষণাদি বর্তমান থাকে; বৃকে জালাভূত এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে বৃকে চাপিয়া ধরার স্থায় বেদনা।

গ্রীবা এবং পৃষ্ঠদেশ। গ্রীবার গ্রন্থি কঠিন, ক্ষীত এবং বেদনাযুক্ত (বোরাক্স, ক্যাক্-কার্ক); ভাজিলে ঘেরূপ হয়, কোমরের পশ্চাৎ ভাগে সেরূপ চাপিয়া ধরা, বা কসিয়া ধরার স্থায় বেদনা এবং তদক্ষণ কোমর সঞ্চালনে অশক্তি; কোমরের পশ্চাৎভাগ দিয়া আড়াআড়ি কসিয়া ধরার স্থায় অত্যন্ত প্রবল বেদনা যাহা প্রত্যেকবার পা বাড়াইবার সময়ই অল্পভূত হয়; শুষ্ক ঘারের ঠিক উপরিভাগে মোচড়াইয়া পড়া বা খেঁতলিয়া যাওয়ার স্থায় বেদনা, স্পর্শ করিলে যাহাতে জ্বালার উদ্রেক হয়।

অঙ্গ প্রত্যঙ্গ। খেঁতলিয়া গেলে বা মোচড়াইয়া পড়িলে ঘেরূপ হয়, মনিবন্ধে সেরূপ বেদনা; প্রতিদিনই হাত অসাড় হয়। বাসিয়া থাকিলে বাস কুঁচকিতে হৃদয়বিধানের স্থায় বাতনা; পায়ের স্থানে স্থানে কড়া (Corns) পড়ে; দিনের বেলা পায়ের ডিম পর্য্যন্ত অসাড় হয়; পায়ের নিম্ন ভাগে টিবিয়া (Tibia) নামক হাড়ের নিকটবর্তী অংশে খিল ধরা; চলিবার সময় পায়ের ডিমে কসিয়া ধরার স্থায় অত্যন্ত কষ্টভূতব।

চর্ম্ম। মুখমণ্ডলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্ৰণ এবং গালে লাল দাগ পড়া; শরী-

য়ের স্থানে স্থানে বিসর্পের ছায় (Erysipelatous) ক্ষীতি এবং উহাকে আলায়ুক্ত বেদনা (আস্) ।

নিদ্রা । পূর্বাঙ্কে নিদ্রাবেশ এবং হাঁহিতোলা ; ঘুমেরঘোরে নানা প্রকারের কাল্পনিক বিষয়ে স্বপ্ন দেখা ।

ব্যবহার । গ্রন্থির বিবৃদ্ধি, কঠিনতা এবং ক্ষত ; কিরাস্ ককটরোগ (Scirrhus Cancer) ; বিসর্প (Erysipelas) ; অজীর্ণ ; বায়ুনল প্রদাহ ; দন্তশূল ইত্যাদি অস্থখে ক্যুর্বেঁ আনিমেলিস্ ব্যবহার্য্য ।

বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ । দুর্বলতা এবং ক্ষুধার অভাব ; মাথায় গোলমালে বোধ ; বলক্ষয় ; রাত্রিতে অত্যন্ত দুর্গন্ধযুক্ত দুর্বলকারক ঘর্ম্ম (সাইলিসি) বাহ্য লাগিয়া বিছানার কাপড় বা গায়ের কাপড়ে হরিদ্রা-বর্ণের দাগ পড়ে ; গণ্ডমালা ধাতু ; প্রাতঃকাল এবং সন্ধ্যাব সময়, ঠাণ্ডা লাগিলে, বহির্বায়ুতে অস্থখের বৃদ্ধি ইত্যাদি কার্বেঁ আনিমেলিসের কতকগুলি বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ । ডাক্তার গারোসি (Dr. Guereux) বলেন যে, রজঃস্রাবের সময় এবং উহার পর অলসবোধ এবং গা মাটি মাটি করা এই ঔষধের একটা বিশেষ প্রাকৃতিক নির্দিষ্ট লক্ষণ মধ্যো পরিগণিত ।

সমুগ্ধ বিশিষ্ট ঔষধ । গ্রন্থির উপর কার্বেঁ আনিমেলিসের কার্য্য অনেকটা কোনায়াস্ এবং হাইড্রাষ্টিসের ছায় । এতদ্ভিন্ন অস্ত্রান্ত বিষয়ে ইহার কার্য্যের সঙ্গে আর্সিনিক, ক্যাকেরিয়া কার্বেঁনিকা, কার্বেঁ বেজিটেবিলিস্ এবং নাক্স-বমিকার কার্য্যের সাদৃশ্য আছে ।

প্রতিষেধক ঔষধ । আর্সিনিক, ক্যাকার, নাক্স-বমিক, সূরা ।

ডাইলুশন বিচার । ডাক্তার ড্রুরি (Dr. Drury) মতে স্ত্রীলোকের সন্তান প্রসবের পর দুর্গন্ধযুক্ত ক্লেদ (Fetid Lochia) নিঃসরণে, ১২ হইতে ৩০ ডাইলুশন বিশেষ উপকারী । রাত্রিতে দুর্গন্ধযুক্ত ঘর্ম্মের পক্ষেও ডাক্তার আলেনের (Dr. Allen) মতে উক্ত দুই ডাইলুশন বিশেষ উপকারী । ১২ হইতে ৩০ ক্রমই সচরাচর অধিক ব্যবহৃত হইয়া থাকে ।

গ্লোনয়েন্,—গ্লোন (GLONOINE,—GLON.)

কোন এক বিশুদ্ধ হোমিওপ্যাথিক ঔষধালয় হইতে আদত গ্লোনয়েন্ ক্রয় করিয়া উহার ১ ভাগ, ২ ভাগ আব্দোলিউট্ অল্কোহলে (Absolute Alcohol) মিশাইয়া ১ম দশমিক ক্রয়ের আরোক প্রস্তুত হইয়া থাকে। এরূপ ২য়, ৩য় এবং ততোধিক ডাইলুশনও আব্দোলিউট্ অল্কোহলে প্রস্তুত হইয়া থাকে।

সাধারণ ক্রিয়া । মেডুলা অবলংগেটা (Medulla Oblongata), নিউমোগ্যাস্ট্রিক নার্ভ (Pneumogastric nerve) এবং রক্তবহানালীর কার্যের শাসনকারী নার্ভের (Vasomotor nerves) উপর ইহার কার্য অতি প্রবল, বাহার দরুণ মস্তিকে প্রবল রক্তাধিক্য এবং স্থম্পন্দন হয়। অনেক সময় সূর্য্যাস্রোতে (Sunstroke) যে প্রকার হয়, সূর্য্যের উত্তাপ লাগিয়া মস্তিক আক্রান্ত হওয়ার সেরূপ লক্ষণগুলি প্রকাশ পাইয়া থাকে, অথচ জ্বর এবং প্রদাহ ইত্যাদি যে প্রকার লক্ষণ বেলাডোনা এবং একোনাইট দ্বারা বিঘাঙ্ক হইলে প্রকাশ পায়, সেরূপ লক্ষণাদি প্রকাশ পায় না। মস্তিকে পূর্ববোধ এবং উহাতে দন্দপানি উৎপাদন করা এই ঔষধের একটা বিশেষ প্রাকৃতিক শক্তি বা গুণ মধ্যে পরিগণিত।

সাধারণ প্রাকৃতিক লক্ষণ ।

মন । পড়িয়া যাইয়া অচেতন হওয়া এবং পর্যায়ক্রমে স্থম্পন্দন ও মস্তিকে রক্তাধিক্য বা রক্তাবরোধ ; মনে এলো মেলো ভাব (ব্যাণ্ট্, জেল্, কস-থাস্) ; রোগী বলিতে পারে না সে কোথায় ছিল ; জানা পথ বা সজ্ঞকাধিও অজানা বলিয়া অনুভূত হয় ; বাড়ীতে বাওয়ার রাস্তা অত্যন্ত লম্বা বলিয়া অনুভূত হয় ; সড়কের কোন পার্শ্বে বাস করে রোগী যেন তাহা ভুলিয়া যায় ।

মস্তক । মাথাঘোরা, মাথা হেট করিয়া উপুড় হইলে বা মাথা নাড়িলে বাহার বৃদ্ধি হয় (ব্রাউ) ; বহির্বাগ্নিতে মাথাঘোরার বৃদ্ধি ; মাথা অত্যন্ত বড় বলিয়া অনুভূত হয় (অার্জেণ্ট্-নাইট্রিক্, বোবিষ্টা, সিমিসিক্-

জিজিবার) ; মাথার পূর্ববোধ ; মাথার মধ্যে স্পষ্ট দণ্ডপানি (বেল) ; মাথার দণ্ডপানি, কিন্তু বেদনা থাকে না ; মাথার বেন রক্ত উঠিতেছে একরূপ অম্লভূত হয় (বেল) ; নাক, চক্ষুর উপরিভাগ এবং কানের পশ্চাৎ-ভাগে কসিয়া ধরার জ্বায় বেদনা ও তৎপর গলার মধ্যে আঁটিয়া ধরার জ্বায় অম্লভূত হয় ; মাথার হাড় যেন স্বাভাবিক অপেক্ষা ছোট এবং মস্তিষ্ক যেন মাথার হাড় ভাঙ্গিয়া বাহির হইতে চাহে একরূপ অম্লভূত হয় (সিমি-সিফ) ; হৃৎপিণ্ডের অত্যন্ত প্লবল দণ্ডপানি এবং সমুদয় শরীরের লাকানি (দণ্ডপানি) স্পষ্ট অম্লভূত হয় ; সমুদয় মাথার টাটানি ; রোগী মাথা ঝাকিতে ভয় খায়, কারণ সে মনে করে মাথা ঝাকিলে তাহার মাথা খণ্ড খণ্ড হইয়া পড়িবে ; মাথার দণ্ডপানি ; কপালে দণ্ডপানি ; কপালের পার্শ্বে দণ্ডপানি ; মাথার উপরিভাগে দণ্ডপানি ; মাথার পশ্চাৎভাগে দণ্ডপানি, নড়া চড়াতে যাহার বৃদ্ধি হয় (ব্রাই) এবং স্থিরভাবে বসিয়া থাকিলে, শরন করিয়া থাকিলে এবং চাপিয়া ধরিলে যাহার উপশম হয় (বেল) ; মস্তিষ্কের মধ্যে যেন কেহ কেহ শব্দ হয়, রোগী একরূপ অম্লভব করে ; নাড়ীর প্রত্যেকবার স্পন্দনের সঙ্গে সঙ্গেই যেন মাথার ধাক্কা লাগে ; মাথার বা মস্তিষ্কে চেউ খেলার জ্বায় আন্দোলন বা আলোড়ন (চায়না) ; কপালের দুই পার্শ্বস্থিত ধমনির দণ্ডপানি এবং স্ফীতি ও উহাতে হাত বুলাইলে উহা তার বা স্ততার জ্বায় অম্লভূত হয় (বেল) ; মাথার পশ্চাৎ-ভাগে প্রথম বেদনা বাহা চক্ষু এবং কপালের দুই পার্শ্ব পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয় ; জ্বীলোকের রক্তঃস্রাবের সময় মাথাধরা এবং মাথার দণ্ডপ-করা, অথবা রক্তঃস্রাবের পরিসবর্ত্তে মাথা ধরা এবং মাথা দণ্ডপ-করা (চায়না) ; মাথা ঝাকিলে মাথা ধরায় বৃদ্ধি ; নড়াচড়াতে মাথাধরায় বৃদ্ধি (ব্রাই) ; সূর্য্যের উত্তাপে মাথা ধরায় বৃদ্ধি (বেল, নেট্রাম্-কার্ক) ; বহির্বাায়ুতে এবং চাপিয়া ধরিলে মাথা ধরায় উপশম ।

চক্ষু । চক্ষুর সম্মুখে আগুণের শিখা এবং কণার জ্বায় দেখিতে পাওয়া যায় (বেল, সাইক্লোয়েন্) ; নাড়ীর প্রত্যেক বার স্পন্দনের সঙ্গে সঙ্গে যেন চক্ষুস্পর্শস্থ বস্তুগুলি নাচে ; চক্ষু চাপিয়া ধরার জ্বায় বেদনা, যাহার দ্বকণ বনে হয় যেন চক্ষু উহার কোটর হইতে বাহির হইয়া পড়িবে ; চক্ষু

লালবর্ণ, কোটিরের বহির্দিকে বহির্গত এবং পাগলের ভ্রার ভাববিশিষ্ট (বেল্, হায়োস) ; চক্ষুর ভ্রার বিস্তৃত এবং উপরের দিকে উল্টান বা ঘুরান (বেল্) ।

কর্ণ । বধিরতা, মনে হয় যেম কান বন্ধ হইয়া রহিয়াছে (কোনা-রাম) ; কানে টন্ টন্ শব্দ হয় এবং হৃৎপিণ্ড ও নাড়ীর স্পন্দন শব্দ যেন কানে শুনা যায় ।

মুখমণ্ডল । গরবের সময়, সূর্য্যাস্ত (Sunstroke) এবং মস্তিকে রক্তাবরোধের সময় মুখমণ্ডল শিটা ; মুখমণ্ডল আরক্ত, টল্টলে এবং উচ্চ ও উহার সঙ্গে সঙ্গে মাথাধরা ; মুখমণ্ডল লালবর্ণ যাহা বারম্বার হয় এবং বারম্বার যায় ।

মুখগহ্বর এবং গলার মধ্য । সমুদয় দাঁতেই দগ্ধপিপা বেদনা । গলার মধ্য এবং কোমল তালুকার চুলকানি ; গলার মধ্য ক্ষীত হইতেছে এরূপ অনুভূত হয় ।

পাকস্থলী । মস্তিকে রক্তাধিকা, রক্তাবরোধ এবং সূর্য্যাস্তের (Sunstroke) আক্রমণ কালীন বমনোদ্বেষ বা বমন ; পাকস্থলীতে অবদল-বোধ এবং উহাতে দগ্ধপানি ।

জ্ঞানেন্দ্রিয় । দ্রীলোকের রক্তঃস্রাব না হইয়া উহার পরিবর্তে মস্তিকে রক্তাধিকা বা রক্তাবরোধ ; মুখমণ্ডল শিটা বা ফিকা ; উচ্চ বরে অনুভবের বৃদ্ধি ; মুছা এবং মাথার দগ্ধপানি ; শেষ রক্তঃরোধ হওয়ার সময়, মাথার দমকা উচ্ছ্বাস্তব, চাপাবোধ, বমনোদ্বেষ, জ্ঞান রহিত হওয়া, মাথাধরা এবং পায়ের পাতার ক্ষীতি ; মুখমণ্ডলের পেশীর মৃগীরোগের স্তায় আক্কেপ ; অচেতনতা ; মুখমণ্ডল উচ্ছল লালবর্ণ, ক্ষীত এবং টল্টলে ; নাড়ী পূর্ণ এবং কঠিন, মূত্র পরিমাণে অধিক এবং আল্‌বুমেন্ (Albumen) বিশিষ্ট ।

শ্বাসযন্ত্র । দীর্ঘনিশ্বাস গ্রহণের অত্যন্ত ইচ্ছা ; বৃক্ অঁটা এবং কষ্টানুভব ।

হৃৎপিণ্ড এবং নাড়ী । হৃৎপিণ্ডের প্রবল দগ্ধপানি এবং সমুদয় শরীরের স্পষ্ট দগ্ধপানি বা স্পন্দন ; হৃৎপিণ্ডের স্পষ্ট প্রবল স্পন্দন (স্পাইকল) ; নাড়ী অত্যন্ত ক্রতগামী এবং পর্য্যায়ক্রমে উঠে এবং পড়ে ;

স্বর্ঘ্যাঘাতে নাড়ী অত্যন্ত দুর্বল এবং মৃদু ; হৃৎপিণ্ডের কঠকর স্পন্দন এবং তদ্রূপ হৃৎপ্রদেশে অত্যন্ত কষ্টানুভব ; হৃৎপ্রদেশে অত্যন্ত প্রখর বেদনা ; শয়নাবস্থায় হৃৎপ্রদেশে বিড়ালের গণার শব্দের তায় ঘড়্, ঘড়্ শব্দ হওয়া এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে নাড়ী অসম (Intermittent) হওয়া ।

গ্রীবা । গ্রীবার চতুর্দিকে আঁটাবোধ ; গ্রীবা হইতে পৃষ্ঠদেশ পর্য্যন্ত উষ্ণানুভব ; সমুদয় মেরুদণ্ডে বেদনা ।

হৃদয় । সমুদয় শরীর উষ্ণ ; গায় দমকা উষ্ণানুভব ; উষ্ণতা যেন শরীরের নিম্নদিক হইতে উর্দ্ধদিকে চেউয়ের তায় উঠে বা বিস্তৃত হয় ; প্রচুর ঘর্ম্ম বাহ্য মুখমণ্ডল এবং বুকেই অধিক প্রকাশ পায় ।

ব্যবহার । স্বর্ঘ্যের উত্তাপ গায় লাগা জনিত অসুখ (বেল্, নেট্রাম্-কার্ক্) ; মানসিক উত্তেজনা, ভয় ইত্যাদি জনিত অসুখ ; কোন প্রকারের আঘাত প্রাপ্ত হওয়া জনিত অসুখ ; স্বর্ঘ্যাঘাত ; মৃতবৎ মূর্ছা ; মস্তিষ্কে রক্তাধিক্য ; মাথাধরা ; মস্তিষ্কের শোথ ; হৃগীর তায় আক্ষেপ ; জ্বীলোকের রক্তঃস্রাব রুদ্ধ হওয়ার দরুণ মাথাধরা ইত্যাদি অসুখে গ্লোনয়েন্ ব্যবহার্য্য ।

বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ । অত্যন্ত দুর্বলতা এবং বলক্ষয় (আস্, ব্রাই, চারনা, কস) ; সমুদয় শরীরে বেদনাহীন দগ্ধদপানি (আণ্টি-ক্রুড্, পাল্‌স্, সাইলিসি, সিপিয়া, জিঙ্ক্) ; সামান্য কারণেই রক্ত সঞ্চালন ক্রিয়ার বৈলক্ষণ্য ; নড়া চড়া, মদ্যপান, অক্রান্ত অঙ্গ নাড়িলে, ঝাকিলে বা উহাতে হাত বুলাইলে অসুখের বৃদ্ধি ও রাত্রিতে এবং বহির্কীরূতে অসুখের উপশম ইত্যাদি গ্লোনয়েন্‌র কতকগুলি বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ মধ্যে পরিগণিত ।

সমগুণ বিশিষ্ট ঔষধ । মস্তিষ্কের উপর গ্লোনয়েন্‌র কার্য্য অনেকটা আমিল্‌ নাইটেট্‌ এবং হামামেলিসের তায় । এতদ্ভিন্ন ইহার কার্য্যের সঙ্গে একোনাইট্‌, বেলাডোনা, ব্রোমিন্‌, ব্রাইওনিয়া, ককিয়া, নেট্রাম্-কার্ক্‌, নাজ্‌-বমিকা এবং ট্রায়োনিয়ামের কার্য্যেরও সাদৃশ্য আছে ।

প্রতিষেধক ঔষধ । একোনাইট্‌, ক্যান্‌ফার, ককিয়া, নাজ্‌-বমিকা ।

ডাইনুশন বিচার । ৩,৬ এবং ১২ দশমিক ক্রমই সচরাচর ব্যবহৃত হইয়া থাকে । ডাক্তার হিউজ্‌ (Dr. Hughes) বলেন যে, এই ঔষধের ১ম

এবং ২য় দশমিক ডাইলুশনও ব্যবহার করা যাইতে পারে বটে, কিন্তু উহা দ্বারা রোগের লক্ষণাদির বৃদ্ধি হওয়ার আশঙ্কা থাকে ।

হেলিবোরাস্ নাইজার,—হেলিবোর

(HELLEBORUS NIGER,—HELLEBORR)

ইউরোপের মধ্য প্রদেশের নিম্ন পর্বতাদিতে এই গাছ জন্মে । বাগানাদিতেও ইহার চাষ হইয়া থাকে । ইহার কাঁচা টাটকা মূল বা শিকড় যথা নিয়মে প্রকৃষ্টিতে তিজাইরা ইহার মূল আরোক প্রস্তুত হয় ।

সাধারণ ক্রিয়া । মূত্রকোষ এবং স্নায়ক ঝিল্লীর (Serous membranes) উপর ইহার কার্য অতি প্রবল, যাহার দরুণ মস্তিষ্ক, বক্ষ, অস্ত্রবেষ্ট ঝিল্লী এবং কৌষিক ঝিল্লীতে শোথের স্তায় দূষিত জলীয় পদার্থের সঞ্চার হয় । পরিপাক কার্য সম্বন্ধীয় যন্ত্রাদি প্রবলরূপে আক্রান্ত হইয়া উহা প্রদাহযুক্ত হইতে পারে । পাকস্থলী এবং অরুই এই প্রকার প্রদাহ দ্বারা অধিক আক্রান্ত হইয়া থাকে । নিউমোগ্যাস্ট্রিক ন্নারু (Pneumogastric nerve) আক্রান্ত হওয়ার দরুণ নিশ্বাস প্রশ্বাসের ব্যাঘাত জন্মে এবং হৃৎপিণ্ডের পক্ষাঘাত উৎপন্ন হয় । মস্তিষ্ক ও কসেরিকা মজ্জার উপর কার্যাবশতঃ মস্তিষ্কের এবং সার্কালিক পক্ষাঘাত হইতে পারে । মস্তিষ্কের শোথে যখন মস্তিষ্কে সিরাম (Serum) নামক কেণবৎ পদার্থের সঞ্চার আরম্ভ হয়, তখন এই ঔষধ দ্বারা বিশেষ উপকার দর্শে ।

সাধারণ প্রাকৃতিক লক্ষণ ।

মন । নিম্নরূপ ভাবে বোকার স্তায় অবসর হইয়া থাকা; স্পর্শ জ্ঞান রহিততা (ওপিয়াম); অত্যন্ত চিন্তা এবং মনের উবেগ; স্তম্ভবায়ু (Melancholia) এবং তদরুপ সর্বদা নিম্নরূপ ভাবে থাকা (ইগ্নেন্স); সর্বদা বাড়ীতে থাকার ইচ্ছা (ক্যাপ্স); কোন কার্য করিতে হইলে অনেককণ পূর্ব হইতে বিশেষরূপ চিন্তা না করিয়া রোগী কার্যে প্রবৃত্ত হইতে পারে না অথবা পেশীগুলি আপন কার্য করে না ।

মস্তক । মাথার ডিম্বা ও তারি বোধ ; মাথার গভীরতম অংশে উচ্চাভব ; মোহুকাইয়া পড়িলে বা খেঁতলিয়া গেলে যে রূপ হয়, মাথার সেরূপ টাটানি (কুপ্রমি), বিশেষতঃ মাথার পশ্চাৎভাগে এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে অত্যন্ত অবসন্নতা, মাথা হেট করিয়া উপড় হইলে বাহার বৃদ্ধি হয় ; মাথার পশ্চাৎভাগে বেদনা ; অবসন্নতা ; মাথার উচ্চ এবং তারিবোধ (ওপি-য়াম) ; বালিশের মধ্যে মাথা খুসিয়া দেওয়া (এপিস) ; দিবা রাত্রি মাথা চালা বা ঘুরাণ এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে কৌখানি বা কৌকানি ; শরীর ঠাণ্ডা ; মস্তিষ্কের শোধ ; আরক্ত জরের পর মস্তিষ্কের শোধ ।

চক্ষু । চক্ষে প্রদাহ থাকি সত্ত্বেও চক্ষে আলোক লাগে বা আলোক সহ হয় না ; চক্ষুর তারা বিস্তৃত (এইলাস্, বেল, হায়োস্, ট্রামন্) ; চক্ষে আলোকজ্ঞান থাকে না (সিকুটা, ওপিয়াম্, হায়োস্) ; চক্ষুর গোলক উপরের দিকে উঠান ; টেরাচক্ষু ।

কর্ণ । কানের মধ্যে সোঁ সোঁ, টন্ টন্ শব্দ হওয়া ।

মুখমণ্ডল । মুখমণ্ডল শিটা বা ফিকা, শোপের জ্বার ফীত, উন্-টলে ও বিকৃত ।

নাসিকা । ঘুম থাকিলে বা ঘুমের দকণ বুল পড়িলে যে রূপ হয়, নাগারক্ সেরূপ শুষ্ক এবং মরলাযুক্ত বলিয়া অনুভূত হয় ; বোঙ্গী বায়বার নাক রগড়ার ।

মুখগহ্বর । জিহ্বা অত্যন্ত শুষ্ক, অবশ বা অসাড় এবং ফীত ; মুখে ঘা (বোরাজ্, মার্ক্, হিপ্-সাল্ফ্) ; নিম্ন মাড়ি নিম্নদিকে ঝুলিয়া পড়ে (মিউর-আস্) ; সর্কদা চর্কণ করার জ্বার মাড়ির সঞ্চালন ; সর্কদা দাঁতে দাঁতে কামড়ান (সিকুটা) ; মুখগহ্বর এবং তালুকা শুষ্ক ও উহার সঙ্গে সঙ্গে গিলিবার অল্প মুখ সঞ্চালনের সময় তালুকার চাঁচিয়া ফেলার জ্বার বা কর্তনবৎ বেদনা বা বাতনা ।

পাকস্থলী এবং উদর । বমনোদ্বেগ এবং বমন (আর্কি-টার্ট্, ইপিকাক্) ; উদরস্থ আহার দ্রব্যাদি বমন ; সবুজের আভাযুক্ত কালচে পদার্থ বমন ; পাকস্থলীর মধ্যে পূর্ণাবাধ এবং উহার ফীতি ও বিস্তৃতি ; বোঙ্গী অত্যন্ত ব্যগ্রতার সহিত শীতল জল পান করে, চামচা কামড়ার,

কিন্তু সে অচেতনাবস্থায় থাকে । উদরের অত্যন্ত ক্ষীতি এবং বিস্তৃতি (ক্যাম) ; অল্প জলে পরিপূর্ণ থাকিলে ঘেৰুপ হয়, উদরে সেৰুপ গড়্ গড়্, কল কল শব্দ হয় (ক্রোটিম) ; পেট কামড়ানি বা পেটে চিন্‌চিনে বেদনা (বেল্, কলোস) ; অত্যন্ত দুৰ্বলতা, মুখাকৃতি বদিয়া যায়, মুখমণ্ডল শিটা, ঠাণ্ডা এবং চট্‌চটিয়া আঠা বর্ষ দ্বারা আবৃত ও নাড়ী সূত্রবৎ হ্রস্ব ।

মল । কেবল পরিষ্কার চট্‌চটিয়া আঠা বর্ষহীন প্লেয়া ভেৰ (কল্‌চ্, রাষ্টল), মল সাদা চট্‌চটিয়া আঠা ; বারম্বার কষ্টদায়ক বাহ্যের বেগ এবং কোথপাড়া ।

মূত্রযন্ত্র । বারম্বার প্রস্রাবের বেগ এবং অতি অল্পপরিমাণে মূত্র ত্যাগ (একন্, এপিস্, ক্যাম্, কলোস্, ডিজিট্) ; মূত্র পরিমাণে অল্প এবং কাল্‌চে (কল্‌চ), শুঁড়ান ফাকির জায়, পরিমাণে অধিক ; মূত্রাধার অত্যন্ত ক্ষীত এবং বিস্তৃত হয় ; মূত্রাধারের পৈশীক অংশের জড়তার দরুণ মূত্রাবরোধ ।

শ্বাসযন্ত্র । বুকে সঙ্কুচিত বা জঁটা বোধ, যাহার দরুণ রোগী নিশ্বাস প্রস্রাসে অত্যন্ত কষ্টানুভব করে ও তাহার শ্বাসরোধ হওয়ার উপক্রম হয়, সে হা করিয়া নিশ্বাস প্রস্রাসের প্রয়াস পায় এবং সে বিছানায় হেলান দিয়া বসিয়া থাকিতে বাধ্য হয় ; বক্ষশোথ (আস্) ।

নাড়ী । নাড়ী দ্রুতগামী, ক্ষুদ্র এবং কম্পমান ; নাড়ী মুহুগতি বিশিষ্ট (ডিজিট) ; স্তব্ধতার শোথ নাড়ী অসম (Intermittent) ।

অঙ্গ প্রত্যঙ্গ । কঁচকি বা উদর সন্ধিতে স্থচীবিধানের জায় অল্প ভুত হয় ; পায়ে শোথের জায় ক্ষীতি ।

নিদ্রা । অজ্ঞানবৎ নিদ্রা এবং এই অবস্থায় বারম্বার চীৎকার করিয়া কাদিয়া বা লাফাইয়া উঠা ।

জ্বর । সমুদয় শরীরে শীত বোধ এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে হাত এবং পায়ে পীড়া শীতল (ক্যাম্ফার) ; শীত এবং কম্প ; গা কাঁটা দেওয়া বা রোমা-কিত হওয়া ; অঙ্গ প্রত্যঙ্গ এবং সন্ধিতে বেদনা ; গায় আগা মুক্ত উষ্ণতা এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে আভ্যন্তরিক শীতবোধ ও জ্বলাদি পানে অনিচ্ছা ; রোগী একবারে অধিক পরিমাণে জ্বলাদি পান করিতে পারে না ; সন্ধ্যায়

সময় বিছানায় শয়ন করিয়া থাকিলে শীতবোধ ; ঘৰ্ম ; চট্‌চটিয়া ঘৰ্ম ; শেষ
রাত্রিতে ঘৰ্ম, বাহ্যিক লক্ষণ শরীরের সজ্ঞাপের কোনও পরিবর্তন হয় না ।

ব্যবহার । শোথ এবং শোথ সম্বলিত বা শোথ জনিত অস্থখ ;
মস্তিষ্ক, বক্ষ এবং উদরের শোথ ; হঠাৎ ক্ষীতি ; সার্ভাসিক শোথ ; আরক্ত
জ্বর, মূত্রকোষ প্রদাহ এবং সবিরাম বা পালা জরের পর শোথ ; তন্দ্রাবায়ু
(Melancholia) ; জ্ঞানশূন্য হওয়া ; বাস্তবীতে থাকা বা যাওয়ার প্রবল ইচ্ছা
(Nostalgia) ; স্বায় শূল ; আক্ষেপ (Convulsions) ; মৃগীরোগ ; মূত্রকোষ
প্রদাহ ; রক্তাক্ততা ইত্যাদি অন্তর্থে হেলিবোরাস্ ব্যবহার্য্য ।

বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ । পেণীর আক্ষেপিক স্পন্দন (আগারি-
কান্, সিকুটা, কুপ্রাম) ; বিছানা হইতে গড়াইয়া পড়া (মিউয়-আস্) ;
আক্ষেপ এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে অভ্যস্ত শীত বোধ ; যে সকল জ্বীলোক
শিশুকে স্তনদ্বারা পান করায়, তাহাদিগের আক্ষেপ ; অত্যন্ত দুর্বলতা (আস্,
ফেরাম্, ফস্) ; হাত পা শুটাইয়া চীৎভাবে শয়ন করিয়া থাকা ; হঠাৎ
শোথের স্থায় ক্ষীতি ; দুর্বল গওমালা ধাতুবিশিষ্ট শিশু বা বাসক, বালিকা-
গণের অন্তর্ধ ; শিশুগণের দাঁত উঠার সময় অন্তর্ধ (মস্তিষ্ক আক্রান্ত হইলে)
ইত্যাদি হেলিবোরাসের কতকগুলি বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ ।

সমগুণবিশিষ্ট ঔষধ । হেলিবোরাসের কার্য্যের সঙ্গে এপিস্,
আপোসিনাম্, ক্যাস্‌হারিস্ এবং ক্যালী ব্রোমেটামের বিশেষ সাদৃশ্য আছে ।
এতদ্ভিন্ন কোন কোন বিষয়ে ইহার কার্য্যের সঙ্গে অসিট্রিক, বেলাডোনা,
কুপ্রাম্, ডিজিটালিস্, হায়োলায়েমাস্, লাইকোপডিয়াম্, পাল্‌সেটিল্য,
বার্কিউরিয়াম্, ফক্ষরাস্, রাস্-টক্স্, ট্রাইমোনিয়াম্ এবং সাল্‌ফারের কার্য্যের
সাদৃশ্য আছে ।

প্রতিষেধক ঔষধ । ক্যাস্‌ফার, চায়না ।

ডাইলুশন বিচার । ৬, ১২ এবং ৩০ ডাইলুশনই সচরাচর অধিক
ব্যবহৃত হইয়া থাকে । আবার কোন কোন চিকিৎসক এই ঔষধের মূল
আরোক ৫ । ১০ ফোর্টা মাত্রায় ব্যবহার করিয়া বিশেষ ফল পাইয়া থাকেন ।

ক্যালী ব্রোমেটাম্,—ব্রোমাইড্ অব্ পোটাশিয়াম্,—

ক্যালী-ব্রোম্

(KALI BROMATUM, -BROMIDE OF POTASH, -KALI-BROM.)

কোন এক বিখ্যাত হোমিওপ্যাথিক ঔষধালয় হইতে আদিত ব্রোমাইড্ অব্ পোটাশ্ ক্রয় করিয়া উহার ১ গ্রেইণ ৯ ফোঁটা চূয়ান জলে মিশ্রিত করিয়া ইহার ১ম দশমিক ডাইলুশন প্রস্তুত হইয়া থাকে। ২য় এবং ততো-ধিক দশমিক ক্রমের আরোক যথা নিয়মে রেক্টিফাইড্ স্পিরিটে প্রস্তুত হইয়া থাকে।

সাধারণ ক্রিয়া। ইহার প্রকৃত নির্দিষ্ট ক্রিয়া এপর্যন্ত সম্পূর্ণরূপে স্থিরীকৃত হয় নাই। তবে সম্ভবতঃ স্নায়বিক মণ্ডলীর উপর ইহার কার্য থাকা বশতঃ প্রধানতঃ ইহা দ্বারা কসেরিকা মজ্জার ঐ অংশই আক্রান্ত হইয়া থাকে যাহা গৌণ (ধাক্কা) (Reflex impulses) প্রেরণ এবং প্রেরণ করে ও বাহ্যিক দরুণ স্নায়ুর কেন্দ্রস্থানে গৌণ উত্তেজনার স্থান হয়, তৎপর ইহা একারেণ্ট্ স্নায়ুর (Efferent nerves) অগ্রভাগের উপর অংশে কার্য প্রকাশ করিয়া পক্ষাঘাত উৎপন্ন করে এবং অবশেষে ইহা বৃহৎ মস্তিষ্ক (Cerebrum) আক্রমণ করে, বাহ্যিক দরুণ চক্ষুর তারি বিস্তৃত হয়, নেত্রা হওয়ার স্থায় হয়, মানসিক দুর্বলতা হয়, ভ্রম (Hallucinations) ইত্যাদি উৎপন্ন হইয়া থাকে। ইহা দ্বারা সোজা সোজী হৃৎপিণ্ডের পক্ষাঘাত হয় এবং রক্তবহা নালীর পতি শাসনকারী স্নায়ু (Vaso-motor nerves) স্তম্ভিত আক্কেপ উৎপন্ন করিয়া ইহা রক্তবহা নালী সমূহের সংকোচন এবং তৎপর উহার বিস্তৃতি উৎপাদন করে। এই প্রকারে ইহা প্রথমতঃ মস্তক এবং সমুদয় শরীরের রক্ত সঞ্চালন শক্তিকে অবসন্ন করে, বাহ্যিক দরুণ রক্তের পরিমাণ অনেক কমিয়া যায় এবং উহার স্নায়বিক কার্য সম্বন্ধী পক্ষাঘাত হওয়ার দরুণ শরীরের প্রায় সমুদয় বস্ত্র এবং অংশেরই পক্ষাঘাত হইয়া থাকে, রক্ত বহা নালীর পরবর্তী বিস্তৃতির দরুণ উহাতে রক্তাধিক্য বা রক্তাবরোধ হইয়া থাকে, বাহ্যিক দরুণ অবসন্ন স্নায়ুর কেন্দ্র অতিরিক্ত

পরিমাণে বিকৃত হইয়া উহার কার্য অতিরিক্ত পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়া ব্রাদার অতিরিক্ত চৈতন্য এবং আক্ষেপ (Convulsions) উৎপন্ন হইয়া থাকে । চর্মের উপর ইহার এক বিশেষ প্রকৃতির কার্য দেখিতে পাওয়া যায় । ইহা দ্বারা শরীরের স্থানে স্থানে, বিশেষতঃ মুখমণ্ডল, গ্রীবা, কনক ইত্যাদিতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্রণ বা ফোঁসকার ছায়া ফুসুড়ী এবং জালাযুক্ত ক্ষত প্রকাশ পায় ।

সাধারণ প্রাকৃতিক লক্ষণ ।

মন । গর্ভাবস্থার সাত্রিতে ভয় উৎপাদক বা ভয়ানক আকৃতি বা মূর্তি দেখা ; শিশুগণ যেন ভয়ানক আকৃতি দেখিয়া ঘুম হইতে চীৎকার করিয়া কাদিয়া উঠিয়া অচেতনাবস্থায় থাকে এবং সে তাহার নিকটবর্তী কাহাকেও চিনিতে পারে না ও তৎপর টেরা চক্ষে তাকায় ; প্রলাপ উচ্চ এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে ভ্রম দেখা ; রোগী মনে করে যেন কোন ব্যক্তি তাহাকে বিষ খাওয়াইবার অভিপ্রায়ে তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিতেছে (হারোস্) এবং ঈশ্বর যেন তাহাকে শাস্তি দেওয়ার জন্য প্রতিক্রিয়া করিয়া বসিয়াছেন ; রোগী (গ্রীলোক) মনে করে যেন তাহার সম্মুখের মূর্ত্তা হইয়াছে ; মদোন্মত্ততা ; মুখমণ্ডল আরক্ত ও টল্ টলে ; ভয়ানক ভ্রম দেখা (বেল্) ; শুকনাবাদ্য (Melanochlia) এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে ভ্রম দেখা ; রোগী আপনাতঃ মনের ভাব অপরকে বুঝাইয়া বলিতে পারে না ; স্মরণ শক্তির হ্রাস বা বিনাশ ; কথা বলিতে বলিতে রোগী কখন কখন ২।১ টি শব্দ ভুলিয়া বা ছাড়িয়া যায় ; মস্তিষ্কের অস্বাভাবিক জনিত বাকবোধ ।

মস্তক । মস্তিষ্কের উত্তেজনা ; মুখমণ্ডল আরক্ত ও টল্ টলে, চক্ষুর তারা বিস্তৃত, চক্ষু বসিয়া যায় ; মাথাঘুরাণ ; রোগী কখন কখন আগিয়া চীৎকার করিয়া কাদিয়া উঠে ; হাত পায়ে পাতাদি লীতল ; শিশুগণের ওলাউঠা ; মস্তিষ্কে প্রবল রক্তাধিক্য বা রক্তাবরোধ ; মস্তিষ্কে কোন প্রকার দ্রুতি পদার্থের সঞ্চারণের পূর্বেই মস্তিষ্কের প্রদাহ (একন্, বেল্) ।

চক্ষু । চক্ষে স্বাপ্না দেখা ; চক্ষুর তারা বিস্তৃত ; টেরাচক্ষু (হারোস্) ; চক্ষু স্থির দৃষ্টি বা ভয় খাওয়ার ভাব বিশিষ্ট ; চক্ষু বসিয়া যায় ; চক্ষুর জ্যোতি থাকে না ।

মুখমণ্ডল । মুখমণ্ডল শিটা বা ফিকা অথবা মদ খাইয়া নেনা হইলে বেক্রম হয়, মুখমণ্ডল সেক্রম দেখায় এবং এই অবস্থার সঙ্গে সঙ্গে ভ্রম দেখা ।

মুখগহ্বর এবং গলার মধ্য । জিহ্বা লালবর্ণ, শুষ্ক ও বর্ধিত ; জিহ্বা প্রথমতঃ লালবর্ণ ও তৎপর শুষ্ক এবং কটাবর্ণ ; জিহ্বার পার্শ্ব এবং তলা সাদা ; কথা বলিতে কষ্টবোধ ; জিহ্বার কার্যের বৈলক্ষণ্য (জেলন্স) ; তোত্‌লার দ্বার কথা বলা ; মুখে বা নিশ্বাসে প্রাণসে হুর্গন্ধ এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে জিহ্বা সাদা । মুখগহ্বর, গলাগ্নি মধ্য এবং আঁহার বহা-গলনালীর অগ্রভাগের হুই পার্শ্বস্থিত স্থানে অসাড়বোধ (অনেকদিন মদ্য পান করিলে বেক্রম ঘটিয়া থাকে) ।

পাকস্থলী । অত্যন্ত পিপাসা এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে মুখগহ্বরের শুষ্কতা ; গা বমী বমী করা এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে মাথাঘোরা ; বাবদ্বার কাঁঠবমী এবং বমন ।

মল । জলবৎ তরলভেদ ; শিশুগণের ওলাউঠা, বিশেষতঃ উহার সঙ্গে সঙ্গে মস্তিষ্কের উদ্বেজনা এবং চরম বা পতনাবস্থার (Collapse) লক্ষণাদি প্রকাশ পাওয়া ; জ্বীলোক এবং হিষ্টিরিয়া আক্রান্ত রোগীগণের অস্ত্রে অতিরিক্ত পরিমাণ দূষিত বায়ুর সঞ্চার হেতু শূণ্ণ বেদনা (অসাকিটিভা) ।

মূত্রযন্ত্র । বহুমূত্র এবং মূত্রে অতিরিক্ত পরিমাণ শর্করা থাকা ; অতিরিক্ত পরিমাণে মূত্রত্যাগ এবং মূত্রে অধিক পরিমাণ ফস্ফেট্‌স্ (Phosphates) নামক পদার্থ থাকা ; মল ত্যাগের পূর্বেই মূত্র আপনা আপনি গড়াইয়া পড়া ; মূত্র ধারণে অশক্তি ।

জননেন্দ্রিয় । পুরুষের জ্বীপহবাসের ইচ্ছা কমিয়া যায় এবং কোন কোন রোগীর স্বজ্ঞভঙ্গ হয় (আগ্নাশ্) ; ধাতু নিঃসরণ এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে মানসিক অবসন্নতা, সর্বদা মনের জড়তা বা কোন বিষয়ে চিন্তা করিতে অশক্তি, পৃষ্ঠদেশে বেদনা, পা কাঁপাইয়া কাঁপাইয়া চলা ; অত্যন্ত দুর্বলতা (কন্-আস) । জ্বীলোকের শেষ রক্তবোধ হওয়ার সময় মুখমণ্ডল আরক্ত ও টলটলে হয় ও উহাতে কষ্টকর পরমবোধ এবং মস্তিকে রক্তাধিক্য বা রক্তাবরোধ (সাক্সুনেরিয়া) ; পুরুষ সহবাসের ইচ্ছা প্রবল হইয়া পরিতুষ্ট না হওয়ার দরুণ ডিম্বকোষে সায়ুশুলের দ্বায় বেদনা ; দায়বিকতা এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে

মন ও শরীরের অশান্তি (সিমিসিফ্); ডিম্বকোষ এবং জরায়ুর উত্তেজনায়
ধরুণ যোনি ইত্যাদির চুলকানি (ক্যাগেড্); জরায়ু স্থান ভ্রষ্ট হইলে এবং
জরায়ুতে টেম্পিক আব (Tumour) হইলে এই ঔষধ দ্বারা আরাম হয়,
এরূপ চিকিৎসা বিষয়ক গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায় ।

ঋাসঘন্ত্র । থাকিয়া থাকিয়া শুষ্ক কাশি, ২০ বন্টী অন্তর বাহা
রোগীকে একবার আক্রমণ করে; ঋাসকষ্ট এবং তৎপর উদরস্থ আহার
প্রব্যাদি বা শ্লেষ্মা বমন; স্নাত্তিতে এবং শয়ন করিয়া থাকিলে কাশির বৃদ্ধি;
হুপিং কফের (Hooping Cough) ভায় কাশি ।

হুংপিণ্ড এবং নাড়ী । হুংপিণ্ডের শক্তির যেন হ্রাস হয়; হুং-
পিণ্ডের শব্দ অত্যন্ত দুর্বল এবং উহা অতি গোপে গোপে শুনা যায়; হুং-
পিণ্ড আন্তে আন্তে স্পন্দন করে, কাঁপে বা ধড়ফড় করে । নাড়ী প্রথমতঃ
ক্রতগামী এবং তৎপর উহা মৃদু গতি বিশিষ্ট হয়; নাড়ী ক্রতগতি বিশিষ্ট,
ক্ষুদ্র এবং দুর্বল ।

নিদ্রা । নিদ্রাশূন্যতা, বিশেষতঃ যে সকল রোগীর শরীরে রক্তের
পরিমাণ অনেক কমিয়া যায়; অথবা যে সকল স্নায়বিক রোগী অবসন্ন হইয়া
পড়ে, অথবা সর্কদা খিট্ খিট্ করে বা উত্তেজিত অবস্থায় থাকে, তাহা-
বিগের নিদ্রাশূন্যতা (কফিয়া) ।

চর্ম্ম । মাহারা স্থলকার্য বিশিষ্ট এবং যুবা, সর্কদা অপরিষ্কার থাকে,
তাহাদিগের মুখমণ্ডল, স্বক এবং বুকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্রণের ভায় ক্ষুদ্রী
(কার্কো-অনিমেল্); শরীরের স্থানে স্থানে বড়, কষ্টদায়ক কোঙ্কার ভায়
ক্ষুদ্রী যাহা সহজে সারে না; ব্রণ; ফোঙ্কার ভায় ক্ষুদ্রী বিশিষ্ট ক্ষত এবং
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্রণ (হিপ্-সাল্ ক্) ।

বাবহার । মনোমত্ততা; সন্তান প্রসবের পর উন্নততা (Puerperal
Mania); শুভবাস্ (Melancholia); নিদ্রাশূন্যতা; মৃগীরোগ এবং মৃগী-
রোগের লক্ষণাক্রান্ত রোগ সমূহ; স্নায়বিক উত্তেজনা এবং মস্তিষ্কের আবরণক
শিল্পীর উত্তেজনা ও উহাতে রক্তাধিক্য বা রক্তাবরোধ; অঙ্গ প্রত্যঙ্গের
কার্য্যের অবসন্নতা বা বৈলক্ষ্য, থাকিয়া থাকিয়া মাহার উদ্বেক হয়; হিষ্টি-
রিয়া; শরীরের স্থানে স্থানে অসাড়বোধ; পক্ষাঘাত; শিরঃস্পীড়া; ধম্-

ঠিকার ; শুষ্ক করণ ; ধ্বজতল ; যন্ত্রাদির বিদূষি ; ডিম্বকোষের শোধ বা শোধ জনিত অম্লধ ; মাতালদিগের অজীর্ণরোগ ; শিশুগণের ওলাউঠা ; বহুমূত্র ; গুহ্বার বা মূত্রাধারের সঙ্কেতিক যন্ত্রের পক্ষাঘাত ; পুরুষাঙ্গ বা যোনি ইত্যাদির চুলকানি ; স্ত্রীলোকের পুরুষ সহবাসের অতিরিক্ত ইচ্ছা ; স্ত্রীলোকের ডিম্বকোষের স্নায়ুশৃঙ্গের ভ্রার বেদনা ; হৃপিংকক্ ; ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ত্রণের ভ্রার ফুসুড়ী ; কোম্বার ভ্রার ফুসুড়ী ; ক্ষত ইত্যাদি অম্লধে ব্রোমাইড্ অব্ পোটাসিয়াম ব্যবহার্য ।

বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ । স্নায়বিক ধাতু ; স্নায়বিক হ্রস্বলতা, যাহা অনেক সময় পক্ষাঘাতেও পরিণত হইয়া থাকে ; চলিবার সময় পা কাঁপা এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে মাতালের ভ্রার হেলিয়া টলিয়া চলা ; যে সকল পেশী দ্বারা পা প্রসারণ করা যায়, সে সকল পেশীর হ্রস্বলতা ; শরীরের সম্ভাব্যের হ্রাস এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে হাত পায়ের পাঁজাদি শীতল হওয়া ; হাত এবং হাতের পাঁজা বরফের ভ্রায় শীতল ; মস্তিষ্কের উত্তেজনা ; শিশু-গণের ওলাউঠা ; সন্ধ্যার সময় অম্লধাদির বৃদ্ধি ইত্যাদি এই ঔষধের বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ । ইহা স্থূলকায় বা মাংস বিশিষ্ট রোগী, বিশেষতঃ স্থূলকায় বিশিষ্ট বালক বালিকাগণের পক্ষে বিশেষ উপযোগী ।

সমগুণবিশিষ্ট ঔষধ । আয়ু। গ্রিসিয়া, একোনাইট, হায়োসায়ের-মাস, জেল্‌সিম্বিয়াম, বেলাডোনা, ক্যাম্ফার, নাক্স বমিকা, জিক্সাম্ ইত্যাদি ঔষধের কার্যের সঙ্গে ব্রোমাইড্ অব্ পোটাসিয়ামের কার্যের সাদৃশ্য আছে ।

ডাইলুশন বিচার । আদত ব্রোমাইড্ অব্ পোটাসের ১ গ্রেইণ হইতে ৫ গ্রেইণ পর্য্যন্ত অনেক চিকিৎসক ব্যবস্থা করিয়া থাকেন । লেখক স্বয়ং ১ গ্রেইণ হইতে ২ গ্রেইণ সচরাচর ব্যবহার করিয়া থাকেন । কিন্তু একবার একটী হিষ্টেরিয়া রোগাক্রান্ত রোগীর চিকিৎসায় ইহার ১ মাত্রায় ১০ গ্রেইণ ব্যবহার করিয়া তিনি আশু বিশেষ ফল পাইয়াছিলেন বটে ; কিন্তু উহার পশ্চাৎফল বড় ভাল দাঁড়ায় নাই । এই বিষয়টি যেন পাঠক মহাশয় মনের স্মরণ থাকে । যদি এই ঔষধ ব্যবহার করা আবশ্যক হয়, তবে ইহাও স্বয়ং রাখা কর্তব্য যে, ক্রমে মাত্রা না বাড়াইলে এই ঔষধ দ্বারা স্নায়বিক

পাওয়ার আঁশ ছুরাশা বলিলেও অভ্যক্তি হয় না। কোন কোন চিকিৎসক ১ম দশমিক ক্রমের আরোকও ব্যবহার করিয়া থাকেন।

ক্যালী কার্বোনিলাম্,—কার্বোনেট্ অব্ পোটাস্,—ক্যালী-কার্ব্

(KALI CARBONICUM, -CARBONATE OF POTASH, -KALI-CARB.)

কোন এক বিষত হোমিওপ্যাথিক ঔষধ বিক্রেতার ঔষধালয় হইতে আদত কার্বোনেট্ অব্ পোটাস্ ক্রয় করিয়া যথানিয়মে চূরান জলে (Dis-tilled Water) ইহার প্রথম দশমিক ক্রমের আরোক প্রস্তুত হইয়া থাকে। যথা নিয়মে ইহার সঙ্গে সুগার অব্ মিক্ মিশাইয়া ইহার গুঁড়াও প্রস্তুত হইয়া থাকে। ১৫ ভাগ চূরান জলে ৫ ভাগ রেক্টিফাইড্ স্পিরিট্ মিশাইয়া যথানিয়মে উহা দ্বারা ২য় দশমিক বা ১ম শততমিক ক্রমের আরোক প্রস্তুত হইয়া থাকে। ৩য় দশমিক ক্রমের আরোক প্রফ্ স্পিরিট্, ৪র্থ দশমিক ক্রমের আরোক ২০° ডিগ্রী ওবার প্রফ্ স্পিরিট্ এবং ৫ম ও ততোধিক ক্রমের আরোক রেক্টিফাইড্ স্পিরিটে প্রস্তুত হইয়া থাকে।

সাধারণ ক্রিয়া। শ্বাস যন্ত্রের মৈথিলিক ঝিল্লী, পরিপাক যন্ত্র এবং স্নায়োকেসের জরায়ু ও ডিম্বকোষের উপর ইহার কার্য অতি প্রবল। ইহা উক্ত যন্ত্রগুলিকে এত অধিক উত্তেজিত করে, যে উহার দ্রুণ মনে হয় যেন উহার প্রদাহ অতি নিকটবর্তী অথবা প্রদাহ আরম্ভ হইয়াছে। ইহার প্রভাবে আক্রান্ত ঝিল্লীগুলি অত্যন্ত শুষ্কাবস্থা প্রাপ্ত হয় এবং তদ্রূপ আক্রান্ত ঝিল্লীতে স্থতী বিধানের ভায়া অত্যন্ত তীক্ষ্ণ বেদনা অনুভূত হয়। এই প্রকা-রের স্থতী বিধানের ভায়া বেদনা উৎপাদন করা এই ঔষধের একটি প্রধান বিশেষ প্রাকৃতিক গুণ বা শক্তি মধ্যে পরিগণিত।

সাধারণ প্রাকৃতিক লক্ষণ ।

মন। সহজেই ভীত হওয়া বা ভয় পাওয়া (নাইটি-আদি); সর্বদা রাগ করা বা চটিয়া থাকা বা খিট্ খিট্ করা (ব্রাই, ক্যাম্, নাল্-বম্) ;

মনের উদ্বিগ্ন এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে ভয় (একন্, জেল্‌স্, ওপিয়ার) ; সর্করা-
খিট্, খিট্ ও চিড্, চিড্ করা (ব্রাই, ক্যাম্, সিনা, হিপ্-সাল্‌ক্) ।

মস্তক । ভাড়াভাড়া মাথা বা শরীর ঘুরাইলে মাথাধোরা (কোনা-
রাম্) ; মাথার মধ্যে যেন কোন একটি ঢল্ ঢলে পদার্থ রহিয়াছে এরূপ
অনবরত অস্থিত হয় এবং বাহ্য কপালের দিকে যেন মোচড়াইয়া বা ঝুলিয়া
পড়িতেছে এরূপ অস্থিত হয় ; মাথায় চাপিয়া ধরার ভ্রায় বেদনা ; কপালে
চাপিয়া বা কসিয়া ধরার ভ্রায় বেদনা বাহ্য চক্ষু এবং নাকের গোড়া অবধি
যেন বিস্তৃত হয় ; কপালের দুই পার্শ্বে স্থচী বিধানের ভ্রায় বেদনা, মাথা হেট
করিয়া উপড় হইলে, মাথা নাড়িলে, চক্ষু ঘুরাইলে অথবা মাড়ি সকালনে
বাহার যুদ্ধি হয় এবং মাথা খাড়া করিয়া রাখিলে এবং উক্ত প্রয়োগে বাহার
উপশম হয় ; গাড়ীতে চাপিয়া বেড়াইলে মাথাধরা (ককিউগাস্) ; মাথার
তলবোধ এবং মাথার চুল পড়িয়া যাওয়া (ল্যাক্, নাইট্রিক্-অ্যাস্,
সিপিরা, ফস্) ।

চক্ষু । চক্ষে আলোবোধ এবং উহাতে স্থচীবিধানের ভ্রায় অস্থিত
হওয়া ; চক্ষুর পাতা এবং জ্বর মধ্যবর্তী স্থানের একটি থলিয়ার ভ্রায় ক্ষীতি ;
(উপরের পাতার উক্ত প্রকারের ক্ষীতিতে এপিস্ ব্যবহার্য্য) ; চক্ষুর পাতা
ক্ষীত এবং প্রদাহযুক্ত ; চক্ষুর পাতার পাতায় লাগিয়া যাওয়া, বিশেষতঃ
প্রাতঃকালে (লাইকোপ্, মার্ক্, পাল্‌স্, সাল্‌ক্) ; পড়িবার সময় চক্ষে
বেদনা (কটা) ; চক্ষুর বহির্দেশের কোণে টাটানি এবং আশাযুক্ত বেদনা ;
চক্ষে আলোক সহ হয় না ; চক্ষুদিয়া জল পড়া (একন্, বেল্, মার্ক্, সাল্‌ক্) ;
দৃষ্টিহীনতা, চক্ষুর সম্মুখে যেন কুরাশার ভ্রায় বেধার (ক্যাম্, সাইক্লোমেন্,
মার্ক্, পাল্‌স্, সাল্‌ক্) ; চক্ষুর সম্মুখে আগুনের কথা এবং চিহ্ন যেন ভাদে
(বেল্, সাইক্লোমেন্, মার্ক্, ফস্, সাল্‌ক্) ।

নাসিকা । নাসিকা ক্ষীত এবং লালবর্ণ (বেল্, নাইট্রিক্-অ্যাস্,
ব্রাউটজ্) ; নাসারন্ধ্রে ক্ষত এবং উহাতে চুমটী পড়া (মার্ক্, নাইট্রিক্-অ্যাস্,
ক্যালী-বাই, সিপিরা) ; নাসারন্ধ্রে রক্ত হওয়া (আমন্-কার্ক্, নাস্-বন্) ;
কারবার মাক দিয়া রক্ত পড়া (একন্, বেল্, ব্রাই) ।

কর্ণ । কর্ণের মধ্যে স্থচীবিধানের ভ্রায় বাতনা (কোনারাম্, গ্রাক্,

নাইট্রিক্ আম্), কর্ণমূলস্থিত গ্রন্থির প্রবাহ এবং ক্ষীতি (মার্ক্-বিন্‌গায়োড্); কানের মধ্যে সোঁ সোঁ, সাঁই সাঁই এবং কেড়্ কেড়্ শব্দ হওয়া (বারান্, চারনা; গ্রাক্) ।

মুখমণ্ডল । মুখমণ্ডল শিটা এবং ক্রম্; মুখমণ্ডল ক্ষীত এবং টল্ টলে; গালে ছিঁড়িয়া ফেলা বা স্চটীবিধানের ভ্রায় বেদনা ।

মুখগহ্বর এবং গলার মধ্যে । কেবল খাওয়ার সময়ই দাঁত বেদনা; দাঁতের গোড়ায় দণ্ডপানি, কোন প্রকারের ঠাণ্ডা বা উষ্ণ জিনিশের স্পর্শনেও বাহার বৃদ্ধি হয়; দাঁতের গোড়ায় ছুরিবিধান বা ছিঁড়িয়া ফেলার ভ্রায় বেদনা এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে মুখমণ্ডলের হাড় বেদনা; মুখে অনবরত লাগ উঠা; জিহ্বার অগ্রভাগে অনবরত আলা বা টাটানি (ক্যাক্-কার্ক্, ক্যার্কো-বেজ্); মুখগহ্বর এবং জিহ্বার বেদনা এবং উহা আলাবুদ্ধ বা কষ্টকর ফোকার ভ্রায় ফুসুড়ী দ্বারা আবৃত (নেট্রাম্-মিউর, মিউর-আস্, লাইকোপ্); মুখে পচা এবং চট্‌চটিয়া স্বাদ (আণিকা, মার্ক্, নাক্স-বম্); গলার মধ্যে পক্ষাৎভাবে অত্যন্ত চট্‌চটিয়া আঠার সঞ্চার (হাইড্রাট্, ক্যালী বাই); মাছের কাঁটা ফুটিয়া লাগিয়া থাকিলে বেক্রম হয়, আহারবহা গলনালীর ঠিক উপরিভাগের হুইপার্শ্বে দেক্রম স্চটীবিধানের ভ্রায় বেদনা (হিপ্-সাল্‌ফ্); ঠাণ্ডা লাগিলে গলার মধ্যে উষ্ণ প্রকারের বেদনামুভব; গলার মধ্যে হুড়্ হুড়্ কল বা উহার মধ্যে কোন প্রাণী হামা দিয়া চলিয়া যাইতেছে এরূপ অনুভূত হওয়া, বাহ্যিক দক্ষণ কাশি এবং গলা থেকুরের উদ্বেক হয়; গিলিতে কষ্টানুভব; আহার দ্রব্যাদি আহার বহা গলনালী দিয়া অত্যন্ত আন্তে আন্তে পাকস্থলীতে প্রবেশ করে এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে কাঠবমী ও বমনের উদ্বেক হয়; গ্রীবার গ্রন্থির ক্ষীতি ।

পাকস্থলী এবং উদর । টক উদগার উঠা (আলাম্, ক্যার্কো-বেজ্, নাক্স-বম্, ফল্, সাল্‌ফ্); উদরস্থ আহার দ্রব্যাদি এবং জল বমন; আহারের পর বমনোদ্বেগ; কোন প্রকারের মানসিক উত্তেজনা বা অবসন্নতা হইলেই বমনোদ্বেগ; গর্ভাবস্থার বমনোদ্বেগ (নাক্স-মক্, সাল্‌স্, সিপিয়া); পাকস্থলী যেন জল দ্বারা পরিপূর্ণ রহিয়াছে অনবরত এরূপ অনুভূত হয়; পাকস্থলীর মধ্যে ক্ষীত এবং বিস্তৃত করিয়া ধরার ভ্রায় অনুভূত

হয়; স্পর্শনেও পাকস্থলী বেদনায়ুক্ত হয় বা টাটীর (হায়োস্‌, নেট্রাম্‌-কার্ক); পাকস্থলীর মধ্যে প্রবল দগ্ধপানী এবং কঠিনবৎ বেদনা (বেল); আহারের পর পাকস্থলীতে চাপা এবং ভারিবোধ (ব্রাই, নাক্স-বম্‌, পালম্‌); যকৃত প্রদেশে উষ্ণ, জ্বালাযুক্ত বা স্থচী বিধানের জ্বাশ বেদনা (একন্‌, আম্‌, ব্রাই, চায়না, মার্ক্‌, নাক্স-বম্‌, পিপিয়া); উদরের সমুদয় অংশেই কঠিনবৎ প্রবল বেদনা (কলোস্‌); সামান্য দ্রব্যাদি উদরস্থ হইলেই উদরে পূর্ণ ও উষ্ণবোধ এবং উদর স্ফীত ও বিস্তৃত হয় (চায়না, লাইকোপ্‌, নাক্স-বম্‌); অস্ত্রের মধ্য দিয়া শীতল তরল পদার্থ বহিষ্য গেলো যেক্রপ হয়, উদরে সেক্রপ অহত্বত হয়; তলপেটে স্থচীবিধানের জ্বাশ অহত্বত হয়; শুষ্কহার দিয়া অধিক পরিমাণে দূষিত বায়ু নিঃসরণ ।

মল এবং মলদ্বার । শুষ্ক এবং শুষ্কহারে বৃহৎ আকারের, বেদনায়ুক্ত বা কষ্টদায়ক অর্শের বলী (মিউর-আম্‌) এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে বলী গুলিতে স্থচী বিধানের জ্বাশ বা জ্বালাযুক্ত বেদনা; মলত্যাগের সময় শুষ্কস্থিত বলী গুলি শুষ্ক দ্বারের বাহির হইয়া পড়ে; মলত্যাগের সময় অধিক পরিমাণে রক্ত পড়া; শুষ্কহারে স্থচীবিধানের জ্বাশ বেদনা, টাটানি (সালফ্‌) এবং জ্বালাহুভব; মলত্যাগের সময় কৌণ্ডপাড়া এবং কৌণ্ডপাড়িলেও মল নির্গত হয় না (আমন্‌-মিউর, কোনাগাম্‌, নাক্স-বম্‌); মনে হয় যেন শুষ্কের এমুন শক্তি নাই যদ্বারা ইহা মল বাহির করিয়া দিতে পারে; মল কোমল, রক্ত মিশ্রিত এবং পরিমাণে অত্যন্ত অল্প; ভেড়ার মলের জ্বাশ মলত্যাগ (আলাম্‌, প্রাধাম্‌, ওপিয়াম্‌, পিপিয়া); মল অতি কষ্টে নির্গত হয় ।

মূত্রবস্ত্র । বারম্বার প্রস্রাব করা, বিশেষতঃ রাত্রিতে (আম্‌, কস্‌-আম্‌, কোনাগাম্‌, ডিজিট্‌) এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে মূত্রবস্ত্রে অত্যন্ত চাপা ও কষ্টবোধ বা বাতনা এবং অল্প পরিমাণে মূত্রত্যাগ; মূত্রত্যাগের সময় মূত্রনাগীতে জ্বালাহুভব ।

জননেন্দ্রিয় । পুরুষের হয় স্রী সহবাসের অত্যন্ত ইচ্ছা হয়, নতুবা উক্ত ইচ্ছা একবারেই থাকে না; স্পর্শে ধাক্কা নিঃসরণ, বা স্রী সহবাসের পর অত্যন্ত দুর্লভ বোধ (আগারিকাণ্‌, ক্যাক্‌-কার্ক্‌, চায়না, কস্‌-আম্‌,

টাকিস); জীলোকের নিম্নমিত সময়ের অনেক পূর্বে অনেক দিন ব্যাপিয়া এবং অতিরিক্ত খরিশাণে রজঃস্রাব (বেল, ক্যাক্-কার্ক, নাজ্-বন্, ফস্, সাবাইনা); রজঃরোধ এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে শোথের জলের সঞ্চয়ের লক্ষণাদি প্রকাশ পাওয়া; রজঃস্রাবের সময় এবং উহার পূর্বে ও পরে বোনি এবং উহার নিকটবর্তী স্থানে অত্যন্ত টাটানি; রজঃস্রাবের সময় পেটে কৰ্ভনবৎ প্রবল বেদনা; কোমরের পশ্চাৎভাগে কনকনানি (সিমিসিক্, পাল্‌স); বোনি ইত্যাদিতে চুলকানি বিশিষ্ট আমবাতের স্থায় ফুসুড়ী (ডাক্); হরিজাবর্ণের কতকারক শ্বেতপ্রদর নিঃসরণ (আস্); পৃষ্ঠদেশে বেদনা; তবে ছিঁড়িয়া ফেলা বা স্থচীবিধানের স্থায় বেদনা (ব্রাই) ।

শ্বাস যন্তু । খাওয়ার সময় বুকে যেন বাধ বাধ বোধ হয়; প্রাতঃ-কালে শ্বাসকষ্ট বা নিশ্বাস প্রস্থাস ঘন ঘন; সম্পূর্ণ অরুচি বা অরুচিতা (কার্কো-বেল্, কটিকাম্, হিপ্-সাল্‌ফ্, ফস্); শেযরাজি ৩টা হইতে ৪টা পর্যন্ত কাশির বুদ্ধি (আমন্-কার্ক, ডুমিরা); সন্ধ্যার সময় বা প্রথম রাত্রিতে শয়ন করার পর কাশি; থাকিয়া থাকিয়া কাশি, গলার মধ্যে হুড়-হুড়ীক দরুণ বাহার উল্লেখ হয়; আক্ষেপিক কাশি এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে কাঠ-বনি বা বমন; গলার মধ্যে শুষ্কবোধের দরুণ ফাঁপড় হওয়া বা শ্বাসরোধ হওয়ার উপক্রম হওয়া; কাশিতে কাশিতে গলাদিয়া পূঁয়সংযুক্ত শ্লেষ্মা নির্গমন (চায়না, ডাক্, লাইকোপ্, ফস্, সাইলিসি); গলা দিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ডেলা ডেলা গোলায় স্থায় শ্লেষ্মা নির্গমন; তাড়াতাড়ি চলিলে বুকের মধ্যে হ্রস্বল বোধ; চলিবার সময় প্রস্থাসে বুকের মধ্যদিয়া আঁটাকোঁধ; সন্ধ্যার সময় বা প্রথম রাত্রিতে শয়ন করার পর বুক কৰ্ভনবৎ বেদনা; নিশ্বাসে বুকের মধ্যে স্থচীবিধানের স্থায় বেদনা (ব্রাই, ফস্); কথা বলিলে, শ্বাস প্রস্থাসে, কোন প্রকারের ভারি দ্রব্য উঠাইলে বুকের মধ্যে বেদনা এবং টাটানি (রাস্টক্); বুক চাপা বোধ ।

হৃৎপিণ্ড । বারবার প্রবল হৃৎস্পন্দন (একন্, আস্, স্পাইজেল্, সাল্‌ফ্); হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন অসম (Intermittent) (ডিজিট্, নেট্রাম্, রিউর) ।

গ্রীবা এবং পৃষ্ঠদেশ । ঘাড় শক্ত হয় বা উহা নোমান যায় না (রাস্টক্, ইগ্‌লেস্, ল্যাক্); চলিবার সময় পৃষ্ঠদেশে কনকনানি, বাহার

হৃদয় রোঙ্গির মনে হয় যেন সে আর চলিতে না পারিয়া শয়ন করিয়া থাকিতে বাধ্য হইবে; জীলোকের সম্মান প্রসবের পর, গর্ভপ্রাবের পর বা জরায়ু হইতে অতিরিক্ত রক্তস্রাবের পর, পৃষ্ঠদেশে কনকননি; ভাঙ্গিয়া গেলে বেকুণ হয়, পৃষ্ঠদেশে সেকুণ বেদনা (বেল, নেটাম্-মিউর, নাক্স-বম্) ; প্রাতঃকালে নিশ্বাস প্রশ্বাসে ডাইন স্বল্পে স্থচীবিধান বা ছিঁড়িয়া ফেলার জ্বর বেদনা; কোমরের পশ্চাৎভাগে কসিয়া ধরার স্ফায় বেদনা; কোমরের পশ্চাৎ ভাগে কঠিন চাপারোধ; কোমরের পেশী গুলিতে ছিঁড়িয়া ফেলার জ্বর বেদনা ।

অঙ্গ, প্রত্যঙ্গ, হাত, পা ইত্যাদি। সন্ধ্যার সময়, শয়ন করিয়া থাকিলে অঙ্গ প্রত্যঙ্গে অমুখবোধ; অঙ্গ প্রত্যঙ্গে ভারিবোধ, বাহ্যিক দৰ্শনযোগে রোগী পায়ের পাতা ভুলিতে পারে না; হাত পা যেন অসাড় হইয়া যায়; অঙ্গ প্রত্যঙ্গে কসিয়া ধরা বা ছিঁড়িয়া ফেলার জ্বর বেদনা; কোন পদার্থের উপর বসিলে অঙ্গ প্রত্যঙ্গে বেদনার উদ্বেগ হয়। উভয় বাহুই দুর্বল হয় এবং উহাতে কোন শক্তি থাকে না; বাম স্বস্ত্রের সন্ধিতে ছিঁড়িয়া ফেলায় জ্বর বেদনা; বামগলের গ্রন্থির স্বীতি; উভয় কনুইয়ের সন্ধিতে কসিয়া ধরা বা ছিঁড়িয়া ফেলার জ্বর বেদনা; বাম বাহুর উপরিভাগে থাকিয়া থাকিয়া চিড়িক মারার জ্বর যাতনা; হাত এবং হাতের আঙ্গুলে অসাড়বোধ; বামগলে বর্ষা। চলিবার সময় পায়ের আঙ্গুলের মাঝার অত্যন্ত বেদনামুক্তক; ক্রান্তিতে ডাইন উক্ক এবং পায়ের ডিমে আক্ষেপ বা খিলখিল; হাঁটু, পা এবং পায়ের পাতার ছিঁড়িয়া ফেলার জ্বর বেদনা।

নিজ। নিজীবেন এক বারবার হাঁহিভেলা (নাক্স-বক); খাওয়ার
সময় যেন ঘুম পায়; আহারের পর ঘুম পায় (নাক্স-বদ); অস্থির নিজ
ক ঘুম ভাল হয় না; অশ্রু দেখা; ঘুমেরকোরে কথা বলা; শেষ রাত্রি সহ
টার সময় ঘুম ভাঙ্গিয়া বাইরা রাত্রিতে আর ঘুম হয় না।

ব্যবহার । ফুফুসের অস্থি; ফুফুস-প্রদাহ; ফুফুস-স্রাবের ক বিদী
প্রদাহ; বক্ষাকাশ; হাঁপানি কাশি; বার্নল প্রদাহ; হৃদি বক্ষ-
কাশি; শোথ জনিত বা শোথ সম্বন্ধিত অস্থি, বিশেষতঃ বৃদ্ধ বয়সে; সার্ভি-
সিক শোথ; উদরী; বক্ষ-শোথ; রক্তজনিত; বক্ষাত; অস্ত্রাণ; বক্ষভেদ রক্ত-

দিক্য বা রক্তাবরোধ ; অৰ্পরোগ ; রক্তঃরোধ বা প্লোণে প্রথম রক্তঃপ্রাব ; পক্ষাঘাত ; বাতরোগ ইত্যাদি অন্তর্থে ক্যালী কার্বোনিকাস্ ব্যবহার্য্য ।

বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ । -বারম্বার ক্লান্ত এবং অবসন্ন হইয়া থাকা ; সহজেই বা সামান্য কারণেই সর্দিলাগা (ক্যাঙ্ক-কার্ক, নেট্রাম্-মিউর, কস্, সাইলিসি) ; পেশী স্পন্দন (আগারিকাস্, ইগ্‌নেস্, আয়োড্, ট্রোমন্) ; অক্লান্ত হানে কসিয়া ধরা বা হুগী বিধানের ভ্রায় বেদনা ; হৃৎপিণ্ড অত্যন্ত দুর্বল হয় এবং তদক্ষণ নাড়ীও দুর্বল হয় ; রসকর জনিত জ্বর বা হেকটিক্ ফিবার (Hectic Fever) ; সমুদয় শরীরেই খালি খালি বোধ, বাহ্যিক দৃশ্য মনে হয় যেন শরীরে কোন প্রকারের কঠিন বা ঘন পদার্থ নাই ; শেষ রাত্রি ২টা হইতে ৩টা পর্য্যন্ত, বিশ্রামে এবং শরীরে ঠাণ্ডা লাগিলে অন্তর্জ্বর বৃদ্ধি, এবং দিনের বেলা চলিয়া বেড়াইলে, উষ্ণ প্রয়োগে বা গরমে এবং গরম কাপাসে অন্তর্জ্বরের উপশম ইত্যাদি এই ঔষধের বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ । বৃদ্ধ বয়স, হুলকার বিশিষ্ট এবং চর্ম্মযুক্ত ও চন্দ্রে পেশী বিশিষ্ট শরীর, কাল চুল ; জীবনী শক্তির হ্রাস, বারন্ত, পুঁষাদি নিঃসরণের পর, বিশেষতঃ রক্তাক্ত ধাতু বিশিষ্ট রোগীর পক্ষে এই ঔষধ বিশেষ উপযোগী ।

সমগুণ বিশিষ্ট ঔষধ । নেট্রাম্ মিউরিয়টিকাস্ এবং ষ্ট্রোনায়ের কার্যের সঙ্গে ক্যালী কার্বোনিকাস্‌য়ের বিশেষ সাদৃশ্য আছে । এতদ্বিন্ন কোন কোন বিষয়ে ইহার কার্যের সঙ্গে আর্সিনিক, একোনাইট্, বেলা-ডোনা, ব্রাইওনিয়া, কার্বো-বেজিটেবিলিস্, ক্যামোমিলা, চায়না, কোনা-রাম্, জেন্‌সিমিয়াম্, ক্যালী ব্রাইজমিকাম্, ওপিয়াম্, ল্যাক্সেসিস্, লাই-কোপতিয়াম্, মার্কিউরিয়াম্, নাইট্রিক্ অ্যাসিড্, নাক্স-বমিকা, কল্করাস্, পাল্‌গেটিল, রাস্টক্স, ট্রোবোনিয়াম্, সিপিরা এবং সাল্‌ফারের কার্যের সাদৃশ্য আছে ।

প্রতিবেদক ঔষধ । ক্যাস্কার, কফিরা ।

ডাইলুশন বিচার । ১ম, ২য় এবং ৩য় ক্রমই সচরাচর অধিক ব্যবহৃত হইয়া থাকে । ফুফুসের স্কেটিক রোগের (Pulmonary Tuberculosis) ১ম ও ২য় ক্রম বিশেষ উপকারী । কোন কোন চিকিৎসক ৬, ১২ এবং ৩০ ক্রমও ব্যবহৃত করিয়া থাকেন ।

ক্যালী আয়োডেটাম্,-ক্যালী হাইড্রায়ডিকাম্,-আয়ো- ডাইড্ অব্ পোটাশ্,-ক্যালী-আয়োড্

(KALI IODATUM,-KALI HYDRIODICUM,-IODIDE OF
POTASH,-KALI IOD.)

কোন এক বিষ্ত হোমিওপ্যাথিক ঔষধালয় হইতে আয়োডাইড্, অর্, পোটাশিয়াম্ ক্রয় করিয়া যথানিয়মে ডাইনুট্, আল্ কোহলে ইহার ১ম দশমিক ক্রমের আরোক প্রস্তুত হইয়া থাকে। ২য় এবং ততোধিক দশমিক ক্রমের আরোক যথানিয়মে রেক্টকাইড্, স্পিরিটে প্রস্তুত হইয়া থাকে। যথানিয়মে স্থানীয় অব্ মিকে মিশাইয়া ইহার শুঁড়াও প্রস্তুত হইতে পারে।

সাধারণ ক্রিয়া। শরীরের মৈত্রিক ঝিল্লী এবং গ্রন্থির উপর ইহার কার্য অতি প্রবল এবং অনেকটা পারার (Mercury) ত্রায়। অতএব পারা শরীরের যে সকল অংশ বা তরল পদার্থ ধ্বংস করে, আয়োডাইড্ অব্ পোটাশেও সে সকল অংশ এবং তরল পদার্থ ধ্বংস করিয়া থাকে। লিম্ফেটিক্ গ্রন্থির উপর ইহার কার্য আয়োডিনের ত্রায় এবং তদ্রূপ উক্ত অংশের বিরুদ্ধি এবং উহার কার্যের ক্ষমতার বিনাশ হয়। ইহা অস্থি আবরক কঠিন পর্দা (Periosteum) পূরু করে। অতএব গরমীর ব্যারাম জনিত অস্থি আবরক কঠিন পর্দার মধ্যে যে প্রকার আব (Tumour) হয়, তাহাতে ইহা বিশেষ উপকারী। পারার (Mercury) অপব্যবহার এবং গরমীর ব্যারাম জনিত রোগে এই ঔষধ বিশেষ উপকারী।

সাধারণ প্রাকৃতিক লক্ষণ।

মন। বিষম্ভাব এবং মনের উদ্বিগ্ন (ইগ্নেস্, নেট্রাম্-মিউর, পাল্‌স্)।

মস্তক। মাথার উপরিভাগে বেদনা, বাহ্যিক দ্রবণ মনে হয় বেন মাথা কাটিয়া ছিন্ন হইবে (ব্রাই, চারনা, নেট্রাম্-মিউর, সিনিয়া, সাই-লিসি); অর্, অঁটিয়া রাবিলে বেক্রম হয়, মাথার দুই পার্শ্বে সেক্রম বেদনা বা বাতনা (মার্ক্, নাইট্রিক্-আস্); বাম চক্ষুর উপরিভাগে ছিঁড়িয়া কেলা বা

হঠাৎ হৃদী বিধানের ভায় বেদনা বা যাতনা ; চুলকাইবার সময় মনে হয় ঘেন মাধার ক্ষত হইয়াছে (মার্ক) ।

মুখমণ্ডল । মুখমণ্ডল শিটা, বর্ণহীন ; মুখমণ্ডল এবং বিস্তার ক্ষীতি, বিশেষতঃ পারার (Mercury) অপব্যবহারের পর ।

চক্ষু । চক্ষু বসিয়া যায়, উহা নীলবর্ণ রেখা দ্বারা পরিবেষ্টিত হয় এবং উহার স্থানে স্থানে আবের (Tumour) ভায় ক্ষীতি (আজেক্ট-নাইটিক) ; চক্ষুর বোজক বিস্তীর্ণ থলিয়ার ভায় জনপূর্ণ ক্ষীতি (Chemosis) ; চক্ষে জালাহুতব ; চক্ষে পূর্ব সংযুক্ত শ্লেষ্মার ভায় পদার্থের সঞ্চার ; চক্ষুর পাতার শোথের ভায় ক্ষীতি বা শোথ (এপিস্, ক্যালী-কার্ক, রাস্টেক্স) ; চক্ষুর সম্মুখে কৃয়াশা থাকিলে বেক্রপ হয়, চক্ষে সুরূপ বাপ্পা বা কম দেখা (ক্যালী-কার্ক, ল্যাক্, মার্ক, পাল্‌স) ; গবমীর ব্যারাম বা পারার অপব্যবহার জনিত চক্ষুর আইরিস নামক অংশের প্রদাহ (Syphilitic or mercurial Iritis) ; চক্ষু সর্বদাই জলপূর্ণ এবং তদ্রূপ সর্বদাই চক্ষে বাপ্পা দেখা ; চক্ষুর পাতার প্রোক্ত অত্যন্ত জালবর্ণ এবং অত্যন্ত বেদনায়ুক্ত ; রাত্রিতে বেদনা বজ্রপাদির বৃদ্ধি ; চক্ষুর আইরিস নামক অংশের প্রদাহ সম্বলিত চক্ষুর কোররেড্‌ ব্রিল্লীর প্রদাহ (Irido-Choroiditis), বিশেষতঃ উক্ত রোগ গরমীর ব্যারাম জনিত হইলে ; কর্নিয়াতে (Cornea) ফোকার ভায় ফুসুড়ী ; আলোকে কোন কষ্ট বাতনা থাকে না অথবা চক্ষু লাল হয় না ।

নাসিকা । তরুণ সর্দী এবং চক্ষু, নাসিকা, গণার মধ্য এবং তালুকা জালবর্ণ ও উহার সঙ্গে সঙ্গে চক্ষু দিয়া প্রচুর পরিমাণে জল পড়া (সিপা, ইউফ্রেন) ; প্রবল হাঁচি এবং নাক দিয়া উগ্র ক্ষতকারক জলের ভায় শ্লেষ্মা নির্গমন (সিপা, মার্ক-কর) ; নাসারন্ধ্রে অত্যন্ত চট্‌চটিয়া আঠা শ্লেষ্মার সঞ্চার (ক্যালী-ব্রাই) ; নাক দিয়া সবুজের আভাযুক্ত কাল অথবা হরিদ্রাবর্ণের, দুর্গন্ধযুক্ত বমন উৎপাদক পদার্থ অথবা সবুজের আভাযুক্ত পচা রক্ত নিঃসরণ ; নাকের গোড়ায় পূর্ণ এবং আঁটাবোধ (একন্, ক্যালী-ব্রাই) ; নাক এবং কপালের হাড়ে হপ্‌হপিয়া ও জালাযুক্ত বেদনা এবং আক্রান্ত স্থানের ক্ষীতি ; নাকের হাড়ে চর্কনবৎ বেদনা এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে আক্রান্ত স্থানে ছুরি দিয়া কাটা এবং ছিঁড় করার ভায় বেদনা বাহা কপাল পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয় ।

মুখগহ্বর এবং গলার মধ্য। জিহ্বার অগ্রভাগে জালায়ুক্ত বেদনা (ক্যাক্-কার্ক, কার্কো-আনিমেল্, কালী-কার্ক); জিহ্বার অগ্রভাগে ফোকার ভ্রায় কুসুড়ী (নেট্রাম্-মিউর); মুখগহ্বরে শুকানুভব (আস্, ব্রাই, নাক্স-মফ, পাল্‌স); দাঁতের মাড়ী, বিশেষতঃ ক্ষয় প্রাপ্ত দাঁতের গোড়ার ক্ষীতি; মুখে অত্যন্ত দুর্গন্ধ (অগ্নিকা, হিপার-সাল্‌ফ্, আয়োড, নাইট্রিক্-আস্); মুখে প্রচুর পরিমাণে লাল উঠা (আয়োড, মার্ক্, নাইট্রিক্-আস্, আইরিস); ইন্ডাস্ট্রিয় নিম্নস্থিত লাল নিঃসারক গ্রন্থির ক্ষীতি এবং পাকিয়া উহাতে পুঁয় উৎপন্ন হওয়া (হিপ-সাল্‌ফ্, সাইলিনিস)। গলার মধ্যে চুল-কানি এবং উহাতে শুকানুভব; গ্রীবা দেশস্থিত থাইরয়েড্-গ্রন্থি (Thyroid-gland) ক্ষীতি এবং উহাতে টাটানি; আলজিফ্রা ক্ষীত এবং লম্বা হওয়া; গলার মধ্যের স্নায়িক ঝিল্লীর শোথ।

পাকস্থলী এবং উদর। অত্যন্ত পিপাসা (একন্, আস্, ব্রাই, বেল); বমনোদ্বেষণ এবং বমন (ইপিকাক্, আন্টি-টার্ট্, লোবিলিয়া); প্রবল বমন এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে মুখে প্রচুর পরিমাণে লাল উঠা। হঠাৎ অত্যন্ত পেট ফাঁপিয়া উঠা, ঘাহার দক্ষণ মনে হয় যেন পেট কাটিয়া যাইবে এবং শুষ্কতার দিয়া দ্ব্যিত বায়ু নিঃসরণ হইলেই যাহা কমিয়া যায় (কার্কো-বেজ্)।

মল। মল কঠিন, পরিমাণে অল্প এবং শুষ্কতার দিয়া অতি কষ্টে নির্গত হয়; ফিকা সবুজ এবং হরিদ্রাবর্ণের জলবৎ তরল ভেদ।

জননেদ্রিয়। পুরুষজের অত্যন্ত ক্ষীতি এবং প্রদাহ। জীলোকের রজঃস্রাবের সময় বারম্বার প্রস্রাবের ইচ্ছা; তরল, জলের ভ্রায়, উগ্র এবং ক্ষতকারক খেত প্রদর নিঃসরণ; স্তন সঙ্কুচিত বা ছোট হওয়া (আয়োড)।

শ্বাসযন্ত্র। ছাল উঠিয়া গেলে বেৰূপ হয়, বায়ুনের উপরিত্রাগে সেরূপ বেদনা বা বাতনা; অত্যন্ত গভীর শব্দ বিশিষ্ট কাশি এবং গলা দিয়া সাদাটিয়া ও সবুজের আভাযুক্ত স্লেমা নির্গমন ও উহার সঙ্গে সঙ্গে বৃকে ছিঁড়িয়াফেলার ভ্রায় বেদনা বাহা বক্ষাস্থির নিম্নাংশ হইতে আরম্ভ হয়; বৃকে খুচী বিধানের ভ্রায় বাতনা, বক্ষাস্থির মধ্য দিয়া অথবা বৃকের গভীর অংশ দিয়া পৃষ্ঠদেশ পর্যন্ত বাহা বিস্তৃত হয় (ক্যালী-কার্ক); চলিবার সময় বৃকে

উচ্চ প্রকারের ঘাতনা ; বক্ষাকাশ এবং তদনুগ গলাদিয়া পূর্ব সংযুক্ত স্নেহা-
নির্গমন ; রাক্তিতে ঘর্ম এবং তরল ভেদ হওয়া ; ফুফুসের শোথ এবং উহার
সঙ্গে সঙ্গে ফুফুস প্রদাহ ; মূত্রকোষের ট্রাইটস্ ডিজিঙ্ হেতু ফুফুসের শোথ
এবং গলা দিয়া সাবান গোলার ভায়, সবুজ স্নেহা নির্গমন ।

হৃৎপিণ্ড । হৃৎস্পন্দন, চলিলে যাহার বৃদ্ধি হয় ।

পৃষ্ঠদেশ । জু অঁটিয়া রাখিলে যেরূপ হয়, কোমরের পশ্চাৎভাগে
সে রূপ বেদনা ; চলিয়া বেড়ানোর পর কোমরে উচ্চ প্রকারের বেদনা ।

অঙ্গ প্রত্যঙ্গ । অঙ্গ প্রত্যঙ্গে ছিঁড়িয়া ফেলা, ছুরি বিধান বা চর্কণ-
ব্যং বেদনা ; বেদনা অস্থির আবরক কঠিন পর্দা (Periosteum) আক্রমণ
করে ; রাক্তিতে বেদনার বৃদ্ধি ; পারার অপব্যবহার অথবা গরমীর ব্যারাম
জনিত বেদনা ; বৃহৎ সন্ধিবাত ; ক্ষুদ্র সন্ধিবাত বা গাউট্ (Gout) ।

চর্ম । মুখমণ্ডলে দাঁদের ভায় চুলকানি বিশিষ্ট ফুসুড়ী ; সমুদয়
শরীরে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্রণ অথবা কোঁকার ভায় ফুসুড়ী, মুখমণ্ডল, কক্ষ, পৃষ্ঠদেশ
এবং বকেই যাহা অধিক হয় ।

নিদ্রা । অস্থির নিদ্রা বা ভাল ঘুম না হওয়া ; নিদ্রাশূন্যতা ।

ব্যবহার । পারার (Mercury) অপব্যবহার, গরমীর ব্যারাম এবং
গণ্ডমালা ধাতু জনিত অমুখ ; গৌণ গরমীর ব্যারাম (Secondary Syphi-
lis), বিশেষতঃ পারার অপব্যবহারের পর এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে গণ্ডমালা
জনিত অমুখ ; বাগী ; গরমীর ঘা, যাহার প্রান্ত উচ্চ এবং যাহা হইতে পাতলা,
ক্ষতকারক অথবা দধির ভায় রক্ত নির্গত হয় ; গভীর ক্ষত, যাহার বেদনাদি
রাক্তিতে বৃদ্ধি হয় ; গ্রন্থির অমুখ ; অস্থির অমুখ ; পুরাতন আকারের বৃহৎ
সন্ধিবাত ; সাইনোব্রিয়াল্ কিল্লীর প্রদাহ (Synovitis) ; গায় গোলাপী রঙের
ফুসুড়ী ; গায় দাঁদের ভায় গোলাকারের ফুসুড়ী ; রূপীয়া (Rupia) রোগ ; মুখ
ইত্যাদিতে ক্ষত এবং উহা হইতে রক্ত নির্গমন ; বক্ষাকাশ ; ফুফুসের শোথ
ইত্যাদি অমুখে আয়োডাইড্ অব্ পোটাসিয়াম্ ব্যবহার্য্য ।

বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ । অত্যন্ত সার্ভাঙ্গিক হ্রস্বলতা ; পেশীর
অগ্রভাগের স্পন্দন অথবা পেশী বা উহার অগ্রভাগের সঙ্কোচন (হাইপোর্স্,
ট্রামন্) ; গ্রন্থির বিবৃদ্ধি বা উহার হ্রাস বা সঙ্কোচন ; শরীরের নানা অংশে

শোথের দ্বারা জলীয় পদার্থের সঞ্চার (এপিস, আপোসাইনাম্, আন্) ; অস্থির ক্ষীতি (আসাকিটিডা, হিপ্-সালফ্) ; রক্তিতে, ঠাণ্ডা বাতাসে, বিশ্রামে অস্থিরের বৃদ্ধি এবং নড়া চড়াতে অস্থিরের উপশম ইত্যাদি এই ঔষধের কতকগুলি প্রধান প্রাকৃতিক লক্ষণ। পারার (Mercury) অপব্যবহারের পর এই ঔষধ বিশেষ উপকারী।

সমগুণ বিশিষ্ট ঔষধ। অরাম্, ইউকেসিয়া, ক্যালী-বাইক্রমিকাম্, হিপার সাল্ফিউরিস্, আয়োডিন্, মার্কান্, মেজিরিয়াম্।

প্রতিষেধক ঔষধ। হিপার সাল্ফিউরিস্।

ডাইলুশন বিচার। ১ম, ২য় এবং ৩য় ক্রম সচরাচর ব্যবহার্য। অনেক সময় লেখক আদত আয়োডাইড্ অব্ পোটাশিয়াম্ ১২ বা ৩ গ্রেইণ মাত্রায়ও ব্যবহার করিয়া থাকেন।

ক্রিয়াজোটাম্,-ক্রিয়োজোট্,-ক্রিয়াজ্

(KREASOTUM,-KREASOTE,-KREAS.)

কোন এক বিস্তৃত হোমিওপ্যাথিক ঔষধালয় হইতে আদত ক্রিয়াজোট্ ক্রয় করিয়া উহার মিশ্র আরোক রেক্টিফাইড্ স্পিরিটে প্রস্তুত করিতে হয়।

সাধারণ ক্রিয়া। লিম্ফেটিক্ মণ্ডলী (Lymphatic System), পরিপাক বন্ত্র এবং জীজনেনেত্রিয়ার লৈঙ্গিক ঝিল্লীর উপর ইহার ক্রিয়া বিশেষ প্রবল, বাহার দক্ষণ উক্ত বন্ত্রাদির লৈঙ্গিক অস্থ্য হইয়া উহা পচিবাদ উপক্রম হয়, উহাতে ক্ষত হয় এবং তৎপর আক্রান্ত অংশের ধ্বংস সংসাধিত হইয়া থাকে। আক্রান্ত স্থানে উগ্র ক্ষতকারক নিঃসরণ উৎপাদন করা এই ঔষধের একটি বিশেষ প্রাকৃতিক গুণ বা শক্তি মধ্যে পরিগণিত।

সাধারণ প্রাকৃতিক লক্ষণ।

মন। অরণ শক্তির দুর্বলতা বা হ্রাস (আগারিকাম্, আধ্রা, আনাকার্ড্, লেডাম্, মার্ক্, মাজ্-মফ্, নেটাম্-মিউর, ফস্-আস)।

মস্তক । মাথাধোরা ; অতিরিক্ত মন্য পানের পর ঘেরূপ হয়, মাথাধর
সেবন চিমাবোধ (নাক্স-বম্) ; মাথার, বিশেষতঃ কপালে দগ্ধদিয়া বেদনা ।

চক্ষু । একখানি মিহি কাপড়ের মধ্য দিয়া তাকাইলে ঘেরূপ হয়,
চক্ষে সেবন কাপ্সা দেখা (কষ্ট, ক্রোকাশ্, হায়োস্, পিটোন্, কস্, পাল্‌স্,
রাস্টন্) ; চক্ষে উষ্ণ এবং জ্বালাহুতব ; চক্ষু দিয়া জল পড়া (একন্, আস্,
মার্ক্-কর) ; চক্ষু দিয়া যে জল পড়ে তাহা লবণের জলের জ্বার উগ্র এবং
জ্বালা উৎপাদক ; চক্ষুর পটতার প্রাপ্ত স্বীত (পাল্‌স্, টাকিন্) ।

কর্ণ । কানের মধ্যে সোঁ সোঁ শব্দ হওয়া ; রক্ত-প্রাবের সময় এবং
উহার পূর্বে কানে গুণ্ গুণ্, ভন্ ভন্ শব্দ হওয়া এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে কানে
কম শুনা ।

নাসিকা । নাকের মধ্যে দুর্গন্ধ (ক্যাক্-কার্ক) ; বারবার হাঁচি
দেওয়া, বিশেষতঃ প্রাতঃকালে ; শুষ্ক বা তরল সর্দি এবং উহার সঙ্গে
সঙ্গে অত্যন্ত হাঁচির উদ্রেক ; বৃদ্ধ ব্যক্তিদ্বিগের পুরাতন সর্দি ।

মুখমণ্ডল । মুখমণ্ডল শিটা বা ফিকা, নীলের আভাযুক্ত, স্বীত
এবং টন্ টলে ; মুখমণ্ডলে মধ্যে মধ্যে দম্কা উৎপাদন এবং উহার সঙ্গে
সঙ্গে গালের স্থানে স্থানে চক্রাকারের লাগচিহ্ন (সাজুনেরিয়া, সাল্‌ক্) ; মুখ
মণ্ডলে জ্বালাযুক্ত বেদনা, চলিলে বা অন্ত কোন প্রকারের শারীরিক পরি-
শ্রমে বাহার বৃদ্ধি হয় এবং অস্থি পার্শ্ব শয়ন করিলে বাহার উপশম হয় ।

মুখগহ্বর । জিহ্বা সাদা লেপযুক্ত (আণ্টি-কুড্, ব্রাট, নাক্স-বম্,
পাল্‌স্, সাল্‌ক্) ; দাঁতের গোড়ার কসিয়া ধরার জ্বার বেদনা (মার্ক্) ;
দাঁতের গোড়া দিয়া সহজেই রক্ত পড়া ; মাড়ি তলতলে এবং ক্ষতযুক্ত
(মার্ক্, নাইট্‌ক্-আস্, কস্) ; মুখে অত্যন্ত গড়া দুর্গন্ধ (আণ্টিকা, আয়োজ্,
নাইট্‌ক্-আস্, নাক্স-বম্) ।

পাকস্থলী এবং উদর । মুখে, বিশেষতঃ গলার মধ্যে তিক্ত স্বাদ
বিশিষ্ট জল উঠা, অথবা উদরস্থ আহার দ্রব্যাদি বমন (কস্, বিরেট্-আস্) ;
পাকস্থলীর কোন এক নির্দিষ্ট স্থানের কঠিনতা এবং উহাতে বেদনা । অতি-
রিক্ত পরিমাণে খাইলে ঘেরূপ হয়, উদরে সেবন পূর্ণবোধ (লাইকোপ্) ;
উদরের ছই পার্শ্ব কসিয়া ধরার জ্বার জ্বাটাবোধ (একন্) ; রোগী কোন-

য়ের কাপড় কসিরা পরিতে পারে না (ক্যাঙ্ক-কার্ক, কার্কো-বেজ্, গ্রাফ্); উদর ক্ষীত এবং বিস্তৃত হয় (অ্যান্টি-ক্লড্, ব্রাই, ক্যান্); উদরে প্রসব বেদনার ভ্রাস শূল বেদনা ।

মল । কোষ্ঠবদ্ধ; মল কঠিন বাহ্য অতি কষ্টে এবং কৌণ পাড়ার পর নির্গত হয় (ব্রাই, নাক্স-বম্, সাগ্ফ) ।

মূত্রযন্ত্র । বারবার মূত্রত্যাগের ইচ্ছা (একন্, এপিস্, ক্যাঙ্); তাড়াতাড়ী মূত্রত্যাগের ইচ্ছা এবং অধিক পরিমাণে মূত্রত্যাগ (মার্ক্); মূত্র হর্গন্ধযুক্ত (বেজ্-আস্, ক্যাঙ্-কার্ক, সাল্ফ, আস্, নাইট্রিক্-আস্); রক্তহীন মূত্রত্যাগ (ইগ্রেস্, ফস্, আস্); মূত্রে লালচে তলানি পড়ে (বেস্, লাইকোপ্, কার্কো-বেজ্, সিপিরা, গ্রাফ্) ।

জননেন্দ্রিয় । জীলোকের নিরমিত সময়ের অনেক পূর্বে অতিরিক্ত পরিমাণে এবং অনেকদিন ধরিয়া রক্তঃস্রাব (ক্যাল্-কার্ক); হরিদ্রা বর্ণের ষ্বেত প্রদর নিঃসরণ বাহ্য লাগিয়া কাপড়াদিতে হরিদ্রাবর্ণ দাগ পড়ে এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে অত্যন্ত দুর্বলতা (কার্কো-আনিমেস্); সাদা ষ্বেত প্রদর নিঃসরণ; প্রস্রাবের সময় যোনির মধ্যে জালাহুতব; যোনির মধ্যে এবং যোনি এবং উরুর মধ্যবর্তী স্থানে জালাহুতব, বা জালা ও বেদনা এবং উক্ত স্থানে জালাযুক্ত বেদনা; যোনির লেবিয়া (Labia) নামক স্থানে অত্যন্ত চুলকানি; যোনিদ্বারে অত্যন্ত চুলকানি (ক্যাঙ্, কোনায়াম্), বাহার দক্ষণ উক্ত অংশ চুলকাইতে বা ঘষিতে ইচ্ছা যায়; যোনির বহির্দেশ ক্ষীত, উষ্ণ এবং কঠিন হয় ও উহা টাটায়; যোনির লেবিয়া নামক অংশের মধ্যবর্তী স্থানে টাটানি (সিপিরা); গর্ভাবস্থায় বমনোবেগ, সুখে জল উঠা; সন্তান প্রসবের পর যোনিদ্বার দিয়া অত্যন্ত দুর্গন্ধযুক্ত ক্ষতকারক ক্রেন (Lochia) নিঃসরণ; স্তন সঙ্কুচিত বা ছোট হইয়া যাওয়া (আরোড্, ক্যানী-আরোড্) এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে স্তনের স্থানে স্থানে ডেগার ভ্রাস বেদনাযুক্ত ক্ষীতি অস্বভূত হওয়া ।

শ্বাসযন্ত্র । গলার মধ্যে টাচিয়া ফেলার ভ্রাস বা থসু থসে বোধ এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে স্বরভঙ্গ (মেজিরিয়াম্, নাক্স-বম্); শ্বাস প্রশ্বাস ঘন ঘন (একন্, আস্, ফস্); আক্কেপিক কাশি এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে বমনের

ইচ্ছা (আন্টি-টার্ট); থাকিয়া থাকিয়া তরল কাশি, বক্ষাধির পশ্চাৎভাগে কোন প্রাণী হামা দিয়া বাইতেছে এরূপ অনুভূত হওয়ার দৰূণ বাহ্যিক উদ্বেক হয়; বুকের মধ্যে জ্বালাদুর্ভব (অসি, নাজ-বম); বুকে, হৃৎপিণ্ডের ঠিক উপরি প্রদেশে স্ফটাবিধানের জ্বাৰ বেদনা (লিলিয়াম, ক্যালী-কার্ব); বারম্বার গলাদিয়া স্লেথার সঙ্গে রক্ত উঠা; বুকে প্রবল বেদনা; শেক বেলায় জ্বর এবং প্রাতঃকালে বা শেষ রাত্রিতে ঘৰ্ম ।

ঐষা এবং পৃষ্ঠদেশ । ঐষদেশস্থ গ্রন্থির ক্ষীণতা (ব্যারাইটা, ক্যাক্-কার্ব, বার্ক, হিপ-নাল্, অ্যারোড); কোমরের পশ্চাৎদেশে প্রবল বেদনার জ্বাৰ বেদনা (মিমিসিফ, পাল্) ।

অঙ্গ প্রত্যঙ্গ । মোচড়াইয়া পড়িলে বেক্রপ হয়, অঙ্গ প্রত্যঙ্গে সেক্রপ বেদনা (আর্নিকা); বাম হস্তের বৃদ্ধাঙ্গুলীতে মোচড়াইয়া পড়া বা ধোঁত দিয়া যাওয়ার জ্বাৰ বেদনা ।

চক্ষু । সমুদয় শরীরে চুলকানি, শেববেলা বা সন্ধ্যার সময় বাহ্যিক বৃদ্ধি হয়; সমুদয় শরীরে ফোকার জ্বাৰ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফুসুড়ী (ক্রোটন, আইরিস) ।

নিদ্রা । ঘুমাইবার অত্যন্ত ইচ্ছা এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে বারম্বার হাঁইতোলা; নিদ্রা শূন্যতা; কোন দৃষ্টত: কারণ ব্যতীতও বারম্বার এপাশ ওপাশ করিয়া ছট্-ফট্ করা ।

ব্যবহার । গণ্ডমালা জনিত অস্থখ; পচাযুক্ত ক্ষত; কোন অংশ পচিয়া যাইয়া উহা হইতে প্রচুর পরিমাণে পুঁথ পড়া; ককটরোগ (Cancer); সর্দি বা স্লেথিক রোগ; দাঁত উঠিবার সময় অস্থখ; দাঁত পোকায় ধরাব (Caries) দৰূণ দন্তশূল; গর্ভাবস্থায় বমন বা বমনোদগে; অঙ্গীর্ণ বা পেটের অস্থখ; জরায়ু হইতে অতিরিক্ত রক্তস্রাব; স্বেত প্রদর; শরীর চুলকানি; বহুমূত্র ইত্যাদি রোগে ক্রিয়াজোটা ব্যবহার্য ।

বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ । সার্বজনিক দুর্বলতা এবং বলহীন; প্রাতে নিয়মিত সময়ের পূর্বে ঘুম ভাঙ্গিলে শরীর অবসন্ন হয়; সকল প্রকারের রক্তস্রাব; সামান্য লা বা ক্ষত হইলেও উহা হইতে অতিরিক্ত রক্ত স্রাব হয় (ফস); শরীরের স্থানে স্থানে অবশবোধ এবং স্পর্শজ্ঞান থাকে না; শীত শীত শরীর শীর্ণ হয়; স্লেথিক বিলীর উপরিভাগে ছাল উঠিয়া

ঘাওয়া বা ক্ষত হওয়া (হাইড্রাটস)। প্রাতঃকালে, সন্ধ্যাতে, বহির্কর্মান্মুখে, শরীর ঠাণ্ডা হইলে, গায় ঠাণ্ডা লাগিলে, ঠাণ্ডা জলে স্নান করিলে, ঠাণ্ডা জব্য খাইলে, অথবা বিশ্রামে অশ্রুধের বৃদ্ধি এবং উষ্ণ প্রয়োগে বা উত্তাপে বা নড়া চড়াতে অশ্রুধের উপশম ইত্যাদি ক্রিয়াজোটার কতকগুলি বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ। বৃদ্ধ জীলোক, লম্বা ক্রবাক বিশিষ্ট রোগী গণের চিকিৎসার ক্রিয়াজোট্ দ্বারা বিশেষ উপকার দর্শে।

সমগুণবিশিষ্ট ঔষধ। কার্কে। বেজিটেবিলিস্, কার্কে। আনি-মেলিস্, মার্কিউরিয়াম্ এবং-পিটোলিয়ামের কার্যের সঙ্গে ক্রিয়াজোটার কার্যের বিশেষ সাদৃশ্য আছে। এতদ্ভিন্ন কোন কোন বিষয়ে আণ্টিমোনিয়াম্ টার্ট্, আর্সিনিক্, কার্কেলিক্ অসিড্, ক্যাল্কেরিয়া কার্ক্, গ্রাফাইটিস্, হিগার সাল্ফিউরিস্, ইপিকাকিউএনা, আয়োডিন্, নাইট্রিক্ অসিড্, ফরফরাস্, সাল্ফারের কার্যের সঙ্গেও ইহার কার্যের সাদৃশ্য আছে।

প্রতিষেধক ঔষধ। একোনাইট, আর্সিনিক, চায়না, ইপিকাকিউএনা, নাক্স-বমিকা।

ডাইলুশন বিচার। বমন, বমনোদ্বেষণ এবং জরারূ হইতে রক্ত-স্রাব বা শ্বেত প্রদরে ১ম, ৩য় এবং ৬ষ্ঠ ডাঃ ব্যবহারে বিশেষ ফল পাওয়া যায়। টেষ্টের (Teste) মতে দস্তশূলে ১২ ক্রম এবং শিশুগণের দাঁত উঠার সময়ের অশ্রুধে ২৪ ক্রম বিশেষ উপকারী। আমরাও টেষ্টের মতে ১২ এবং ২৪ ক্রম ব্যবহার করিয়া উক্ত দুই প্রকার অশ্রুধে বিশেষ ফল পাইয়া থাকি। শিশু-গণের পিতা মাতার পরমীর ব্যারামের দরুণ পরমীর ব্যারাম বা অজ্ঞ কোন অশ্রুধ হইলে ১২ বা ৩০ ক্রম বিশেষ উপকারী। বহুমুত্রে ৩ ডাঃ উপকারী।

লেডাম্ পেলাস্ট্রি,-লেডাম্

(LEDUM PALUSTRE,-LED.)

ইউরোপের উত্তরাংশ, ফ্রান্স্, আসিরা এবং আমেরিকাতে এই গাছ জন্মে। ইহার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ডাল এবং পাতা যথা নিয়মে রেক্টিকাইড্ স্পিরিটে ভিজাইয়া ইহার মূল আরোক্ত প্রস্তুত হইয়া থাকে।

সাধারণ ক্রিয়া। শরীরের মাস্ক (Serous), অণ্ডাশ এবং প্রৈমিক কিল্লী, অস্থির আবরক কঠিন পর্দা (Periosteum) এবং চর্মে উৎপন্ন ইহার কার্য অতি প্রবল, যাহার দ্বারা আক্রান্ত অংশে প্রবাহ জনিত সন্ধি বাতের জ্বাৰ লক্ষণাদি প্রকাশ পায়, উহাতে দূষিত পদার্থের সঞ্চয়ের বৃদ্ধি হয় এবং উহাতে ঘণ পদার্থের সঞ্চয় হয়।

সাধারণ প্রাকৃতিক লক্ষণ।

মন। সর্বদা আপন অবস্থায় অসন্তুষ্ট; বিমর্ষতা; চিড়, চিড়, খিট্-খিট্ করা (ব্রাই, নাক্স-বন্স)।

মস্তক। নেসা করিলে ঘেরূপ হয়, সেরূপ মাথাঘোরা (নাক্স-মক্, ককিউলাস), বিশেষতঃ বহির্কায়ুতে চলিয়া বেড়াইলে (আগারিকাশ, ক্যাক্-কার্ক, গ্লোনয়েন্, সিপিয়া, সাল্ফ); অবসন্নকারক শিরঃপীড়া; অভ্যন্তর ভয়ানক দপ্পদিয়া শিরঃপীড়া (বেল, গ্লোনয়েন্)।

চক্ষু। চক্ষে আলোক সহ্য না হওয়া; চক্ষুর তারা বিস্তৃত (বেল); চক্ষুদিয়া অঙ্গা উৎপাদক, ক্ষতকারক জল পড়া (আস্, ইউক্রেস)।

কর্ণ। ঝড় তুফান বা সজোরে বাতাস বহিলে ঘেরূপ হয়, কানে সেরূপ সোঁ সোঁ শব্দ হওয়া (জেল্‌স); কানে কম শুনা।

মুখমণ্ডল। মাতালদের ঘেরূপ হয়, মুখমণ্ডল এবং কপালে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভ্রণের জ্বাৰ সেরূপ কুঁকড়ী; কপালে ভ্রণ (হিপ্-সাল্ফ)।

গলার মধ্য। গলার মধ্যে হৃদ কুটানের জ্বাৰ বেদনা বা টাটানি।

পাকস্থলী। মুখ দিয়া জল উঠা (নেট্রাম্-কার্ক, নাক্স-বন্স, পাল্‌স); রাত্রিতে সামান্য পরিমাণে আহাৰ দ্রব্যাদি উদরস্থ হইলেও পেটে চাপা বা ভারিবেধ (চায়না, লাইকোপ্)।

হৃৎপিণ্ড। বক্ষাহির বাম প্রান্তের মধ্যদিকে ঠেলিয়া বা চাপিয়া ধরার জ্বাৰ অসহ্য হয়; হৃৎস্পন্দন; রক্তপ্রবাহ হেতু হৃৎস্পন্দন।

শ্বাসযন্ত্র। কাশি, বাহ্য আরম্ভ হওয়ার পূর্বে শ্বাসরোধ হওয়ার উপক্রম হয় (আস্); গভীর শব্দবিশিষ্ট থুপ্-থুপ্ কাশি এবং গলাদিয়া পূর্ব লংঘুক্ত শ্লেষ্মা অথবা উজ্জল লালবর্ণ ও ফোণযুক্ত রক্ত নির্গমন; ধুকধুক

মধ্যে আঁটাযোথ (আর্ম, সোবিলিয়া), নড়া চড়া এবং চলিয়া বেড়াইলে ঘাহার বৃদ্ধি হয়; খাসরোথ, ঘাহার দরুণ অত্যন্ত কষ্ট অমুভূত হয়; যুকে এবং বাইয় উপরিভাগে জল বা পান বসন্তের জায় ফুকুডী।

গ্রীবা এবং পৃষ্ঠদেশ । বসা অবস্থা হইতে দাঁড়াইলে পৃষ্ঠদেশ এবং কোমর অত্যন্ত শক্ত হয়, বা বেদনায়ুক্ত হওয়ার দরুণ উহা নোয়ান যায় না (বার্বেরিস্, রাস্টক্স)।

অঙ্গ, প্রত্যঙ্গ, হাত, পা ইত্যাদি । সন্ধিতে কঠিন পদার্থের সঞ্চার হেতু কঠিন আবেশের জায় অমুভূত হয় (কার্ক-কার্ক, ফস-আম্, মার্ক); হাঁটু এবং মণিরন্ধে চাপিয়া ধরার জায় বেদনা; ক্ষুদ্র সন্ধিবাত (আক্টিয়া-স্পিক্, কলোকিনাম্); বাতরোগ নিম্নাঙ্গ হইতে আরম্ভ হইয়া উদ্ধাঙ্গে বিস্তৃত হয়; অঙ্গ প্রত্যঙ্গ অবশ হয় এবং উহাতে স্পর্শজ্ঞান থাকে না। হাতের সন্ধি গুলিতে ছিঁড়িয়া ফেলার জায় বাতের বেদনা (ব্রাই, পাল্‌স্, রাস্টক্স, স্পাইজেল্); বৃদ্ধ বয়সে বেষ্ণুণ হয়, নাড়িলে অথবা কোন রজ্জ্ব ধরিতে গেলে সেকরূপ হাত কাঁপে; হাতের বৃদ্ধাস্থলীর প্রথম সন্ধিতে ছিদ্র করার জায় বেদনা; চাপিলে আঙ্গুলের হাড়ের আবরক কঠিন পর্কা (Periosteum) বেদনায়ুক্ত হয়। চলিবার সময় হাঁটুর সন্ধির ক্ষীতি এবং চলিবার সময় উহাতে কসিয়া বা ঘাটিয়া ধরার জায় বেদনা (ব্রাই); চলিবার সময় হাঁটুর সন্ধি বর্জলতা এবং কাঁপনি; হাঁটুর সন্ধিতে ছিঁড়িয়া ফেলার জায় বেদনা বা টাটানি; পা পিছলাইয়া যাইলে বা মোচড়াইয়া পড়িলে বা থেঁৎলিয়া গেলে ঘেকরূপ হয়, পায়ের পাতার সন্ধিতে সেকরূপ বেদনা, নড়া চড়াতে ঘাহার বৃদ্ধি হয় (আর্নিকা, ব্রাই), পায়ের পাতা হইতে হাঁটুর সন্ধি পর্য্যন্ত ক্ষীত হয় (আর্ম, ভিজিট্); পায়ের পাতার ভারি এবং ক্রান্তিবোধ ও উহা শক্ত হয় বা নোয়ান যায় না; মোচড়াইয়া পড়িলে বা থেঁৎলিয়া গেলে ঘেকরূপ হয়, চলিবার সময় পায়ের পাতার তলার সেকরূপ বেদনা; পায়ের বৃদ্ধাস্থলীর মাথা অত্যন্ত ক্ষীত, কোমল এবং চলিবার সময় অত্যন্ত বেদনায়ুক্ত হয়।

চর্ম্ম । সমুদয় শরীর, বিশেষতঃ মুখমণ্ডল এবং কপালে লাল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্রণের জায় ফুকুডী; গায় অত্যন্ত চুলকানি বিশিষ্ট এবং ক্ষতকারক

ফুফুড়ী, চুলকাইলে এবং বিছানার উচ্চতাতে বাহার বৃদ্ধি হয় (মার্ক); গায় ফুফুড়ী বাহা পোকাগর কামড়াইলে বেরুপ হয়, মেরুপ শুলায় এবং আলা করে (মার্কি-কুড্, এপিস্, আর্গিকা) ।

নিদ্রা । নিদ্রাশূন্যতা এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে বিছানায় বারবার এপাশ ওপাশ করিয়া ছট্-ফট্ করা; ঘুমেরঘোরে নানা বিষয়ে স্বপ্নদেখা এবং স্বপ্নে নানা দিকে যাওয়া ।

জ্বর । শীতবোধ; শরীরের স্বাভাবিক উত্তাপের অভাব (সিপিরা, সাইলিসি); অঙ্গ প্রত্যঙ্গ, হাত এবং পায়ের পাতার আলায়ুক্ত উষ্ণাশুভর, বাহার দরুণ উত্তাপ একবারে অসহ্য হইয়া পড়ে (সাল্‌ফ্); সামান্ত শরীরিক পরিশ্রমেই ঘর্ম্ম হয়; (আম্‌স্, ক্যাল্‌ক্-কার্ক্, হিপ্-সাল্‌ক্, ফস্, সিপিরা, সাইলিসি); ঘর্ম্ম কপালগেই অধিক হয়; হাত এবং পায়ের পাতার উষ্ণ ঘর্ম্ম হওয়া; ঘুমেরঘোরে ঘর্ম্ম এবং সমুদয় শরীরে চুলকানির দরুণ ঘুম ভাঙ্গিয়া যাওয়া; রাত্রিতে ঘর্ম্ম হওয়া এবং উহার সঙ্গে গায়ের কাপড় ফেলিয়া দেওয়ার ইচ্ছা ।

ব্যবহার । কীট, বিশেষতঃ মশার কামড়ের দরুণ অসুখ; অঙ্গ দ্বারা কাটা ঘা; মদ্যপান জনিত অসুখ; সকল প্রকার বাত এবং সন্ধি বাত জনিত অসুখ; ত্রণ; রক্তত্রণ; ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ত্রণ; গায় দাঁদের জ্বাঘ এবং অন্যান্য প্রকারের পুরাতন আকারের ফুফুড়ী; শোথ ইত্যাদি রোগে লেডাম্ ব্যবহার্য্য ।

বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ । মারিলে বা থেংলিয়া গেলে বা মোচড়াইয়া পড়িলে বেরুপ হয়, অঙ্গ প্রত্যঙ্গে মেরুপ বেদনা; বেদনাদি এক স্থান হইতে অন্যস্থানে হঠাৎ সরিয়া পড়ে (বেজ্-আস্, ক্যালী-বাই); আক্রান্ত অঙ্গ বা স্থান অত্যন্ত শীর্ণ হয় (গ্রোফ্); আক্রান্ত স্থানে শোথের জ্বাঘ ক্ষীতি (এপিস্, আস্, রাস্-টঙ্ক্); চলিবার সময় পা যথাস্থানে না পড়িলে মাথায় ঝাকি লাগিয়া যেন সন্তিকের কার্য্যাবরোধ হয়। উত্তাপ, বিশেষতঃ বিছানায় উত্তাপ, নড়া চড়া, রাত্রিতে এবং মদ্যপানে অসুখের বৃদ্ধি ইত্যাদি লেডাম্‌ মেরু কতকগুলি বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ ।

সমগুণবিশিষ্ট ঔষধ । লেডামের কার্য্যের সঙ্গে রাস্-টঙ্ক্,

আর্থিকা, ক্রোটন, পালসেটিল এবং কুটার কার্যের অনেক সাদৃশ্য আছে ।
এতদ্বিন্ন কোন কোন বিষয়ে ইহার কার্যের সঙ্গে আর্দিনিক, বেলাডোনা,
ব্রাইওনিয়া, ক্যালকেরিয়া-কার্ক, চায়না, লাইকোপডিয়াস্, মার্কিউরিয়াস্-
করোসাইরাস্, সিপিগা এবং সাল্‌কারের কার্যের সাদৃশ্য আছে ।

প্রতিষেধক ঔষধ । ক্যান্‌ফার ।

ডাইলুশন বিচার । টেষ্টের (Taste) মতে ৬ষ্ঠ এবং ১২ ক্রম ব্যব-
হারে বিশেষ উপকার দর্শে । কোন কোন চিকিৎসক এই ঔষধের ৩০ এবং
২০০ ডাইলুশনও ব্যবহার করিয়া যথোচিত ফল পাইয়া থাকেন । বাহ্যিক
প্রয়োগে ইহার মূল আরোক ব্যবহৃত হইয়া থাকে ।

ফাইস্টিগ্‌মা,-ক্যালেবার বিন্,-ফাইসক্ট্

(PHYSOSTIGMA,-CALABAR BEAN,-PHYSOST.)

ক্যালেবার বিনের বিচি যথানিয়মে রেক্টিফাইড্ স্পিরিটে ভিজ্জাইয়া
মূল আরোক প্রস্তুত হইয়া থাকে ।

সাধারণ ক্রিয়া । কসেব্রকা মর্জ্জা দিয়া ফাইস্টিগ্‌মা সার্বাঙ্গিকপক্ষা-
ঘাত উৎপাদন করিয়া আক্রান্ত অংশের জ্ঞান উৎপাদক শক্তি রহিত করে
এবং শ্বাস বস্ত্রের পক্ষাঘাত এবং হৃৎপিণ্ডের কার্যের উত্তেজনার সহায়কারী
গ্যাংগ্লিয়ার (Ganglia) পক্ষাঘাত হেতু হৃৎপিণ্ডের কার্যের হ্রাসের দ্রুণ মৃত্যু
হয় এবং এমতাবস্থায় মৃত্যু পর্য্যন্ত সকল রোগীরই স্পর্শজ্ঞান এবং চেতনা
শক্তিতে কোন প্রকারের বৈলক্ষণ্য দেখিতে পাওয়া যায় না । ইহা প্রথমতঃ ক্ষুদ্র
ক্ষুদ্র রক্তবহা নালীর সংকোচন ও তৎপরে উহার বিস্তৃতি উৎপাদন করে
এবং আত্যন্তরিক প্রয়োগে চক্ষুর তারা সঙ্কুচিত হয় । ইহা চক্ষুর দূরবর্তী
এবং নিকটবর্তী বস্তু দেখিবার শক্তি হ্রাস করে । বায়ুর গতি উৎপাদক
শক্তির পক্ষাঘাতের দ্রুণ স্থানিক উত্তেজনা হেতু পেশী স্পন্দন উৎপন্ন
হয় । উক্ত কারণে অনিচ্ছা পূর্বক পেশী সঞ্চালনের সহায়কারী পেশী গুলি
ধক্টকারের দ্বারা অবস্থা প্রাপ্ত হয়, বাহার দ্রুণ মৃত্যুসাধন, পাকস্থলী এবং অন্ত্র

হইতে মূত্র, উদরস্থ আহার দ্রব্যাদি এবং মল বারবার নির্গত হয় এবং অল্প জড়িত হইয়া একটি গাঁইটের (Knot) ভায়ে আকার ধারণ করে। ইহা সকল প্রকার নিঃসর্গের, বিশেষতঃ চক্ষের জল এবং লালের পরিমাণ বৃদ্ধি করে। ইহা চক্ষের দূরের বস্তু দেখিবার শক্তির অনেক হ্রাস করে।

সাধারণ প্রাকৃতিক লক্ষণ :

মন । অসাধারণ মানসিক বা চিন্তা চাকলা (চায়না, কফিয়া); কোন বিষয়ে চিন্তা করায় অশক্তি ; কোন বিষয়ে মন নিবিষ্ট না হওয়া (জেলন্স) ; মনে হয় যেন সমুদয় গোলমেলে হইয়া রহিয়াছে ; রোগী মনে করে যেন তাহার ঘরে অনেক জিনিশ রহিয়াছে বাহা সে বারবার গণিতে থাকে।

মস্তক । মাথায় গোলমেলে বোধ এবং মাথা বিম্ব বিম্ব করা ; মাথায় ভারি এবং চিমা বোধ ; মাথাধরা এবং মাথায় চিমা এবং ভারি বোধ ; দুই চক্ষুর উপরিভাগেই অসহ্য বেদনা (চায়না, চিনিলাম-সাল্ফ) ; কপালে ভয়ানক বেদনা, বিশেষতঃ প্রাতঃকালে (ক্যালী-বাই, নেট্রাম্ মিউর, নাক্স-বম্) ; কপালে এবং কপালের দুই পার্শ্বে ও কর্ণের পশ্চাৎ ভাগে যেন রক্ত সঞ্চিত হইয়া রহিয়াছে এরূপ অনুভূত হয় (বেল্ গ্লোনয়েন্) ; কপালের দুই পার্শ্বে খোঁচাবিধার ভায়ে প্রবল বেদনা ; টেম্পোরেল্ (Temporal) এবং ক্যারোটিড্ (Carotid) ধমনিতে দপ্ দপানি (বেল্) ; মাথার ঠিক উপরিভাগে এবং কপালের দুই পার্শ্বে অত্যন্ত কষ্টদায়ক চাপাবোধ ; মাথার উপরিভাগের চাপাবোধ মাথার পশ্চাৎ ভাগ পর্যন্ত বিস্তৃত হয় এবং বাহার দরুণ রোগী শয়ন করিয়া থাকিতে বাধ্য হয়।

চক্ষু । প্রথমতঃ ডাইন এবং তৎপরে বাম চক্ষু প্রদাহযুক্ত হয় ; চক্ষুর খেতাংশ লালবর্ণ, শুষ্ক এবং ক্ষীণ ; চক্ষুর গোলক বেদনামুক্ত হয় এবং উহাতে জ্বালা অনুভূত হয় ; চক্ষুর পাতা যেন জ্বালা করে ; চক্ষে খোঁচা বিধা, কসিয়া ধরা বা মোচড়াইয়া পড়ার ভায়ে বেদনা ; চক্ষু টাটায় এবং চক্ষু এক পাশ হইতে অল্প পাশে ঘুরাইলে অত্যন্ত বেদনার উদ্বেগ হয় (ব্রাই, স্পাইজেল) ; চক্ষু অত্যন্ত দুর্বল এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে চক্ষু দিয়া জল পড়া ; চক্ষে ঝাপসা বা কুয়াশার ভায়ে দেখা (কষ্ট, কন্স, মার্ক) ;

চক্ষুর সম্মুখে যেন কাল দাগ ভাসে (পাল্‌স্); চক্ষে যেন একবারে নানা ঔকারের মিশ্রিত পদার্থ দেখায় এবং তৎপর চক্ষুর উদ্বিগ্নভাগে ও চক্ষুর মধ্যবর্তী স্থানে ঘুসুঘুসে বেদনা; চক্ষুর সম্মুখে কাল এবং সাদা দাগ যেন ভাসে; চক্ষুর কোটরের পশ্চাৎভাগে কনকনানি বাহা মাধার পশ্চাৎভাগে মস্তক পর্যন্ত ও বিস্তৃত হয় এবং বাহা পুস্তকাঙ্কি পাঠ করিলে বৃদ্ধি হয় ও বাহার দরুণ বমনোদ্বেগ হয়; চক্ষুর পাতার স্পন্দন (আগারিকাণ্); চক্ষুর তারার সঙ্কোচন (ওপিয়স্, মার্ক্-কর, কস্, ফাইটোল্); চক্ষে আলোক-মন্ড হয় না (একন্, বেল্, সাঙ্ক্); চক্ষে ঝাপ্সা দেখা; দূরের বস্তু বেধিতে অশক্তি (Myopia); দৃষ্টি অস্বাভাবিক রূপে তীক্ষ্ণ; এক বস্তু দুইটির জায় দেখায়; চক্ষে গোলমেনে বোধ এবং কুরাশার মধ্য দিয়া তাকাইলে ঘেরূপ হয়, চক্ষে সরুপ ঝাপ্সা দেখায় ।

কর্ণ । কানে খোঁচা বিধার স্থায় প্রবল বেদনা; কানের মধ্যে হিস্-হিস্, বজ্-বজ্ এবং টন্টন্ শব্দ হওয়া ।

নাসিকা । তরল সর্দী এবং তদরূপ নাক দিয়া জলের স্থায় তরল স্লেম্মা নির্গমন ও ঝাঁচি দেওয়া; নাসারন্ধ্রের মধ্যে জালা, চিড়িক মারা, চুলকানি এবং কুট্-কুট্ করা; নাসারন্ধ্র রক্ত এবং উষ্ণ; নাসিকার স্পন্দন এবং নাসারন্ধ্রের অনিচ্ছা পূর্বক বিস্তুতি ।

মুখমণ্ডল । মুখমণ্ডল শিটা; মুখমণ্ডল লাগবর্ণ এবং উহাজে উচ্ছাদিত (ফেরাম্); মুখমণ্ডলের ডাইন পার্শ্বে শ্রাব্যুশ্লের স্থায় বেদনা; মুখ মণ্ডলের ডাইন পার্শ্বের সঙ্কোচন ।

মুখগহ্বর এবং গলার মধ্য । জিহ্বার অগ্রভাগে ক্ষত, টাটানি এবং উহাতে বস্তুসে বোধ; জিহ্বার অগ্রভাগে জালা এবং চিড়িকমারা, বাহার দরুণ মনে হয় যেন জিহ্বা পুড়িয়া গিয়াছে (আইরিস্); জিহ্বা পুরু লেপযুক্ত, বিশেষতঃ উহার গোড়া; জিহ্বা এবং ওষ্ঠে অবশ বোধ এবং কুট্-কুটানি ও উহার সঙ্গে সঙ্গে জিহ্বা এবং ওষ্ঠে অনবরত তিজাইয়া রাখার ইচ্ছা; মুখে বিশ্বাস; মুখে প্রচুর পরিমাণে অল উঠা; মুখে গাঢ় এবং চট্-চটিয়া আঠা থুথু উঠা; কথা বলিতে অত্যন্ত কষ্টানুভব (কেষ্ট্, কোনায়াস্, জেল্‌স্, হায়োস্); গিলিবার অনেকক্ষণ পর পর্যন্ত কথা

বলিবার শক্তি থাকে না। গলার মধ্যে বেদনা বা টাটানি, বাহার দক্ষণ গিলিতে কষ্টানুভূত হয়; টন্সিল্ (Tonsils) এবং কোমল ভাদুক কালচে লালবর্ণ; গলার মধ্যে আঁগা এবং চাঁচিয়া ফেলার ক্রিয় অল্প-
 জুত হয়; আলজিভা লম্বা হয়; আহার বহানালীর ঠিক উপরিভাগের
 দুই পার্শ্বে হরিজ্রা কেন্দ্র বিশিষ্ট ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ক্ষত; গলার মধ্যে বেদনা বাহার
 গিলিবার সময় বাম কর্ণ পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয় (ফাইটোল্); মিয়দিক হইতে
 গলার মধ্যে ঘেন একটা গোলার ক্রায় পদার্থ তৈলিয়া উঠিতেছে এরূপ
 অনুভূত হয় (আসফিটিডা, লাইকোপ্); হমাস্থির নিম্নস্থিত লাল নিঃসারক
 গ্রন্থির ক্ষতি এবং উহাতে বেদনা।

পাকস্থলী এবং উদর । ক্ষুধা থাকে না; আহারে অরুচি;
 তারাকাদি এবং ঠাণ্ডা জলাদি পানে অরুচি; স্বাদশূন্য উল্কার উঠা; বমনো-
 ব্ধেগ এবং বমন; পাকস্থলীতে কঁটা বিধানের ন্যায় প্রবল বেদনা; উদরস্থ
 আহার দ্রব্যাদি হজম না হইলে যে রূপ হয়, পাকস্থলীতে সেরূপ ভারবোধ;
 পেট কামড়ানি; পেটে খালি এবং দুর্বল বোধ; অত্যন্ত স্নায়বিক
 উত্তেজনা এবং তদ্রূপ শরীর কম্পন; পাকস্থলী প্রদেশে টাটানি; উদরের
 দুই পার্শ্বে ছুরি বিধানের ক্রায় বেদনা; স্নিহা প্রদেশে কঠিন বোধ এবং
 টাটানি; উদরের বাম পার্শ্বে স্রুতি বিধানের ন্যায় অনুভূত হয়; উদর
 অত্যন্ত ক্ষীত, বিস্তৃত এবং উহাতে অত্যন্ত কল্কল, গড়গড় শব্দ হয়
 ও উহার সঙ্গে সঙ্গে গুহ্বার দিয়া অধিক পরিমাণে দূষিত বায়ু নিঃসরণ
 (আলোজ্, লাইকোপ্); উদরে শূল বেদনার ন্যায় বেদনা, বাহার দক্ষণ মনে
 হয় যেন উদারাময় হইবে (আলোজ্); ভলগেটে কর্তনবৎ প্রবল বেদনা;
 কঁচুকিতে যুসুসে বেদনা।

মল এবং মলদ্বার । গুহ্বের স্ফোটক ঘন (Sphincter Ani)
 ক্ষীত এবং শক্ত হয়; মলত্যাগের সময় অত্যন্ত কষ্টানুভব; গুহ্বার দিয়া
 গুহ্ব বাহির হইয়া পড়ে এবং তদ্রূপ গুহ্বক্ষীত ও অত্যন্ত বেদনায়ুক্ত হয়;
 অর্শরোগ এবং গুহ্বদ্বারে অত্যন্ত বেদনায়ুক্ত বলী, কৌথপাড়া, গুহ্বদ্বারে
 অত্যন্ত জালানুভব এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে উদরাময়; প্রস্রাবের সময় অত্যন্ত
 কৌথপাড়া (মার্ক্-কর); প্রচুর পরিমাণে কোমল জলবৎ তরল, হরিজ্রার

আত্মায়ুক্ত, পিত্তযুক্ত কটাবর্ণের এবং আল্‌কাতরার জ্বর কাল মলত্যাগ ;
অধিক পরিমাণে কালচে দুর্গন্ধযুক্ত মলত্যাগ ; কোষ্ঠবদ্ধ ।

মূত্রযুক্ত । মূত্রকোষে মোচড়াইয়া পড়া বা খেঁতলিয়া বাওরার
জ্বর বেদনা ; মূত্রাধার যেন স্ফীত এবং বিস্তৃত হইয়াছে এরূপ অস্বভূত হয় ;
বারম্বার অধিক পরিমাণে মূত্রত্যাগ (কন্-আন্) ; মূত্র হরিদ্রাবর্ণ, লালবর্ণ
এবং উগ্রগন্ধযুক্ত ; মূত্র পরিষ্কার ; মূত্র ঘোলাটিয়া ।

জননেন্দ্রিয় । জ্বীলোকের খেঁতপ্রদর ; জরায়ু হইতে অতিরিক্ত
পরিমাণে রক্তস্রাব ; তলপেটে প্রবল বেদনা, বাহার দরুণ মনে হয় যেন
রক্তস্রাব আরম্ভ হইবে ।

শ্বাসযন্ত্র । গলার মধ্যে হুড়হুড়ীর দরুণ কাশি ; শ্বাস প্রবান
কষ্টকর এবং দীর্ঘ ; হাঁইতোলা ; বৃকে সূচী বিধানের জ্বর যাতনা ।

হৃৎপিণ্ড এবং নাড়ী । হৃৎপ্রদেশে ঘৃণ্‌ঘৃণে বেদনা এবং কষ্টা-
হ্রস্ব (ডিজিট) ; হৃৎপিণ্ডের প্রবল স্পন্দন (একন্, ক্যাক্ট) ; হৃৎপিণ্ডের
অত্যন্ত প্রবল শব্দ বিশিষ্ট অনিরমিতরূপে দপদপানি (ডিজিট) ; নাড়ীর
অবস্থা সকল সময়ে এক প্রকার থাকে না ; নাড়ী দ্রুতগামী, ক্ষুদ্র, মুহুগতি
বিশিষ্ট ও দুর্বল এবং অসম (Intermittent) ।

গ্রীবা এবং পৃষ্ঠদেশ । ঘাড় শক্ত হয় বা উহা ন্যূনান যাব না ;
ঘাড়ের বাতের বেদনার জ্বর বেদনা ; পৃষ্ঠদেশ অত্যন্ত দুর্বল, বাহার দরুণ
রোগী সোজা হইয়া দাঁড়াইতে পারে না ; পৃষ্ঠদেশে ঘৃণ্‌ঘৃণে বেদনা ;
মাথার পশ্চাৎদেশ হইতে হানা দেওয়ার জ্বর অবশবোধ আরম্ভ হইয়া
সেকদণ্ডে বিস্তৃত হয় ; ডাইন স্ক্লাম্বির নিম্নপ্রদেশে বেদনা (চেলিডন্) ;
কোমর প্রদেশে ভারিবোধ এবং ঘৃণ্‌ঘৃণে বেদনা ; বাম কুঁচকী বা উরুর
সন্ধিতে ভারিবোধ এবং ঘৃণ্‌ঘৃণে বেদনা যাহা পৃষ্ঠদেশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয় ;
শুষ্ক হারের ঠিক উপরিভাগে বেদনা, নড়া চড়াতে বাহার বৃদ্ধি হয় ।

অঙ্গ প্রত্যঙ্গ । অনেককণ চলিয়া বেড়াইলে ঘেঁষণ হয়, অঙ্গ
প্রত্যঙ্গে সেকদণ্ডে ক্রান্তিবোধ (ক্যাক্-কার্ক, চায়না) ; সমুদয় অঙ্গ একত্র
পক্ষাঘাতের জ্বর অবশ এবং অসাড়বোধ (একন্) ; অঙ্গ প্রত্যঙ্গে মারুশূনের
জ্বর বেদনা ; খেঁতলিয়া গেলে বা মোচড়াইয়া পড়িলে ঘেঁষণ হয়, সমুদয়

সন্ধিতে সেরূপ শক্তিবোধ এবং উহা সঞ্চালনের সময় উহাতে বেদনামুভব ; চলিবার সময় পা টলে বা কাঁপে ; চলিবার সময় যেন হাঁটু ভাঙ্গিয়া পড়ে, চক্ষু বুজিয়া চলিবার সময়ই উহা অধিক অনুভূত হয় ।

নিদ্রা । ঘুমের অনিবার্য ইচ্ছা ; অজ্ঞানের দ্বায় ঘুমান (ওপিয়াম) ; অস্থির নিদ্রা বা ঘুম ভাল না হওয়া এবং ঘুমেরবোরের স্বপ্ন দেখা ।

জ্বর । পৃষ্ঠদেশে যেন হামা দিয়া শীত চলিয়া বাইতেছে এক্রপ অনুভূত হয় ; হাত এবং পায়ের পাতা ঠাণ্ডা (সাইলিদি, বিরেট্-আব) ; শরীরের বর্ষ ঠাণ্ডা এবং চট্‌টটিয়া আঠা ; মাথা এবং মুখমণ্ডলে উষ্ণামুভব ও উহা লালবর্ণ এবং উষ্ণ ; হাতে শুষ্ক এবং জালাযুক্ত উষ্ণামুভব ; সামান্ত কারণেই বর্ষ হয় ; সমুদয় শরীরে শিশিরের দ্বায় বিন্দু বিন্দু ঠাণ্ডা বর্ষ হয় ; জননেন্দ্রিয়ের চতুঃপার্শ্ববর্তী স্থানে উগ্র গন্ধযুক্ত বর্ষ হয় ।

ব্যবহার । পক্ষাঘাত ; ধুইটকার ; কোরিয়া (Chorea) ; লোকাটো-টার আটাক্সী (Locomotor Ataxy) ; পাগলদিগের সার্বজনিক পক্ষাঘাত এবং ক্রমাগত পেশীকম্প ; দূরের বস্তু দেখিতে অশক্তি (Myopia) ; নিকটের বস্তু দেখিতে অশক্তি ; চক্ষুর পাতায় আক্ষেপ এবং তদ্রূপ উহার স্পন্দন ; চক্ষু গোলকের বিবৃদ্ধি এবং উহার সঙ্গে কর্ণিয়া বাহির হইয়া পড়া ও দৃষ্টি-হীনতা (Staphyloma) ; গ্লকোমা (Glaucoma) ; চক্ষুর আইরিস্ (Iris) বাহির হইয়া পড়া বা স্থান ব্রষ্ট হওয়া ; কর্ণিয়ার অস্বচ্ছতা (Opacity of the Cornea) ; কর্ণিয়াতে ক্ষত ; কেরাটাইটিস্ (Keratitis) ইত্যাদি অন্তর্থে ফাইসটিগ্য়া ব্যবহার্য্য ।

-বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ । অত্যন্ত ক্লান্তি এবং শ্রান্তিবোধ এবং দুর্বলতা (আল্, চায়না) ; অঙ্গাদির আক্ষেপিক স্পন্দন (আগারিকান্, সিকুটা, ট্র্যামন্) ; সমুদয় শরীরের প্রবল কম্পন (আণ্টি-টার্ট) ; পেশীর অত্যন্ত বলকম্প ; ঠাণ্ডা কালের অত্যন্ত তর, বাহার দক্ষ্য মান করিতে ইচ্ছা যায় না ; ঠাণ্ডা লাগিলে যেরূপ হয়, সমুদয় শরীরে সেরূপ টাটানি এবং শক্তিবোধ ; শরীরের স্থানে স্থানে প্রবল বেদনা ; প্রাতঃকালে, অঙ্গ চালনা করিতে অসুবিধা ; অঙ্গের বৃদ্ধি ; বহির্বাৎ এবং শয়ন করিয়া থাকিলে, চক্ষু বুজিলে, হুপ করিয়া থাকিলে, উষ্ণ বস্তুতে স্পর্শ করিলে, ইত্যাদি

অস্থির উপশম ইত্যাদি এই ঔষধের কতকগুলি বিশেষ ঔষুতিক লক্ষণ ।

সমগুণ বিশিষ্ট ঔষধ । জেল্‌সিমিয়াম, ব্যারাইটা আদিটিকা, মাকেরিয়া, বাবোরাভি, আটোপিয়া, ওপিয়াম এবং ট্রায়োনিয়ামের কার্যের সঙ্গে ফাইসটিগ্‌মার কার্যের অনেক সাদৃশ্য আছে ।

ডাইলুশন বিচার । ১ম, ২য়, ৩য় এবং ৬ষ্ঠ ক্রমই সচরাচর অধিক ব্যবহৃত হইয়া থাকে । লেখক স্বয়ং এই ঔষধ অধিক ব্যবহার করিয়া দেখেন নাই । অতএব কোন ক্রম কোন রোগে কিরূপ উপকারী তিনি সে সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বলিতে পারেন না । চক্ষের পাতার স্পন্দনে কেবল একটা রোগীর চিকিৎসায় প্রথমতঃ ৩য় এবং তৎপরে ৬ষ্ঠ ক্রম ব্যবহার করিয়া তিনি বিশেষ ফল পাইয়াছিলেন ।

ইউরেনিয়াম্ নাইট্রিকাম্,-নাইট্রেট্ অব্ ইউরেনিয়াম্,-ইউরেন্-নাইট্

(URANIUM NITRICUM,-NITRATE OF URANIUM,-URAN.-NITR.)

কোন এক বিশুদ্ধ হোমিওপ্যাথিক ঔষধালয় হইতে আদত নাইট্রেট্ অব্ ইউরেনিয়াম্ ক্রয় করিয়া যথানিয়মে চূরান জলে (Distilled Water) মিলাইয়া ইহার ১ম দশমিক ক্রমের আরোক প্রস্তুত হয় । ২য় দশমিক ক্রমের আরোক যথানিয়মে ডাইলুট্ আল কোহলে এবং ততোধিক ক্রমের আরোক রেকটিফাইড্ স্পিরিটে প্রস্তুত হইয়া থাকে । যথানিয়মে সূর্য্য অর্ধবিক্ষের সহিত মিলাইয়া ইহা ব ড়াও প্রস্তুত হইতে পারে ।

সাধারণ ক্রিয়া । মূত্রকোষের উপর ইহার কার্য অতি প্রবল, যাহার দরুণ উক্ত যন্ত্রের পচন এবং ধ্বংস দেখিতে পাওয়া যায়, যাহার দরুণ অধিক পরিমাণে মূত্রের সকার হয় এবং মূত্রে আল্‌বুমেন (Albumen) ও শর্করার (Sugar) সকার হয় । ইহা মূত্রের পরিমাণ এবং আপেক্ষিক গুরুত্ব (Specific Gravity) বৃদ্ধি করিয়া উহার উগ্রতা বা ক্ষতকারক গুণ উৎপাদন

করে। এই কারণে মূত্রের সঙ্গে প্রায়শঃই পদার্থ নির্গত হয় এবং মূত্র ধারণে অশক্তি হয়। বহুমূত্র এবং মূত্রকোষের আইট্‌স ডিজিজ্‌ নামক রোগে ইহা বিশেষ উপকারী। ডাক্তার হিউজ্‌ (Dr. Hughes) বলেন যে, যে প্রকার বহুমূত্র অজীর্ণজনিত হয়, কেবল তাহাতেই এই ঔষধ বিশেষ উপকারী। বহুমূত্র যদি দ্বারবিক মণ্ডনীয় অস্থির দরুণ উৎপন্ন হয়, তবে উহাতে কফরিক্‌ আসিড্‌ বিশেষ উপকারী। যেপ্রকার বহুমূত্রে রোগী অতি শীঘ্র শীঘ্র ক্লান্ত বা শীর্ণ হয় এবং ভোগী অত্যন্ত দুর্বল হইয়া পড়ে এবং তাহার উদরী বা সার্কাস্টিক শোথ হয়, তাহার পক্ষে ইউরেনিয়াম্‌ নাইট্রিকাম্‌ বিশেষ উপকারী। আসিনিট্রিক্‌, মার্কিউরিয়াম্‌ কবোসাইবাম্‌, আক্সেটাম্‌ নাইট্রিকাম্‌, কফরাস্‌, কফরিক্‌ আসিড্‌ ইত্যাদি ঔষধের কার্যের সঙ্গে এই ঔষধের কার্যের অনেক সাদৃশ্য আছে। লেখক এই ঔষধের ১ম দশমিক ক্রমের আরোক ২১০ ফোর্টি মাত্রায় সচরাচর ব্যবহার করিয়া থাকেন। কোন কোন চিকিৎসক আদত নাইট্রেট্‌ অফ্‌ ইউরেনিয়াম্‌, ১ গ্রেইণ্‌ মাত্রায় চুয়ান জলে নিশাইয়া ব্যবস্থা করিয়া থাকেন।

এথুজা সায়েনেপিয়াম্‌,-এথুজা

(ÆTHUSA CYNAPIUM,-ÆTHUSA-C.)

ইউরোপের প্রায় সমুদয় স্থানেই এই গাছ যথেষ্ট পরিমাণে জন্মিয়া থাকে। এই গাছের কাঁচা সমুদয় অংশই যথানিয়মে প্রক্‌ স্পিরিটে ভিজাইয়া মূল আরোক প্রস্তুত হইয়া থাকে।

সাধারণ ক্রিয়া। ইহা এক ভয়ানক মস্তিষ্ক অবসন্নকারক বিষ বিশেষ। ইহা প্রথমতঃ মস্তিষ্কের জ্ঞান উৎপাদনের সহায়কারী অংশকে আক্রমণ করে এবং মস্তিষ্ক দিয়া যুক্ত আক্রমণ করিয়া উহার কার্যের বৈলক্ষ্য্য উৎপাদন করে, যাহার দরুণ যুক্তের নিঃসরণ উৎপাদনের ব্যাধাত জন্মে এবং তদরুণ পিত জনিত নানা প্রকারের অস্থির হইয়া থাকে। যে প্রকার অস্থিরে, বিশেষতঃ শিশু এবং ছোট বালক

বালিকাগণের, হৃৎ সঙ্ঘ না হয় এবং হৃৎ উদরস্থ হওয়া মাত্রই গলা দিয়া উঠিয়া পড়ে, সে প্রকার অন্তর্বে এই ঔষধ বিশেষ উপকারী ।

সাধারণ প্রাকৃতিক লক্ষণ ।

মন । কোন বিষয়ে চিন্তা করাতে অশক্তি ; মনে গোলমালে বোধ (জেল্‌স্, ব্যাপ্ট্, নাক্স-বম্, পাল্‌স্, ফস্-আন্) ; মনের অত্যন্ত উদ্বেগ এবং অস্থিরতা (একন্, মার্ক্, আস্, রাস্-টক্স) এবং তৎপর মাথার ও উদরে অত্যন্ত বেদনা ; চিড়্ চিড়্, থিট্ থিট্ করা ; সর্বদা চটী ভাব (ব্রাই, ক্যাম্, নাক্স-বম্) ; প্রলাপ, সর্বদা প্রলাপের অবস্থায় বিভ্রাল কুকুর ইত্যাদি দেখা ; ঘরের জানালা দিয়া লাফাইয়া পড়ার চেষ্টা করা ।

মস্তক । মাথায় গোলমালে বোধ ; মস্তক যেন বাঁধিয়া রাখিয়াছে এরূপ অনুভূত হয় ; মাথাবোঁরা এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে ঘূমের ভাব বা ইচ্ছা ; মাথা সোজা ভাবে রাখিতে অশক্তি ; মাথার পশ্চাৎভাগ এবং ঘাড়ের অত্যন্ত কষ্টদায়ক বেদনা ; মনে হয় যেন মাথার পার্শ্ব কোন একটা কঠিন পদার্থের উপর লাগিয়া রহিয়াছে (মার্ক্) ।

চক্ষু । চক্ষুর তারি বিস্তৃত (এইলাছ্, বেল্, হায়োস্, ওপিয়াম্, ষ্ট্রামিন্) ; চক্ষে অত্যন্ত ভারিবোধ ; চক্ষু যেন উজ্জল এবং বহির্দিকে আকৃষ্ট (বেল্, হায়োস্, ষ্ট্রামিন্) ; গগুমালী জনিত চক্ষু প্রদাহ ; চক্ষুর পাতায় প্রোক্ত প্রদাহযুক্ত এবং রক্তিতে চক্ষুর পাতায় পাতায় লাগিয়া থাকা (আলাম্, ক্যাক্-কার্ক্, লাইকোপ্, মার্ক্, পাল্‌স্, সাইলিসি, সাল্‌ক্) ; চক্ষুর পাতায় উপাধি এবং চক্ষুর যোজক ঝকের মধ্যবর্তী মিবেমিয়ান্ নামক গ্রন্থির (Meibomian Glands) ক্ষীতি ।

মুখমণ্ডল । নাসারন্ধ্রের মধ্যবর্তী উপাধির ভ্রার অংশে কনিয়া ধরার ভ্রার বাতনা, যাহা ওষ্ঠের কোণ পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয় এবং যাহার দক্ষণ মুখমণ্ডল উদ্বেগ বা বাতনার চিহ্নযুক্ত বলিয়া দেখায় ।

মুখগহ্বর । জিহ্বা আর্দ্র ; মুখে বিরক্তি জনক তিক্তবাদ ; মুখ-গহ্বর এবং গলার মধ্যে ক্ষত ।

পাকস্থলী এবং উদর । পেটে হৃৎ সঙ্ঘ হয় না ; হৃৎ উদরস্থ

হইতে না হইতেই গলাদিয়া ঠেলিয়া উঠিয়া পড়ে এবং তৎপর দ্রুতগতির দক্ষণ বেন ঘুম পায় ; হৃৎপোষ্য শিশুর হৃৎ সঙ্ক হইয়া না ; প্রবল বমন হারা উদরস্থ হৃৎ দধির জ্বার (আইরিস্) বা পনিরের জ্বার পদার্থের আকারে উঠিয়া পড়ে ; পাকস্থলীতে এত প্রবল সঙ্কোচনের উদ্বেগ হয়, যে উহার দক্ষণ বমনের ব্যাঘাত জন্মে ; উদরোজ্জ্ব প্রদেশে বেদনা এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে বমনোদ্বেগ, উদরে(আস্থ্রা) এবং নিম্নাঙ্গে ঠাণ্ডাবোধ ; উদর ক্ষীত এবং বিস্তৃত (মার্ক্, চায়না) ; শূল বেদনা এবং তৎপর বমন, মাথাধোরা এবং দ্রুতগতি :

মল । উদরাময় ; মল উজ্জ্বল হরিদ্রাবর্ণ (চেলিডন্), অথবা সবুজের আভাযুক্ত জলবৎ তরল এবং চট্‌চটিয়া আঠা ও মলত্যাগের সময় অত্যন্ত কৌথপাড়া (মার্ক্) ; অনিবার্য্য কোষ্ঠবদ্ধ ।

শ্বাসযন্ত্র । শ্বাস প্রাথমী অত্যন্ত কষ্টদায়ক এবং ঘন ঘন ; বৃক্কের বাম পার্শ্বে স্থচীবিধানের জ্বার বেদনা বা যাতনা ।

হৃৎপিণ্ড এবং নাড়ী । হৃৎপিণ্ডের প্রবল স্পন্দন ; নাড়ী পূর্ণ এবং দ্রুতগামী ; নাড়ী কঠিন, ক্ষুদ্র এবং দ্রুতগামী ; নাড়ী অনিয়মিত গতি বিশিষ্ট এবং প্রায় অহতৃত হয় না ।

গ্রীবা এবং পৃষ্ঠদেশ । মাথার পশ্চাত্তাগ এবং ঘাড়ের অত্যন্ত কষ্টদায়ক বেদনা, যাহা মেরুদণ্ড পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয় ।

নিদ্রা । বমনের পর রোগীর (শিশু) নিদ্রাবেশ (আক্টি-টার্ট্) ; দান্তের পর রোগীর নিদ্রার ভাব (নাক্স-মক্) ; ঘুমাইয়া পড়ার পর চক্ষু খুরাপ বা চক্ষুর সামান্য আক্ষেপ ।

ব্যবহার । পিত্তাধিক্য এবং বিকারের অবস্থা ও উহার সঙ্গে সঙ্গে মস্তিষ্ক আক্রান্ত হওয়ার প্রাকৃতিক লক্ষণ ; পেটের অস্বস্তি ; গ্রীষ কালীর উদরাময় ইত্যাদি ; শিশুগণের দাঁত উঠার সময় আক্ষেপ এবং অজ্ঞাত অস্থখে এথুজা ব্যবহার্য্য ।

বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ । যুগীর জ্বার আক্ষেপ ; মুখমণ্ডল লাল বর্ণ ; চক্ষু নিম্নদিকে উল্টান ; চক্ষুর ভায়া বিস্তৃত, স্থিরভাবে বিশিষ্ট এবং অচল ; মুখে ফেণা উঠা ; দাঁত লাগা ; নাড়ী ক্ষুদ্র, কঠিন এবং দ্রুতগামী ; অত্যন্ত দ্রুতগতি, শিশু, বালক বালিকাগণ দাঁড়াইতে পারে না এবং মাথা

সোজা করিয়া রাখিতে পারে না; প্রাতে:কালে, রাত্ৰিতে, আহারের পর, বলা অবস্থা হইতে দাঁড়াইলে, স্তন্যদুগ্ধ পান করিলে এবং গভীর নিশ্বাস টানিলে অস্ত্রের বৃদ্ধি এবং বহির্বিদ্যুতে, নিত্রীর পর, পশ্চাত্তিকৈ বাকিলে, নড়া-চড়াতে অস্ত্রের উপশম ইত্যাদি এখুয়ার কতকগুলি বিশেষ প্রাকৃতিক নির্দিষ্ট লক্ষণ। গ্রীষ্মকালের অস্ত্রে এই ঔষধ বিশেষ উপকারী।

সমগুণবিশিষ্ট ঔষধ। বিধাত্ত কবার গুণ সম্বন্ধে এখুয়ার ক্রিয়া অনেকটা সিঁকুটা বিরোগা এবং ইনাছি ক্রোকেটীর ক্রিয়ার স্থায়। রোগ আরাম করার পক্ষে এখুয়ার কার্য অনেকটা সিষ্টাম, বোবিষ্টা, ক্রিমিষ্টাম্ এবং মাল্কারের কার্যের স্থায়। এতদ্বিন্ন কোন কোন বিষয়ের ইহার কার্যের সম্বন্ধ অণ্টিমোনিয়াম্, টাটারিকাম্, ক্যাকেরিয়া, কার্বোনিকা, কুপ্রাম্, নান্স, মফাটার কার্যের সাদৃশ্য আছে।

প্রতিষেধক ঔষধ। বমনের জন্ত বিনিগার (Vinegar), অথবা সাইট্রিক-আসিড্ (Citric acid)। যত পরিমাণ বিনিগার বা সাইট্রিক আসিড্ উহাতে তত পরিমাণ জল মিশাইয়া সেব্য। পায়ের পাতার রাইয়ের পলস্তরা (Mustard-plaster) এবং বর্ষণ। প্রদাহের লক্ষণ প্রকাশ পাইলে একোনাইট্ ব্যবহা।

ডাইলুশন বিচার। ষষ্ঠ ক্রমের আরোকই সচরাচর অধিক ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কোন কোন চিকিৎসক ১, ৩, ১২ এবং ৩০ ডাইলুশনও ব্যবহার করিয়া থাকেন।

আগনাস্ ক্যাস্টাস্,-আগ্নাস্

(AGNUS CASTUS,-AGN.-CAST.)

ভূমধ্য সাগরের তীরে এবং গ্রীষ্মদেশে এই গাছ জন্মে; বাগিচা স্থান এবং পাখরের নিম্ন প্রদেশে এই গাছ জন্মে। পাকা ফল তাজা থাকিতে, বা অল্প দিনের শুকনা ফল দ্বারা ২০° ডিগ্রী ওয়ার গ্রাফ্ স্পিরিটে ইহার মূল আরোক প্রস্তুত হইয়া থাকে।

সাধারণ ক্রিয়া । জননেত্রির উপর ইহার কার্য্য অতি অবলম্বনীয় । জননেত্রিকে উত্তেজিত না করিয়াই অবসন্ন করিয়া ফেলে এবং তৎকালে পুরুষের ধ্বজভঙ্গ ও জীলোকের বক্ষ্যাত্ত উৎপাদন করে । এই ক্ষণ পুরুষ কালে পুরুষের জীসহবাসের ইচ্ছা এবং জীলোকের পুরুষ সহবাসের ইচ্ছা নিবারণ করার জন্য এই ঔষধ প্রয়োগ্য হইত ।

সাধারণ প্রাকৃতিক লক্ষণ ।

মন । অত্যন্ত উদ্ভ্রমণকৃত ; রোগী কোন বিষয় পরপরার্থিতে পারে না (আনাকাৰ্ড, ক্রিয়াজ্, মার্ক্, নেট্রাম্‌মিউর, নাক্স-মক্, কন্‌-আল) ; হতাশ এবং বিমর্ষতা ; মানসিক অবসন্নতা ; মৃত্যু নিকটবর্তী বলিয়া ভর (একন্, আর্স্, সিমিদিঙ্ক্) ।

মস্তক । মাথায় ছিঁড়িয়া ফেলার ভায় বেদনা এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে কপাল এবং কর্ণের পক্ষাংভাগে চাপাবোধ, নড়াচড়াতে বাহা বৃদ্ধি পায় ।

কর্ণ । কানের মধ্যে সোঁ সোঁ শব্দ হওয়া ।

মুখমণ্ডল । বকের মধ্যে কত কারক চুলকানি ; ডাইন নিম্নবাহী নিম্নভাগে ছিঁড়িয়া ফেলার ভায় ভয়ানক বেদনা বা যাতনা ।

জননেত্রিয় । পুরুষের জীসহবাসের ইচ্ছার হ্রাস বা একবারে বিনাশ হয় (পাল্‌ফ্) ; পুরুষাদ্ এত শিথিল হয় যে জী সহবাসের ইচ্ছা সত্ত্বেও পুরুষাদ্ খাড়া হয় না (আগারিকান্, কোনারাম্) ; অণ্ডকোষ ঠাণ্ডা, ক্ষীত, কঠিন এবং বেদনায়ুক্ত হয় (একন্, কোনারাম্) ; পুরুষাদ্ ছোট এবং নরম বা শিথিল হয় (আর্জেন্ট্-নাইট্রাস্) ; পুরুষাদ্ কখন কখন সামান্য খাড়া হয় বটে, কিন্তু জী সহবাসের ইচ্ছা একবারেই থাকে না ; ধ্বজভঙ্গ এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে পুরাতন আকারের প্রেমহ রোগ (পাল্‌ফ্) ; স্তন্যনালী দিয়া চরিত্রাবর্ণের রক্ত নিঃসরণ (হাইড্রাই, পাল্‌ফ্) ; পুরাতন আকারের প্রেমহ রোগ, কিন্তু উহার সঙ্গে সঙ্গে জী সহবাসের ইচ্ছা থাকে না বা পুরুষাদ্ খাড়া হয় না ; মল ত্যাগের সময় কোঁথ পাড়িলে বাত্ নিঃসরণ (সাইলিস্) । জীলোকের স্বচ্ছ ষ্ঠতপ্রদর নিঃসরণ (আলগাম্) ; বোনি ছারদা অত্যন্ত শিথিল হয় ; স্তনে অতি সামান্য পরিমাণ দুগ্ধ থাকে, অথবা দুগ্ধ একবারেই থাকে না (একন্, পাল্‌ফ্) ।

অঙ্গ, প্রত্যঙ্গ, হাত, পা ইত্যাদি । বোগল এবং বাহ্যর উপরিভাগে অত্যন্ত চাপাবোধ, চাপিলে বা স্পর্শনে বাহার বৃদ্ধি হয় । ডাইন পায়ের পাতার ভাঙ্গি বোধ ; পায়ের অঙ্গুলের মাথার ছিঁড়িয়া ফেলার ভাঙ্গি বেদনা, চলিয়া বেড়াইলে বাহার বৃদ্ধি হয় ।

জ্বর । আভ্যন্তরিক শীতবোধ এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে সমুদয় শরীরের কাঁপনি ; চর্ম উষ্ণ ।

চর্ম । গা চুলকানি, চুলকাইলে বাহা সহজেই নিবৃত্ত হয় বটে, কিন্তু শীঘ্রই চুলকানি পুনরায় আরম্ভ হয় ।

ব্যবহার । স্ত্রী বা পুরুষ সহবাসে অত্যাচার হেতু অকালে বৃদ্ধাবস্থা প্রাপ্ত হওয়ার দরুণ মনের মালিন্য বা শুকবায়ু (Melancholia) ; সকল বিষয়েই বৈরাগ্য ; উন্মনস্কতা ; আপনার উপর ঘৃণা ; সার্বস্বতিক দুর্ভাগতা এবং বারম্বার ধাতু নিঃসরণ ; ধ্বংসভক্ত, বন্ধাত্ত, স্ত্রী বা পুরুষ সহবাসে অশক্তি ; প্রমেহরোগ ; পুরাতন আকারের প্রমেহ রোগ ; অণুকোষের কঠিনতা, যেত প্রদর, গোঁপে রক্তঃস্রাব আরম্ভ হওয়া বা রক্তঃরোধ ; জরায়ু হইতে অতিরিক্ত রক্তস্রাব ; সন্তান প্রসবের পর স্ত্রীলোকের স্তনে দুগ্ধের সঞ্চার না হওয়া ; বন্ধাত্ত ইত্যাদি অস্থখে আগ্নাস্ কাষ্টাস্ ব্যবহার্য্য ।

বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ । লিম্ফেটিক্ ধাতু (Lymphatic temperament) ; বারম্বার প্রমেহ রোগ দ্বারা আক্রান্ত হইয়া নানা প্রকারের অস্থখ হওয়া এই ঔষধের বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ ।

সম্মুখণ বিশিষ্ট ঔষধ । জননেদ্রিয়ার উপর এই ঔষধের কার্য্যের সঙ্গে ক্যাম্ফার, ক্যালী ব্রোমেটাম্, মুফস্ লুটিয়াম্ এবং ফফুরিক্ আসিডের কার্য্যের অনেক সাদৃশ্য আছে । এতদ্ভিন্ন কোন কোন বিষয়ে ইহার কার্য্যের সঙ্গে আগারিকাম্, লাইকোপডিয়াম্, ফফুরাস্, পাল্‌সেটিলা, সেলেনিয়াম্ এবং সাল্‌কারের কার্য্যের সাদৃশ্য আছে ।

প্রতিষেধক ঔষধ । ক্যাম্ফার, নেট্রাম্ মিউরিয়াটিকাম্ ।

ডাইলুশন বিচার । ইহার ৬ষ্ঠ ক্রমের আরো কই সচরাচর অধিক ব্যবহৃত হইয়া থাকে । আবার কোন কোন চিকিৎসকের মতে এই ঔষধের ১ম, ৩য়, ১২ এবং ৩০ ডাইলুশন ব্যবহারেও বিশেষ উপকার দর্শে ।

আমোনিয়াম কার্বোনিকাম,-কার্বোনেট্ অন্ আমোনিয়া,-আমন্-কার্ব্

(AMMONIUM CARBONICUM,-CARBONATE OF AMMONIA-
SMELLING SALTS,- AMMON. CARB.)

কোন এক বিষত হোমিওপ্যাথিক ঔষধালয় হইতে আদত কার্বোনেট্ অন্ আমোনিয়া ক্রয় করিয়া যথানিয়মে সুগার অন্ মিকের সহিত মিশাইয়া শুঁড়া প্রস্তুতের ব্যবস্থা কার্য্যাকোপিয়ান দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু এই ঔষধ শীঘ্র শীঘ্র উড়িয়া যায় বলিয়া ইহার শুঁড়া প্রস্তুত না করিয়া যথা নিয়মে চূরান জলের সহিত মিশাইয়া (১ গ্রেইন আমোনিয়া এবং ৯ কোঁটা চূরান জল) ইহার প্রথম দশমিক ক্রমের আরোক প্রস্তুত হইয়া থাকে। ইহাতে যথা নিয়মে ডাইলুট্ অল্ কোহল মিশাইয়া ২য় দশমিক ক্রমের আরোক প্রস্তুত হইয়া থাকে। ৩য় ও ততোধিক দশমিক ক্রমের আরোক যথা নিয়মে রেক্টিফাইড্ স্পিরিটে প্রস্তুত হইয়া থাকে।

সাধারণ ক্রিয়া। রক্তের উপর ইহার কার্য্য অত্যন্ত প্রবল। ইহা রক্তকে তরল করে এবং রক্তকণা বিনাশ করিয়া রক্তকে পচায়, বাহ্যিক দূষণ রক্তপ্রাব এবং অত্যন্ত অবসন্নতা উৎপন্ন হয়। পাংগ্লিয়োনিক্ স্নায়ু মণ্ডল (Ganglionic System of Nerves) দিয়া (মস্তিষ্ক আক্রমণ না করিয়া) হৃৎপিণ্ড এবং ধমনি সমূহের কার্য্যের কিঞ্চিৎ চাঞ্চল্য বৃদ্ধি করে এবং শরীরের প্রায় সমুদয় যন্ত্রেরই কার্য্যের চাঞ্চল্য বৃদ্ধি করিয়া থাকে। পাকস্থলী, অন্ত্র এবং শ্বাস যন্ত্রের শৈল্পিক ক্রিয়াকৌশলে রক্তাধিক্য বা রক্তাবরোধ হয় ও উহা অত্যন্ত প্রবলরূপে প্রদাহযুক্ত হয়। এই কার্য্যটি আমোনিয়াম একটী প্রবল স্থানিক কার্য্যের মধ্যে পরিগণিত।

সাধারণ প্রাকৃতিক লক্ষণ।

অন্ন। সমুদয় বিষয়ে অমনোযোগিতা এবং হুটু নিদ্রার ভাব; মানসিক অবসন্নতার ভাবপ্রকাশ করা; সর্বদা ভ্রম বা কাজ কর্ণ ভুলিয়া যাওয়া নিদ্রিতে এবং কথা বলিতে সর্বদা ভুল করা।

মস্তক । মধ্যাহ্নে আহারের পর কপালে ভারিবোধ এবং দপ্-
দপানি ; কপালে এবং মাথার উপরিভাগে অত্যন্ত কষ্টদায়ক পূর্ণবোধ,
যাহার দরুণ মনে হয় যেন মাথা ফাটিয়া যাইবে (একন্, ব্রাই, নেট্রাম্-
মিউর); মাথায় পাতলাবোধ ; রাত্রিতে এবং ঘুম ভাঙ্গিলে মস্তিকে রক্তাধিক্য
বা রক্তাবরোধ ; মুখমণ্ডলে উষ্ণানুভব ; কপালে দপ্-দপানি, চিড়িক মারা
এবং চাপা বোধ, যাহার দরুণ মনে হয় যেন কপাল ফাটিয়া যাইবে । এই
বেদনা আহারের পর, বহির্কায়ুতে চলিয়া বেড়াইলে বৃদ্ধি পায় ; প্রচাপনে
এবং উষ্ণ ঘরে উহার উপশম হয় ; মাথার অত্যন্ত চুলকানি ।

কর্ণ । কানে বজ্-বজ্ শব্দ হওয়া ।

নাসিকা । প্রাতঃকালে হাত মুখ ধোয়ার সময় নাক দিয়া রক্ত
পড়ে (একন্, বেল্, ব্রাই) ; নাক দিয়া উগ্র ক্ষতকারক তরল পদার্থ
নিগত হয় (আরাগিয়া, আর্স্, এরাম্, সিপা)-; নাক দিয়া জ্বালা উৎপাদক
জল পড়ে ; নাক বন্ধ হয়, বিশেষতঃ রাত্রিতে, যাহার দরুণ রোগী মুখ
দিয়া নিশ্বাস গ্রন্থাস ছাড়িতে বাধা হয় (নেট্রাম্, আর্স্, নাক্স-বম্) ; মাথা
হেট্ করিয়া উপুড় হইলে নাক দিয়া রক্ত বহিয়া পড়ে ।

মুখমণ্ডল । মানসিক পরিশ্রম করার সময় মুখমণ্ডলে উষ্ণানুভব ;
মধ্যাহ্নে আহারের সময় এবং উহার পর মুখমণ্ডলে উষ্ণানুভব ।

মুখগহ্বর এবং গলার মধ্য । সন্ধ্যার সময় বা প্রথম রাত্রিতে
বিছানার শয়ন করিলে (জীলোকের) দস্তশূল ; দাঁতে দাঁতে কানড়াইলে
দাঁতে বেদনার উদ্ভেদ হয় ; দাঁত যেন লম্বা হইয়াছে এরূপ অনুভূত হয় ;
(কার্কো-আনিমেল্, নাইট্রিক্-আস্, মার্ক্) ; জিহ্বায় কোঁকর জ্বার
কুহুড়ী ; মুখে অধিক পরিমাণে লালের সঞ্চার, যাহার দরুণ রোগী কমন
করিতে বাধা হয় ; সমুদ্র আহার দ্রব্যেই টক্ এবং ধাতুর স্বাদ । মদ্যপানে
যে রূপ হয়, গলার মধ্যে আহার বহা গলনালী পর্য্যন্ত জ্বালানুভব ; গলার মধ্যে
টাঁচিয়া ফেলার জ্বার এবং খণ্ড-খণ্ডে বোধ (কার্কো-বেজ্, কঠ্, কন্স, পাল্-স্,
কমেজ্) ; ডাইন টম্‌সিল্ (Tonsil) ক্ষীত হইলে যে রূপ হয়, গিলিবার
গলমধ গলার মধ্যে সেরূপ বেদনানুভব ; গলার মধ্যে দ্রব্‌দ্রব্‌ ক্ষত ; টন-
সিলে পচাযুক্ত ক্ষত (এইলাহ্, ব্যাপ্ট্, মিউর-আস্) ; ডিপ্‌থিরিয়া

(Diphtheria) ; নাক বন্ধ হইয়া থাকে, বাহ্যিক দৃশ্যে রোগী (শিশু) কাঁপড় হওয়ার উপক্রম হইয়া ঘুম হইতে হঠাৎ চমকিয়া কাদিয়া উঠে ।

পাকস্থলী এবং উদর । আহারের পর এবং রাত্রিতে পাকস্থলীতে চাপাবোধ ; চাপিলে পাকস্থলীতে বেদনামুভব ; অত্যন্ত ক্ষুধা এবং আহার দ্রব্যে রুচি থাকে বটে, কিন্তু সামান্য আহার দ্রব্যাদি উদরস্থ হইলেই যেন ক্ষুধার নিবৃত্তি হয় ; কাঠ উলগার বা অসম্পূর্ণ উলগার উঠা ; পাকস্থলীতে পূর্ণবোধ ; পাকস্থলীর কস্পন ; পাকস্থলীতে উষ্ণমুভব, যাহা অস্ত্রের মধ্য দিয়া বিস্তৃত হয় । সন্ধ্যার সময় বাম কুঁচকিতে হাতের পাঞ্জার দ্বারা স্থিতিস্থাপক স্থিতি ; বাম কুঁচকি প্রদেশে মোচড়াইয়া পড়া বা ধোঁতুলিয়া যাওয়ার দ্বারা বেদনা, বাহ্যিক দৃশ্যে বাম পার্শ্বে শয়ন-করিতে কষ্টানুভূত হয় ; চলিলে কুঁচকির স্থিতি এবং বেদনাদি চলিয়া যায় ।

মল এবং মলদ্বার । গুহদ্বারে অর্শের বলী ; গুহ দ্বারে চুলকানি ; তরল ভেস এবং দান্তের পূর্বে ও উহার পর উদরে কর্তনবৎ বেদনা ; দান্তের সময় এবং উহার পর গুহদ্বার দিয়া রক্তগড়া ; মল একবার গুহদ্বার হইতে বাহির হইয়া পুনরায় গুহের মধ্যে প্রবিষ্ট হয় এবং তৎপর কোমল মল নির্গত হয় ।

মূত্রযন্ত্র । প্রস্রাবের সময় অত্যন্ত কৌণপাড়া ; বুকের অবস্থান অসাড়ে বা অনিচ্ছা পূর্বক মুহুতাগ ।

জননেদ্রিয় । জীলোকের বোনির স্থিতি এবং উহাতে চুলকানি ও জ্বালামুভব (আর্স্, ক্যাঙ্ক্, জিরাজ্, মার্ক্, সাল্ফ্) ; নিয়মিত সময়ের অনেক পূর্বে এবং অতিরিক্ত পরিমাণে রক্তস্রাব (অ্যালোজ্, ক্যাঙ্ক-কার্ক্, নাজ্-বম্) ; রক্তস্রাব আরম্ভ হওয়ার সময় ওলাউঠার প্রায় সমুদয় লক্ষণ প্রকাশ পায় ; কাল্চে চাপ চাপ, থানা থানা, রক্তস্রাব (ক্রোকাশ্, সাই-রেনেন্, ইপ্নেনস্, প্লাটিনা), উগ্র ক্ষতকারক রক্তস্রাব, যাহা লাগিয়া উরুদেশে ক্ষত হয় (সাল্ফ্) ; সমুদয় শরীরেই ক্রান্তি বোধ (কার্বো আনিমেস্, ককিউল্) ; উরুদেশেই ক্রান্তি অধিক অনুভূত হয় এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে বারবার হাঁইতোলা, দন্তশূল, কোমরের পশ্চাৎদেশে বেদনা এবং শীতবোধ ।

শ্বাসযন্ত্র । অত্যন্ত শ্বাসকষ্ট, বিশেষতঃ নিম্নস্থান হইতে উঠিলে

স্থানে উঠিতে (একন্, আর্স্, ক্যাক্ট্, ক্যাক্স-কার্ক্) ; কোন রোগের জেগ কালীন বাগরোধ হওয়ার উপক্রম হওয়া ; গলার মধ্যে ধূনার কণা প্রবিষ্ট হইলে যেৰূপ হয়, রাস্তিতে সেরূপ শুককাশি ; প্রতিদিন শেষ রাস্তি ৩ বা ৪টার সময় প্রবল কাশি (ড্রিসিরা, ক্যালী-ক্লোরৈট্) ; বায়ুনের উপরি ভাগে উত্তেজনা হেতু হাঁপানির জায় অল্পকাল স্থায়ী কাশি এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে বুকের কষ্টদায়ক আক্কেপিক সঙ্কোচন ; কাশি এবং গলা দিয়া রক্তমিশ্রিত স্লেমা নির্গমন ; বুকের মধ্যে ভারি বোধ ; মাথা হেট করিয়া উপযুক্ত হইলে বুকের ডাইন পার্শ্বে স্থলী বিধানের জায় বেদনা বা যাতনা ।

হৃৎপিণ্ড । হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন শব্দ শুনা যায় এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে মনের এত উত্তেজ হয়, যে উহার দ্রুত রোগী মনে করে যেন সে শীঘ্রই মরিবে ; শীতল ঘর্ষ ; রোগী কথা বলিতে পারে না ; নিশ্বাস প্রবান উচ্চ শব্দ বিশিষ্ট এবং অত্যন্ত কষ্টকর ও হাতের কম্পন ।

অঙ্গ, প্রত্যঙ্গ, হাত, পা ইত্যাদি । ডাইন বাহুতে ঝিল ধরা, বাহার দ্রুত হাত পৃষ্ঠদেশ পানে আকৃষ্ট হয় ; ডাইন বাহুতে ভারি বোধ এবং উহার শক্তিহীনতা ; হাতের আঙ্গুলের প্রদাহ, আঙ্গুল হাড়া (Whitlow) ; পায়ের অস্থিরতা ; পায়ের পাতা, বিশেষতঃ বিছানায় শয়ন করিলে, ঠাণ্ডা হয় ; পায়ের বুড়োঙ্গুলী লালবর্ণ, ক্ষীত এবং বেদনাযুক্ত হয়, বিশেষতঃ সন্ধ্যার সময় বা প্রথম রাস্তিতে বিছানায় শয়ন করিলে এবং পায়ের পাতা ক্ষীত ।

চর্ম্ম । শরীরের প্রবল চুলকানি, কিন্তু চুলকাইলে গায় কোড়ার জায় জালাযুক্ত ফুসুড়ী প্রকাশ পায় ; শরীরের উর্দ্ধাংশ আরক্ত জ্বরের ফুসুড়ীর জায় লালবর্ণ হয় (বেল) ; গায় মরাচাম বা মরা মাস উঠে ।

নিদ্রা । ঘুমেরঘোরে বারবার সঙ্কোরে চমকিয়া উঠা এবং তৎপর অত্যন্ত ভয় (একন্, আর্স্, বেগ্, জাই, হারোস্) ; প্রতি রাস্তিতেই বোবার ধরা (Night-mare) ; অত্যন্ত ঘুমের ভাব এবং রক্ত যেন অত্যন্ত গরম হইয়া যায় ।

জ্বর । অপরাক্ত বা সন্ধ্যার সময় শীতবোধ ; প্রতিদিন প্রাতঃকালে ঘর্ষ ।

ব্যবহার । সাংঘাতিক আরক্ত-জ্বর এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে নিদ্রাবেশ ; গলার মধ্যে কাল্‌চে লালবর্ণ বা পচাযুক্ত কত ; কর্ণমূলস্থিত গ্রন্থির প্রদাহ ;

গলায় বহির্দেহ ক্ষীত ; নিশ্বাস প্রস্থানে গৌঁ গৌঁ, স্বচ্ছ স্বচ্ছ শব্দ হওয়া ; অসাড়তা
ভেদ এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে অভ্যন্ত প্রবল বমন ; শরীর লালবর্ণ এবং পাশ
হামের দ্বারা লালবর্ণ বা অসম্পূর্ণ বিকর্ণ প্রাপ্ত কুসুড়ী ; মস্তিষ্কের পক্ষাঘাত
হওয়ার আশঙ্কা ; বৃদ্ধবয়সে বিসর্প বা ইরিসিপেলাস্ (Erysipelas) এবং উহার
সঙ্গে সঙ্গে মস্তিষ্ক আক্রান্ত হওয়ার লক্ষণাদি প্রকাশ পায় ; সার্বজনিক
হৃৎসলতা এবং সমুদয় শরীরে বেদনা ; ক্ষত পচিবীর উপক্রম হইতে ; সর্দী ;
এম্ফিসিমা (Emphysema) ; বায়ুনল প্রবাহ (Bronchitis) ; হীপানি
কাশি ; বক্ষশোথ ; হৃৎস্নায়ুশূল বা হৃৎবেদনা (Angina Pectoris) ; হিষ্টিরিয়া
জনিত অস্থখ ; প্রচুর রক্তঃস্রাব ; কষ্টকর রক্তঃস্রাব এবং বাধকের বেদনা
(Painful Menstruation) ; ষ্ঠেত প্রদর ; মুখে ঘা ; আঙ্গুলহাড় (Whitlow) ;
মস্তিষ্কের কোমলতা ; কীটাদির কামড়ের দরুণ অস্থখ ইত্যাদিতে আমো-
নিয়াম্ কার্বোমিকাম্ ব্যবহার্য্য ।

বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ । সমুদয় দিবস ক্লান্তি এবং প্রান্তিবোধ ;
বহির্কায়ু একবারেই সহ হয় না (ককিউলাস্, সিপিগা, সাইলিসি) ; শরীরের
ডাইন পার্শ্ব বাম পার্শ্ব অপেক্ষা অধিক আক্রান্ত হয় ; স্নান করা বা
বহির্কায়ুতে বাহির হওয়াতে অনিচ্ছা ; আক্রান্ত অংশ পচিবীর উপক্রম
হওয়া ; প্রাতঃকালে, সন্ধ্যার সময় এবং রাত্রিতে, আহারের সময় এবং
রাত্রিতে, আহারের সময় এবং উহার পর ; নিম্নস্থান হইতে উচ্চ স্থানে
উঠিতে, মাথা হেট করিয়া উপুড় হইলে, বহির্কায়ুতে, বড় বৃষ্টিতে, বিশ্রামে
অস্থখের বৃদ্ধি (ডাক্, রোডডেগুন, রাস্টল্) এবং উষ্ণ, শুষ্ক বাতাসে,
ঘরের মধ্যে এবং প্রচাপনে অস্থখের উৎপন্ন ইত্যাদি এই ঔষধের কতকগুলি
বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ । হৃৎসল চোপ্সা শরীর এবং স্নায়বিক বাত্ব বিশিষ্ট
কম জীলোক, গণ্ডমালা বাত্ববিশিষ্ট শিশু বা বালক বালিকা, বৃদ্ধ বয়সের
পক্ষে এই ঔষধ বিশেষ উপকারী ।

সমগুণবিশিষ্ট ঔষধ । এই ঔষধের কার্য্যের সঙ্গে এপিদ্,
আণিকা, আমোনিয়াম্ মিউরিয়াটিকাম্, বেলাডোনা, ক্যান্ডার, ক্যালী
ক্লোরেটাম্, ল্যাকেসিস্, কার্বো বেজিটেবিলিস্, হিপার সাল্ফিউরিস্,
ফফরাস্ এ বং পাল্ সেটিলার কার্য্যের সাদৃশ্য আছে

প্রতিষেধক ঔষধ । আণিকা, ক্যান্ডার, হিণার সাল্‌ফিউরিন্‌।
অধিক মাত্রায় বিষাক্ত হইলে বেজিটেবেল্‌ অসিড্‌স্‌ (Vegetable acids).
রেফ্লি়র তৈল (Castor oil), লিন্‌সি়র তৈল (Linseed Oil), বাদামের তৈল
(Almond Oil) এবং জলপাইয়ের তৈল (Olive oil) ব্যবহৃত ।

ডাইলুশন বিচার । ১ম, ৩য়, ৬ষ্ঠ ক্রমই সচরাচর অধিক ব্যবহৃত
হইয়া থাকে । আবার কোন কোন চিকিৎসক ১২ এবং ৩০ ডাইলুশনও
ব্যবহার করিয়া থাকেন ।

আমোনিয়াম্‌ মিউরিয়াটিকাম্‌, - আমোনিয়াম্‌ ক্লোরাইড্‌, - আমন্-মিউর

(AMMONIUM MURIATICUM, -AMMONIC CHLORIDE-AMMON.-MUR.)

কোন এক বিষাক্ত হোমিওপ্যাথিক ঔষধালয় হইতে আদত আমোনিয়াম্‌
মিউরিয়াটিকাম্‌ ক্রয় করা উচিত । ইহার ক্রয় দুই প্রকারে প্রস্তুত হইয়া
থাকে । যথা, — শুঁড়া এবং আরোক । যথা নিয়মে সুগার অব্‌ মিঙ্কেল
সঙ্গে মিশাইয়া ১ম দশমিক এবং ততোধিক ক্রমের শুঁড়া প্রস্তুত হইয়া
থাকে । যথা নিয়মে চুয়ান্‌ জলে মিশাইয়া ইহার ১ম দশমিক ক্রমের আরোক
প্রস্তুত হইয়া থাকে । ২য় এবং ততোধিক ক্রমের আরোক যথানিয়মে রক্টি-
ফাইড্‌ স্পিরিটে প্রস্তুত হইয়া থাকে ।

সাধারণ ক্রিয়া । ইহা রক্তের ঘন পদার্থের হ্রাস এবং গ্রন্থির
নিঃসরণ বৃদ্ধি করে, বাহ্যিক দ্রবণ রক্তের ফাইব্রিন্‌ নামক পদার্থ শোধিত
করে । ইহা ইউরিয়ার (Urea) বহির্গমন বৃদ্ধি করে । শৈল্পিক বিলীর উপর
ইহার কার্য অতি প্রবল । ইহা শৈল্পিক বিলীর নিঃসরণ অত্যন্ত বৃদ্ধি করে ।

সাধারণ প্রাকৃতিক লক্ষণ ।

মন । সর্বদা বিপদের আশঙ্কা করা এবং বিষমভাবে থাকা ;
কাঁদিবার ইচ্ছা ।

মস্তক । মাথাঘোরা এবং মাথার পূর্ণবোধ, বাহার দরুণ মাথার ভারিবোধ হয় ।

চক্ষু । চক্ষুর সম্মুখে যেন কোন এক ব্যক্তি দাঁড়াইয়া রহিয়াছে এরূপ অস্বভূত হয়, বাহার দরুণ স্পষ্ট দেখিবার ব্যাঘাত জন্মে; চক্ষুর সম্মুখে বেশ হরিজ্বা বর্ণের দাগ ভাসে ।

নাসিকা । সর্দি এবং তদ্রুপ নাসারক্ক রুদ্ধ হওয়া; নাক অত্যন্ত জ্বালা করে এবং টাটার 'বা বেদনায়ুক্ত হয় ও আত্মাণ শক্তি থাকে না । নাকদিয়া তরল ক্ষত কারক স্লেমা নির্গমন, বাহা লাগিয়া উপরের ওষ্ঠে অবধি ক্ষত হয় (আর্স্, সিপা, মার্ক্-কর) ।

মুখগহ্বর এবং গলারমধ্য । জিহ্বার অগ্রভাগে ফোকার জ্বাৰ ফুৰুড়ী এবং তদ্রুপ উহাতে জ্বালাযুক্ত বেদনা (আর্স্, মার্ক্-কর); গলার মধ্যে ক্ষত এবং বেদনা ও উহাতে এত কঠিন স্লেমার সঞ্চায় হয় যে গলার থেকুর দিলে বা সজোরে কাশিলেও উহা নির্গত হয় না (আলান্, বোরাক্স্, ক্যালী-বাই); গিলিবার সময় গলার মধ্যে হুচীবিধানের জ্বাৰ অস্বভূত হয় ।

পাকস্থলী এবং উদর । পাকস্থলীতে খালি খালি বা ক্ষুধা বোধ; হিকা; উল্গার উঠা; বমনোদ্বেষ; মুখ দিয়া জল উঠা । নাভি প্রদেৰ্শে কামড়াণীর জ্বাৰ বেদনা; তলপেটে ভারিবোধ, বাহার দরুণ মনে হয় যেন ঐ স্থানে একটি বোঝা চাপাইয়া রাখিয়াছে এবং তদ্রুপ মনের অত্যন্ত উদ্বেষ ও মনে হয় যেন উদর ফাটিয়া যাইবে ও বাহা ঘূমের পর লারিয়া যায় ।

মল এবং মলদ্বার । মলত্যাগের সময় এবং উহার অনেককাল পর পর্য্যন্ত গুহে জ্বালাহুতব (আলোক্, আর্স্, সাল্ক্); গুহে জ্বালা ও টাটানিযুক্ত চুলকানি; গুহের এক পার্শ্বে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্রণের জ্বাৰ ফুৰুড়ী প্রকাশ পায়; কোষ্ঠধক্ক; মল কঠিন ও নির্গত হইলে ভাঙ্গিয়া খণ্ড খণ্ড হয় (নেট্রাম্-মিউর) এবং বাহা অতি কষ্টে বহির্গত হয়; সবুজ বর্ণের চট্-চট্টরা আঠা তরলভেদ (আর্স্, মার্ক্); মলে কাচের জ্বাৰ সাধা চক্চকিয়া কঠিন স্লেমা থাকে (কষ্ট) ।

মূত্রযন্ত্র । রাত্রিতে বারবার প্রচুর পরিমাণে মূত্রত্যাগ (আঁচু, কস, আম) ।

জননেন্দ্রিয় । জীলোকের নিম্নমিত সময়ের অনেক পূর্বে রজঃ-
স্রাব এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে পেট ও কোমরের পশ্চাৎদেশে বেদনা
বাহ্য রাত্রিতেও থাকে এবং যখন রজঃস্রাব অপেক্ষাকৃত অধিক পরিমাণে
হয়; রজঃস্রাবের সময় শুষ্কতার দিয়া রক্ত নির্গমন; ডিমের লাগের জায়
যেত প্রদর নিঃসরণ (বোরাক্স, বোবিট্টা, ক্যাক্স-ফস, মেলিট্রিয়াম); প্রস্রা-
বের পর কটাবর্ণের চট্‌চট্টা আঠা বাতনাহীন শ্বেতপ্রদর নিঃসরণ ।

শ্বাসযন্ত্র । শ্বসন এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে বায়ুনের উপরিভাগে
আলাহুতব এবং উহাতে স্ফুস্ফুদীর দরুণ শুক কাশি; রাত্রিতে চীত হইয়া
শয়ন করিলে কাশি; আহারে, ঠাণ্ডা কোন দ্রব্য পান করিলে এবং শয়ন
করিলে কাশির বৃদ্ধি; আহার দ্রব্য বৃকে বাঁধিয়া থাকিলে বেকরণ হয়, বৃকের
মধ্যে সেকরূপ চাপাবোধ এবং সূচী বিধানের জায় বেদনা বা বাতনা; বৃকের
মধ্যে কোন কোন স্থানে আলাবোধ ।

পৃষ্ঠদেশ । ষাড় অত্যন্ত শক্ত হয় বা উহা নোয়ান যায় না (একন,
আগারিকাশ); কোমরের পশ্চাৎভাগ শক্ত হয় বা উহা নোয়ান যায় না;
হাত, পা এবং কটিদেশে বেদনা; শুষ্ক হারের ঠিক উপরিভাগে খেঁতলিয়া
বাঁড়িয়া বা মোচড়াইয়া পড়ার জায় বেদনা; পৃষ্ঠদেশে, বিশেষতঃ হুই স্বন্ধের
বধ্যবর্তী স্থানে, ঠাণ্ডাবোধ ।

অঙ্গ, প্রত্যঙ্গ, হাত, পা ইত্যাদি । অঙ্গাঙ্গ হইলে বেকরণ হয়,
হাতে সেকরূপ ভারিবোধ । বাম উরুর সন্ধিতে বেদনা, বাহ্য দরুণ মনে হয়
যেন উরুর পেশীর অগ্রভাগ গুলি খাট হইয়াছে এবং বাহ্য দরুণ রোগী
বোঁড়ার জায় চলিতে বাধ্য হয়; বসিয়া থাকার অবস্থায় পা ইত্যাদির হাতে
চর্জনবৎ বেদনা; বসিলে বা শয়ন করিয়া থাকিলে পা যেন কসিয়া ধরে;
চলিবার সময় পায়ের ডিমের পেশীগুলি যেন কসিয়া ধরে (আন্টি-ট্যাট্‌);
পেশীগুলি খাট হইলে বেকরণ হয়, সন্ধিতে সেকরূপ কসিয়া ধরার জায় অনুভূত
হয়; খেঁতলিয়া গেলে বা মোচড়াইয়া পড়িলে বেকরণ হয়, কুঁচকিতে সেরূপ
বেদনা হওয়ার দরুণ সোজা হইয়া চলিতে অশক্তি ।

জ্বর । সন্ধার সময় শয়ন করার পর যতবার ঘুম ভাঙে ততবারই শীতবোধ, কিন্তু পিপাসা থাকে না ।

চর্ম । শরীরের প্রায় সমুদয় অংশেই চুলকানি, সাধারণতঃ সন্ধার সময় বা প্রথম রাত্রিতে শয়ন করিলেই বাহার অধিক উদ্বেক হয় এবং তৎপর সারিয়া যায় ।

ব্যবহার । শরীরের সমুদয় অংশেব শৈল্পিক বা শ্লেষ্মা সম্বলিত রোগ ; যক্ষাক্রান্তি ; সায়েটিক স্নায়ুশূল (Sciatica) ; সন্নিহিত বা পালঙ্কজ্বর ; বসন্তরোগ ইত্যাদি অস্থিতে আমোনিয়াম মিউরিয়াটিকাম ব্যবহার্য্য ।

বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ । যে সকল রোগী মোটা, চোপ্‌সা এবং চল্‌চলে পেশী বিশিষ্ট এবং বাহ্যাদিগের পা শীর্ণ বা সরু, তাহাদিগের পক্ষে এই ঔষধ বিশেষ উপযোগী । ডাক্তার গারেন্সি (Dr. Guerenzy) বলেন যে, পায়ের সঙ্কোচনের ভ্রায় অস্থিত হওয়া বা বাস্তবিক সঙ্কোচন এবং জীলো-কের রক্তস্রাবের সময় মলত্যাগের সময় গুরুদ্বার দিয়া রক্ত পড়া আমোনিয়াম মিউরিয়াটিকামের বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ ।

সম্মুখ বিশিষ্ট ঔষধ । শৈল্পিক স্নায়ুর উপর আমোনিয়াম মিউরিয়াটিকামের কার্যের সঙ্গে আন্টিমোনিয়াম ক্রুডাম্ এবং পাল্‌মেটিনার কার্যের বিশেষ সাদৃশ্য আছে । এতদ্ভিন্ন ইহার কার্যের সঙ্গে আমোনিয়াম কার্ক, আর্সিনিক, আর্জেন্টাম্ নাইট্রাশ্, কষ্টিকাম্, ক্যালী-কার্ক, নেট্রাম্ মিউরিয়াটিকাম্, বেলাডোনা, হিপার সাল্‌ফিউরিম্, ফস্‌ফরাস্, সাইলিসিয়া এবং সাল্‌ফারের কার্যের সাদৃশ্য আছে ।

প্রতিষেধক ঔষধ । ক্যাফার, ককিয়া, হিপার সাল্‌ফিউরিম্, নাক্স-বমিকা, বিটার আমণ্ডস্ (Bitter Almonds) । অধিক মাত্রায় আমোনিয়াম মিউরিয়াটিকাম্ দ্বারা বিষাক্ত হইলে বিনিগার (Vinegar) অথবা বেজিটেবল্‌ আসিডস্ (Vegetable Acids) ব্যবহার্য্য ।

ডাইলুশন বিচার । ৩৪ এবং ৬ষ্ঠ ক্রমের আরোকই সচরাচর ব্যবহৃত হইয়া থাকে ।

আপোসিনাম্ ক্যানেবিনাম্,-আপোস্-ক্যান্

(APOCYNUM CANNABINUM,-APOC.-CAN.)

ক্যানেডা এবং ইউনাইটেড্ স্টেটসে এই গাছ জন্মে। কাঁচা শিকড় ষণানিয়মে প্রক্ স্পিরিটে ভিজাইয়া ইহার মূল আরোক প্রস্তুত হইয়া থাকে।

সাধারণ ক্রিয়া। মূত্রকোষ, চৰ্ম্ম এবং মাস্তক ঝিল্লীর (Serous-membranes) উপর ইহার কার্য্য অতি প্রবল, বাহার দরুণ শরীরে নানা প্রকারের শোথ সম্বলিত অল্পখ উৎপন্ন হয়। পরিপাক সম্বন্ধীয় যন্ত্রের শৈল্পিক ঝিল্লীর উপরও ইহার কার্য্য দেখিতে পাওয়া যায়, বাহার দরুণ উক্ত যন্ত্রাদির নিঃসরণের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়।

সাধারণ প্রাকৃতিক লক্ষণ

মন। মন যেন এলোমেলো হইয়া যায়; স্বাভাবিক এবং অবসর ভাব (লাইকোপ্, নেট্রাম্-মিউর, পাল্‌স্)।

মস্তক। মস্তিষ্কের শোথ; অজ্ঞানবৃত্তি (Stupor); এক চক্ষুর দেখিবার শক্তি একবারে বিনষ্ট হয় এবং অপর চক্ষুর দেখিবার শক্তি থাকে; অনবরত একধানি হাত এবং একধানি পায়ের সঞ্চালন; কপাল যেন উঁচু হয় বা ফুলিয়া উঠে; মাথার হাড়ের জোড় যেন খোলা থাকে; মস্তিকে দ্রুত জলীয় পদার্থের সঞ্চার।

পাকস্থলী এবং উদর। পিপাসা, কিন্তু জল সহ হয় না, কারণ, জল পান করিলেই পেটে বেদনা হব, অথবা গলা দিয়া জল উঠিয়া পড়ে (আস্); পাকস্থলীর মধ্যে অভ্যস্ত খালিবোধ বা পেটে পিঠে লাগিয়া যাওয়া (হাইড্রাট্, টগ্‌মেস্, পাল্‌স্, সিলিয়া); মধ্যে মধ্যে নির্দিষ্ট সময় অন্তর অভ্যস্ত কষ্টদায়ক বমন; পাকস্থলীর অভ্যস্ত উত্তেজনা এবং বমন। উদরী (Ascites); উদর ক্ষীণ, বিস্তৃত এবং বেদনায়ুক্ত হয় (আস্, বাক্)।

মল। অতি অল্প পরিমাণে মলত্যাগ।

মূত্রযন্ত্র। অতি অল্প পরিমাণে মূত্র ত্যাগ, বাহার দরুণ কোনও অল্প অম্লভূত হয় না; প্রচুর পরিমাণে ফিকা রঙ্গবিশিষ্ট মূত্রত্যাগ; মূত্রে কোন তলানি থাকে না (এপিস্, আর্জেন্ট্-নাইট্রিক্)।

জনেন্দ্রিয় । যুবতী বালিকাসমূহের গোণে প্রথম রজঃস্রাব বা রজঃরোধ; উদর এবং পা শোথের ভাষা স্বীত; ক্রমগত বা মধ্যে মধ্যে অতিরিক্ত রজঃস্রাব; তরল বা চূর্ণ চীপ, খান খান রজঃস্রাব; বমনোন্মেষ, বমন, হৃৎস্পন্দন; নাড়ী দ্রুতগামী, এবং নড়িলে দুর্বল হয়; হালিশ হইতে মাথা উঠাইলে বা মাথা খাড়া করিলে মুছার ভাব।

শ্বাস যন্ত্র । কণ্ঠস্থ গুরুকাশি; তরল কাশি এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে বুকের মধ্যে ঘড়্ ঘড়্ শব্দ হওয়া এবং বুকের মধ্যে অত্যন্ত কষ্টাহতব; উদরোদ্ধ প্রদেশ এবং বুকে অত্যন্ত কষ্টাহতব (অন্টি-টাট্, আন্); শ্বাস প্রশ্বাস কষ্টকর এবং উহা দ্বারা মনের তুষ্টি হয় না।

ব্যবহার । স্ববিবোধপন্ন বা অল্প কোন প্রকারের রোগ অনিত্য সর্বপ্রকারের শোথ; উদরো, সার্বাস্থিক শোথ এবং রক্তশোথ; অতিরিক্ত রজঃস্রাব; সর্দিলাগা এবং উহার দরুণ নাক বন্ধ হওয়া; অজীর্ণ রোগ, বাহার দরুণ আহারের পর পেট ঠোশ মারিয়া থাকে এবং কখন কখন পেটে পিটে লাগিয়া যায়; উদরামর ইত্যাদি অল্পে আপোসিনাম্ ব্যবহার্য্য।

বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ । ঘর্ম্ম এবং মূত্রের সঞ্চয় ও নিঃসরণ বন্ধ হওয়া; সার্বাস্থিক দুর্বলতা এবং অস্থিরতা; আহারের পর পেট ঠোশ মারিয়া থাকা ইত্যাদি আপোসিনাম্ ক্যানেবিনামের কতকগুলি বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ।

সমগুণবিশিষ্ট ঔষধ । আপোসিনামের কার্যের সঙ্গে এপিদ্ মেলিকিকা এবং হোলবোরাসের কার্যের বিশেষ সাদৃশ্য আছে। এতদ্বারা কোন কোন বিষয়ে ইহার কার্যের সঙ্গে আসিটিক্ আসিড্, আসিনিক্, ক্রাইওনিয়া, বেলাডোনা, কলচিকাম্, ডিজিটালিস্, ক্যাণী-কার্ক্ এবং বিরেট্রাম্ আদ্যামের কার্যের সাদৃশ্য আছে।

ডাইলুশন বিচার । এই ঔষধের মূল আরোক ১ হইতে ৫ ফোঁটা পর্যন্ত এক মাত্রায় ব্যবহৃত হইয়া থাকে। উদরী রোগাক্রান্ত কোন একটী রোগীর চিকিৎসার মূল আরোক ১০ ফোঁটা মাত্রায় ব্যবস্থা করিয়া লেখক আশাতিরিক্ত ফল পাইয়াছেন। ইহার মিশ্র আরোক ব্যবহার করিয়া বিশেষ ফল পাওয়া যায় না আপন রোগ চিকিৎসার ফল দেখিয়া লেখক একগু

স্থির করিয়াছেন । এই ঔষধের মিশ্র আরোক ব্যবহার করিয়া ক্লিষ্ট কল পাওয়া যায় তাহা পাঠকগণ পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারেন । কোন কোন চিকিৎসক এই ঔষধের কাঁচা শিকড় ১ ছটাক, দেড়শের জলে সিদ্ধ করিয়া উহার ২০। ৩০ ফোঁটা মাত্রায় ব্যবস্থা করিয়া থাকেন ।

আর্জেন্টাম্ মেটেলিকাম্,-আর্জেন্ট্,-মেট্

(ARGENTUM METALLICUM,-ARG.-MET.)

কোন এক বিশ্বস্ত হোমিওপ্যাথিক ঔষধালয় হইতে আদিত আর্জেন্টাম্ মেটেলিকাম্ ক্রয় করিয়া যথা নিয়মে স্ফূটার অব্ মিক্সের সঙ্গে মিশাইয়া ৩য় শততমিক ক্রম পর্য্যন্ত গুঁড়া প্রস্তুত হইয়া থাকে । ৩য় শততমিক ক্রমের গুঁড়া হইতে ৪র্থ শততমিক ক্রমের আরোক প্রস্তুত হইয়া থাকে ।

সাধারণ ক্রিয়া । সন্ধি, অস্থি, উপাস্থি ও সন্ধির লিগামেন্টের (Ligaments) উপর ইহার বিশেষ কার্য্য দেখিতে পাওয়া যায় । ইউষ্টেকিয়ান্ টিউব (Eustachian Tube), নাসিকা, কৃত্রিম পঞ্জরার হাড়, পায়ের পাতার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হাড়ের উপরও ইহার কার্য্য দেখিতে পাওয়া যায় । গ্রন্থি বিশিষ্ট বস্ত্র এবং স্ফংপিণ্ডের উপরও ইহার কার্য্য আছে ।

সাধারণ প্রাকৃতিক লক্ষণ ।

মন । মনের অতিরিক্ত উল্লাস এবং সমুদয় দিন কথা বলিবার স্বভাব ।

মস্তক । হঠাৎ মাথাঘোরে এবং মনে হয় যেন চক্ষুর সম্মুখে কুয়াশা রহিয়াছে ; মদ্যপান করিলে সেরূপ হয়, মাথায় সেরূপ হামা দেওয়ার জায় অল্পভূত হয় এবং মাথা টলে ; মাথায় চাপিয়া ধরার জায় বেদনা এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে কপালে চিমাবোধ এবং মাথার পশ্চাৎদেশে কসিয়া ধরার জায় চাপাবোধ ; কর্ণের পশ্চাৎভাগের হাড় চাপিয়া ধরা বা ছিঁড়িয়া ফেলার জায় বেদনা, স্পর্শনে বাহার বৃদ্ধি হয় ।

চক্ষু । চক্ষুর পাতার প্রান্ত ক্ষীত, লালবর্ণ এবং পুরু (আন্টি-ক্লড্, গ্রাফ্, লাইকোপ্, মার্ক্) ; চক্ষুর পাতা এবং কোণের ভরানক চুলকানি (সাল্ক্) ।

কর্ণ । কানের উপরিভাগের ভরানক ক্ষতকারক চুলকানি ।

নাসিকা । নাক দিয়া প্রচুর পরিমাণে তরল স্লেমা নির্গমন এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে হাঁচি (একন্, আস্, ইউফ্লেস্, মার্ক্-কর) ; প্রাতঃকালে নাকের উক্ত প্রকারের অবস্থা ।

মুখমণ্ডল । মুখমণ্ডলের হাড়ে চাপিয়া ধরা এবং ছিঁড়িয়া ফেলার ভ্রায় বেদনা ; ডাইনগালে কর্ণের সম্মুখভাগস্থিত হাড়ে কসিয়া ধরা বা ছিঁড়িয়া ফেলার ভ্রায় বেদনা ।

মুখগহ্বর এবং গলার মধ্য । মুখে শুকবোধ ; মুখে হর্ষক । ইন্সাহির নিম্নস্থিত লাল নিঃসারক গ্রন্থি (Submaxillary glands) প্রদেশের ক্ষীতি ; ঘাড় শক্ত হয় বা উহা নোয়ান যায় না ; গলার মধ্য ক্ষীত হইলে ঘেরূপ হয়, গিলিতে সেরূপ কষ্টানুভব, যাহার দরুণ আহার দ্রব্যও গিলিতে অত্যন্ত কষ্টানুভূত হয় ; প্রতি দিন প্রত্যুষে আহারবহা গলনালীর ঠিক উপরিভাগের দুই পার্শ্বে আঁটান, ধূসর বর্ণের, ভিজাগোঁদের ভ্রায় স্লেমার সঞ্চার, যাহা কাশিলে বা গলায় থেকুর দিলে সহজেই নির্গত হয় ; প্রবাসে, কাশি এবং গিলিবার সময় গলার মধ্যে ছাল উঠিয়া যাওয়া বা ক্ষত হওয়ার ভ্রায় অনুভূত হয় (আর্জেন্ট-নাইট্রিক্) ; হাঁই তুলিবার সময় গলনালীর উপরিভাগের দুই পার্শ্বে বেদনানুভব ; উক্ত অংশে অসাড়বোধ ।

পাকস্থলী এবং উদর । গলা সমান ভরিয়া থাইলেও আহারের তৎক্ষণাত্ পর অত্যন্ত ক্ষুধাবোধ হয় ; পাকস্থলীর মধ্যে উদ্বেগ এবং চাপা-বোধ । বাম উরুর ঠিক উপরিভাগে এবং বস্টিকোটরের বাম পার্শ্বের সমুদয় অংশেই থেঁতলিয়া যাওয়া বা মোচড়াইয়া পড়ার ভ্রায় বেদনা ; উদরের উপরিস্থিত পেশীর বিস্তৃতি বা উহাতে কসিয়া ধরার ভ্রায় অনুভূত হওয়া ; উদরে সঙ্কোচে কল কল, গড়্গড়্ শব্দ হওয়া এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে ক্ষুধা ।

মল এবং মলদ্বার । বারম্বার বাহ্যের বেগ বাহা শুষ্কের নিয়ন্ত্রণে অধিক অনুভূত হয় এবং বেগ দিলে অতি সামান্য পরিমাণে নরম মল নির্গত

হয়; বালির জ্বাশ শুক মল নির্গমন; মধ্যাহ্নে আহারের পর উক্ত প্রকারের মলত্যাগ।

মূত্রযন্ত্র । বারম্বার মূত্র ত্যাগের ইচ্ছা এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে প্রচুর পরিমাণে মূত্রত্যাগ (এপিস্, অ্যাজেক্ট-নাইট্রিক্, ফস্-অস্); মূত্র বোলাটিয়া; মূত্র মিষ্ট স্বাদ বিশিষ্ট বাহ্য রাস্তিতেই অধিক পরিমাণে নির্গত হয়; বহুমূত্র।

জননেন্দ্রিয় । পুরুষের অণ্ডকোষে ছেঁচিয়া দেওয়ার জ্বাশ বেদনা বা যাতনা (একন্); কাপড় পরিয়া চলিবার সময় বেদনার বৃদ্ধি; প্রায় প্রতি রাস্তিতেই স্বপ্নে ধাতু নির্গমন; কিন্তু ঐ সময় পুরুষাঙ্গ ঝাড়া হয় না এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে পুরুষাঙ্গ ছোট হইয়া যায়; হস্ত মৈথুনের পর পুরুষাঙ্গের উক্ত অবস্থা; যুশ্-যুশে রক্তের প্রমেহ বোগ এবং তদ্রূপ হরিত্রা বা সবুজের আভাস্কৃত ক্রেন নিঃসরণ। স্ত্রীলোকের বাম ডিম্বকোষ এবং কোমরে বেদনা ডাইন ডিম্বকোষে বেদনার এপিস্ ব্যবস্থা।

শ্বাসযন্ত্র । বাহার্য সর্সদা গান এবং বক্তৃতা করে তাহাদিগের স্বরভঙ্গ (অ্যাজেক্ট-নাইট্রিক্, এরাস্, ফস্); হাসিলে বায়ু নলের উপরিভাগে প্লেম্বার সঞ্চার এবং কাশের উদ্রেক হয় (চায়না, ডুসিরা, ফস্); চলিবার সময় অথবা নীচের ঘর হইতে সিঁড়ি ভাঙ্গিয়া উপরের ঘরে উঠিবার সময় বা ঘাড় হেট করিয়া উপড় হইলে গলার মধ্যে প্লেম্বার সঞ্চার, বাহ্য একবার কাশিলেই নির্গত হয়; কাশিবার সময় (গিলিবার সময় নহে) বায়ুনলের উপরিভাগে জ্বাশ এবং টাটানি; যেখানে বায়ুনল হই শাখার বিভক্ত হইয়াছে, সে স্থানের উপরে ছাল উঠিয়া যাওয়ার জ্বাশ অল্পভূত হয়, শব্দ প্রয়োগে বাহার বৃদ্ধি হয়; বায়ুনলের নিম্নভাগ হইতে উপরের দিকে প্রথমতঃ যুশ্-যুশে বর্জনবৎ বেদনা, বাহ্য হুটী বিধানের জ্বাশ বেদনা বা যাতনার পরিণত হয় এবং বাহার দক্ষণ ২৩ বার কাশির উদ্রেক হয়; দিনের বেলায় মধ্যে মধ্যে কণ্ঠস্থানী সাঁই সাঁই, ঘড়্-ঘড়্ শব্দ বিশিষ্ট কাশি বাহ্য রাস্তিতে বা বহির্বিষ্মৃতে থাকে না এবং বাহার সঙ্গে সঙ্গে গলা দিয়া সিদ্ধ করা সরদাদির জ্বাশ সাদা সাদা গাঢ় প্লেম্বা সহজে নির্গত হয়; বুকের অভ্যন্তরীণতা, বিশেষতঃ বাম পার্শ্বের।

হৃৎপিণ্ড । হৃৎপিণ্ডের পেশীতে বেদনা বা উহার কষ্টহীন বারম্বার

আক্কেপিক স্পন্দন, তীব্র হইয়া শয়ন করিলেই বাহার অধিক উদ্বেক হয়।

ব্যবহার। পারার (Mercury) অপব্যবহার জনিত অন্ত্র; হস্ত ঠৈমধুন হেতু অন্ত্র; অস্থির সন্ধিতে প্রদাহ এবং উহাতে ভরানক বেদনা; কণ্ঠনালীর পুরাতন প্রদাহ (Chronic Laryngitis) এবং উহার সঙ্গে স্বরভঙ্গ; বহুমূত্র; এক শিরার ব্যারাম বা অন্ত্রকোষ প্রদাহ; হৃৎপিণ্ডের উত্তেজনা; পূঁবাঙ্গি রসকর হেতু জ্বর বা হেক্টিক ফিবার (Hectic Fever) ইত্যাদি অন্ত্রে এই ঔষধ ব্যবহার্য্য। টেষ্ট (Teste) বলেন যে, একটা জীলোকের জরায়ব কৰ্কট রোগে (Uterine Cancer) এই ঔষধ ব্যবস্থা করিয়া তিনি বিশেষ ফল পাইয়াছেন।

বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ। অস্থিতে ছিঁড়িয়া কেলা বা চাপিয়া ধরার ভাৱ প্রবল বেদনা; অস্থিসন্ধিতে দুৰ্ব্বলবোধ এবং টাটানি বাহা উপর হইতে নীচে নামিতেই অধিক অনুভূত হয়; অঙ্গ প্রত্যঙ্গে অবশ এবং অসাড় বোধ; চলিবার পর অঙ্গ প্রত্যঙ্গে ক্লান্তিবোধ এবং উহাতে শক্তি না থাকা; পায়ের পাতা শোথের ভাৱ ক্ষীত; বেদনাদি আন্তে আন্তে ক্রমে ক্রমে আরম্ভ হয়, কিন্তু হঠাৎ দূরীভূত হয়; আভ্যন্তরিক বস্ত্রে জ্বালা এবং টাটানি; বেলা ছুই প্রহরের সময়, আক্রান্ত স্থান স্পর্শ করিলে এবং তীব্র হইয়া শয়ন করিলে বেদনাদির বৃদ্ধি ইত্যাদি আর্জেন্টাম্ মেটেলিকাম্‌য়ের কতকগুলি বিশেষ প্রাকৃতিক নির্দিষ্ট লক্ষণ যে সকল রোগী লম্বা এবং শীর্ণকার বিশিষ্ট এবং সহজেই চটিয়া যায় তাহাদিগের পক্ষে এই ঔষধ অধিক উপকারী।

সমগুণ বিশিষ্ট ঔষধ। আর্জেন্টাম্ মেটেলিকাম্‌য়ের কার্যের সঙ্গে অরাম্, প্রাটিনাম্, সেলিনিয়াম্ এবং জিঙ্কাম্‌য়ের কার্যের বিশেষ সাদৃশ্য আছে। এতদ্ভিন্ন কোন কোন বিষয়ে ইহার সঙ্গে অসাকিটিডা, এরাম্, ক্যাকেরিয়া-কার্ক, চায়না, হিপার, সাল্‌ফিউরিস্, মার্কিউরিয়াম্, নাস্টিক্ অসিড, পাল্‌গেটিলি এবং পিপিয়ার কার্যের সাদৃশ্য আছে।

প্রতিষেধক ঔষধ। মার্কিউরিয়াম্, পাল্‌গেটিলি।

ডাইলুশন বিচার। হানিমান এই ঔষধের ২য় ক্রয়ের গুঁড়া ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন। ইহার ৬ষ্ঠ এবং ৩০ক্রমের আরোকণ্যব্যবহৃত হইয়া থাকে।

আর্সিনিকাম্ আয়োডেটাম্,-আয়োডাইড্

অব্ আর্সিনিক্,-আর্স্-আয়োড্

(ARSENICUM IODATUM,-IODIDE OF ARSENIC,-ARS.-IOD.)

একভাগ মেটেলিক্ আর্সিনিক্ এবং ৫ ভাগ আয়োডিড্ একত্রে মিশাইয়া তাতাইয়া আয়োডাইড্ অব্ আর্সিনিক্ প্রস্তুত হইয়া থাকে। যথানিয়মে সুগার্ অব্ সিক্কের সঙ্গে মিশাইয়া ইহার গুঁড়াও প্রস্তুত হইয়া থাকে।

সাধারণ ক্রিয়া। ডাক্তার হেল্ (Dr. Hale) বলেন যে, যে প্রকার রৈমিক বা স্লেয়া জনিত রোগে নিঃসরণ অত্যন্ত ক্ষতকারক এবং উত্তেজক, সে প্রকার রোগে এই ঔষধ বিশেষ উপকারী। তিনি বলেন যে বোগলে অত্যন্ত সাংঘাতিক রকমের ক্ষীতি এবং কঠিনতা এই ঔষধ সেবনে সারিয়া গিয়াছে। অরায়ুব মুখের উক্ত প্রকারের ক্ষীতি এবং কঠিনতা এই ঔষধ ব্যবহারে একবারে সারিয়া গিয়াছে। যে প্রকার পুর্বাতন আকারের ফুফুসপ্রদাহজনিত যক্ষাকালিতে (Chronic Pneumonic Phthisis) গলাদিয়া প্রচুর পরিমাণে পুঁবাদি মিশ্রিত স্লেয়া নির্গত হয় এবং তদ্বর্ণন শেষ বেলায় প্রবল জ্বর হয় (Hectic Fever) এবং রোগী অতি শীঘ্র শীঘ্র শীর্ণ হয়, সে প্রকার যক্ষাকালের পক্ষে আয়োডাইড্ অব্ আর্সিনিকের ২য় হইতে ৬ষ্ঠ দৈনিক ক্রমের গুঁড়া ২।১ গ্রেইণ্ মাত্রায় বিশেষ উপকারী। ইং ১৮৮০ সনে বোম্বে নগরে উক্ত প্রকারের একটা যক্ষাকালক্রান্ত রোগীর চিকিৎসায় আর্সিনিক্ আয়োডাইড্ ২য়ক্রমের গুঁড়া, ২গ্রেইণ্ মাত্রায়, প্রতিদিন ৩মাত্রা করিয়া ১ সপ্তাহ কাল ব্যবহার করিয়া লেখক আশ্চর্যকৃত ফল পাইয়াছিলেন। এমন কি, রোগীর গলা দিয়া প্রতিদিন প্রায় এক পোওয়া বেড় পোওয়া করিয়া পুঁষ পড়িত এবং সকাল বেলা শরীরের স্তম্ভাপ 102° ফারন হিট্ ডিগ্রী এবং সন্ধ্যার সময় 105° এবং কখন কখন 106° ফারন হিট্ ডিগ্রী হইত। এই ঔষধ ১ সপ্তাহ কাল ব্যবহারে শরীরের স্তম্ভাপ সন্ধ্যার সময় 99.6° ডিগ্রী এবং প্রাতঃকালে 98.6° ডিগ্রী হইতে লাগিল এবং গলা দিয়া সমস্ত দিন রাত্রিতে ২।৩ কাঁচার অধিক পুঁবাদি পড়ে নাই।

আসাকিটিডা,-(হিং),-আসফ্

(ASAFETIDA,-ASAF.)

পারস্ত দেশ, আফগানিস্তান এবং পাকিস্তানে এই গাছ জন্মে। তাহা গাছের শিকড় ছিঁড়িলে গৌদের জ্বাশ যে একপ্রকার পদার্থ নির্গত হয় তাহাকে আসাকিটিডা বলে। এতদ্ব্যতীত ইহাকে হিং বলে। যথানিয়মে রেকটিফাইড স্পিরিটে ডিস্কাইয়া ইহার মূল আরোক প্রস্তুত হইয়া থাকে।

সাধারণ ক্রিয়া। ঔষধিক মণ্ডলী দিয়া জ্বীলোকের জননেত্রির এবং শ্বাস যন্ত্রের উপর ইহার কার্য অতি প্রবল। ইহা জ্বীলোকের ডিম্বকোষকে উত্তেজিত করে এবং হিষ্টিরিয়া, হাঁপানিকশি ইত্যাদি রোগ উৎপাদন করে। অস্থি এবং চর্মের উপরও ইহার কার্য দেখিতে পাওয়া যায়।

সাধারণ প্রাকৃতিক লক্ষণ।

মন। হিষ্টিরিয়া রোগ জনিত অস্থিরতা এবং মনের উত্তেজ; মন সর্বদা চঞ্চল এবং অস্থির; সর্বদা চিড়্ চিড়্, থিট্ থিট্ করা (ব্রাই, ক্যান্স, নাক্স-বয়); সর্বদা বিপদের আশঙ্কা করা।

মস্তক। কপালে চাপিয়া ধরার জ্বাশ বেদনা যাহা মাথার মধ্যদেশে হইতে আরম্ভ হইয়া বহির্দিকে বিস্তৃত হয় (একন্, ব্রাই); কপালের বাম পার্শ্বের উন্নত স্থানে স্ফটী বিধানের জ্বাশ চিড়িক মারা; চোঁচ বিধানের জ্বাশে যেরূপ হয়, মাথা এবং কপালের দুই পার্শ্বে সেরূপ কসিয়া ধরা বা চাপিয়া ধরার জ্বাশ বেদনা (অনাকার্ড); বাম পার্শ্বেই এই বেদনা অধিক অল্পভূত হয়।

চক্ষু। রাশ্মিতে মাথার মধ্য এবং উর্গাব চতুর্দিকে দৃশ্যদৃশিয়া বেদনা; চক্ষুর আইরিস নামক অংশের গরমীর ব্যারাম জনিত প্রদাহ (Syphilitic Iritis); কর্ণিয়ার বিস্তৃত রক্তের ভাঙ্গা ক্ষত এবং তদ্রূপ চক্ষে জলাশুষ্ক, চাপিয়া ধরার জ্বাশ বেদনা, যাহা মধ্যদেশ হইতে বহির্দিকে বিস্তৃত হয় এবং বিশ্রাম ও প্রচাপনে বাহ্যর উপশম হয়; চক্ষে শুষ্ক এবং জালাশুষ্ক (আর্স, সালফ্); জ্বর উপরে ছিদ্র করার জ্বাশ প্রবল বেদনা।

নাসিকা। নাক দিয়া দুর্গন্ধযুক্ত রক্ত নিঃসরণ এবং নাকের হাড় ক্ষীণ ও প্রদাহযুক্ত।

মুখমণ্ডল । মুখমণ্ডলের হাড় অবশ্যবোধ ; নিম্ন ওষ্ঠের ক্ষীতি ।

মুখগহ্বর ও গলার মধ্য । মুখগহ্বর, গলার মধ্য এবং আহার বহা গলনালীর মধ্যে শুষ্কবোধ ; উদর হইতে উর্দ্ধদিকে গোলার ছায় কোম পদার্থ গলার মধ্যে ঠেলিয়া উঠিতেছে, একপ অস্বভূত হয় (লাইকোপ, সালফ, ন্যাগ্নেন্স-মিউন, ফাইস্ট) যাহা নিবারণ করার জন্য বারবার চোক গিল-বার ইচ্ছা হয় এবং বাহার দ্রব কখন কখন খানকষ্ট হয় ; আহার বহা গলনালী যেন সঙ্কুচিত হইতেছে বারবার একপ অস্বভূত হয় ।

পাকস্থলী এবং উদর । পাকস্থলীর মধ্যে দপ্পনপানি (অ্যান্টি-টার্ট, পাল্‌স, মিসিয়া) ; পাকস্থলীতে পূর্ববোধ এবং উহার ক্ষীতি ও বিস্তৃতি (চায়না) ; রক্তনের গন্ধযুক্ত, পচা বা উগ্র স্বাদ বিশিষ্ট উদ্‌গার উঠা ; পেটের মধ্যে সঞ্চিত দূষিত বায়ু (Flatul) গলাদিয়া নির্গত হয়, কিন্তু উহা কখনও শুষ্কতার দিয়া নির্গত হয় না । উদর অত্যন্ত ক্ষীত এবং বিস্তৃত (অ্যান্টি-ক্লড, চায়না) ; উদরোচ্ছ্বাস প্রদেশ এবং সমুদয় উদরে পূর্ববোধ (মার্ক) ; উদরস্থিত পেশীতে চাপিয়া ধরার ছায় বেদনা ।

মল এবং মলদ্বার । পুরুষাঙ্গ এবং শুষ্ক দ্বারের মধ্যবর্তী স্থানে (Perineum) চাপিয়া ধরার ছায় ঘৃণ্য-ঘৃণে বেদনা ; প্রচুর পরিমাণে জলবৎতরল অথবা গাঢ় গোলাবির ছায়, কটাবর্ণের এবং অত্যন্ত দুর্গন্ধযুক্ত মলত্যাগ (আস্‌, লেপ্টেণ্ডা, বাপ্ট) ।

মূত্রযন্ত্র । মূত্র কটাবর্ণ এবং উগ্র বা ঝাল গন্ধযুক্ত (বেঞ্জ-আস্‌) ; মূত্র ত্যাগের সময় এবং উহার পর মূত্রাধারের আক্ষেপ (Spasms) ।

জননেন্দ্রিয় । জীলোকের প্রসব বেদনার ছায় বেদনা এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে পেটে কঠিনবৎ বা নিম্নদিকে ঠেলিয়া নামার ছায় যাতনা (আগারি-ক্যাশ, আগোজ, কোলোফিগাম্‌, সিমিসিক, পাল্‌স) ; পুরুষ সহবাসের অতিরিক্ত ইচ্ছা (ক্যাছ) ; সব্‌জের আভাব্যুক্ত, তরল এবং দুর্গন্ধযুক্ত প্রচুর পরিমাণে যেত প্রদর নিঃসরণ ; যোনি ইত্যাদির ক্ষীতি এবং প্রণাহ ।

শ্বাসযন্ত্র । বুকে আক্ষেপিক আঁটা বোধ, বাহার দ্রব মনে হয় যেন বক্ষের মধ্যস্থিত সমুদয় যন্ত্র অনারাসে বিস্তৃত হইতে পারিতেছে না (ক্রোটন, ইগ্নেন্স, লরোস) ; বুকে কষ্টদায়ক চাপিয়া ধরার ছায় বেদনা বা

কনকনানি ; বুকে (ডাইন পাশে) সূচীবিধানে ভ্রায় বেদনা বা যাতনা যাহা মধ্য দেশ হইতে বহির্দেশে পানে বিস্তৃত হয় ।

হৃৎপিণ্ড এবং নাড়ী । সার্বিক সংস্পন্দন (ককিউন্) এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে নাড়ী ক্ষুদ্র, দ্রুতগামী এবং অনিয়মিতরূপে স্পন্দন করে ।

গ্রীবা এবং পৃষ্ঠদেশ । ডাইন স্ক্কাস্থির পশ্চাৎভাগে জালাযুক্ত, সূচীবিধানের ভ্রায় বেদনা যাহা পাজরার হাড় পর্যন্ত বিস্তৃত হয় ; পৃষ্ঠদেশে কনকনানির দরুণ কাজ কর্ম কবিত্তে অশক্তি ।

অঙ্গ, প্রত্যঙ্গ, হাত, পা ইত্যাদি । হাতের সমুদয় অংশের, এমন কি হাতের আঙুলের আগাতে পর্যন্ত ছিঁড়িয়া ফেলা বা সূচীবিধানের ভ্রায় বেদনা ; বাহুর পেশীর স্পন্দন । পায়ের পেশীর স্পন্দন ; পায়ের টিবিয়া (Tibia) নামক হাড় এবং পায়ের পাতার হাড়ে পোকায় ধরা (Caries) (হিপ-সাল্ফ, মার্ক, মেজিরিয়াম্, নাইট্রিক-অ্যাস্, ফস্-অ্যাস্, সাইলিনিস) ; পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুলীর অগ্রভাগে অত্যন্ত কষ্টদায়ক দণ্ডপানি ।

চর্ম । গায় উচ্চ এবং কঠিন প্রান্ত বিশিষ্ট ক্ষত যাহা স্পর্শনে অত্যন্ত বেদনায়ুক্ত হয় এবং যাহা হইতে সহজে রক্ত পড়ে (হিপ-সাল্ফ, মার্ক, মেজিরিয়াম্) ; বা হইতে প্রচুর পরিমাণে সব্জের আভায়ুক্ত তরঙ্গ, ভর্গক্ষুণ্ড এবং কখন কখন পচা পর্দা বিশিষ্ট পুঁথ নির্গমন ।

জ্বর । সময়ে সময়ে সমুদয় শরীরে শীতবোধ ; মধ্যাহ্নে আহ্বারের পর গা গরম হয় এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে মনের উদ্বেগ, নিদ্রাবেশ, কিছু পিপাসা থাকে না ।

ব্যবহার । হিষ্টিরিয়া ; সমুদয় যন্ত্রের অতিরিক্ত চেতনা ; মনোমত্ততা ; (Hypochondriasis) হাঁপানি কাশি ; হৃৎপিং কফ বা কাশি ; অজীর্ণ ; হৃৎবেদনা ; উদরাময় ; নিয়মিত সময়ের অনেক পূর্বে কষ্টকর রক্তস্রাব ; পুরুষ মহাবাসের অতিরিক্ত ইচ্ছা ; অস্থি এবং চর্মের পারার অপব্যবহার বা গণ্ডমালা জনিত অসুখ ; (যথা অস্থি পোকায় ধরা এবং ক্ষত) ; অস্থির অসম্পূর্ণ বিকাশ হেতু অসুখ (Rickets) ; তরুণ এবং পুৰাতন আকারের গৌণ উপদংশ (Secondary and Tertiary Syphilis) ইত্যাদি অসুখে আসফিটিডা ব্যবস্থা ।

বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ । হিষ্টিরিয়া বোগে গলারমধ্য এবং

আহারবহা গলনালীর মধ্যে অত্যন্ত কঠোরভব; বসিয়া থাকাতে সমুদয় উপদ্রব আরম্ভ হয় এবং বহির্কায়ুতে এবং নড়াচড়াতে অস্থির বৃদ্ধি ইত্যাদি আদ্যাকিটাদার কতকগুলি বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ। দ্বায়বিক, হিষ্টিরিয়া রোগাক্রান্ত হওয়া এবং গণ্ডমালা ধাতু; গণ্ডমালা ধাতু, চোন্দা এবং অপ-
রিষ্কার শিশু বা বাগক বালিকার পক্ষে এই ঔষধ বিশেষ উপযোগী।

সমগুণ বিশিষ্ট ঔষধ। দ্বায়বিক মণ্ডলীর উপর ইহার কার্য আশ্রু, মক্ষাণ্ এবং বেলেরিয়ানের দ্বারা। অস্থির উপর ইহার কার্য অরাম, ফ্লোরিক্-অসিড্, মার্কিউরিয়াম্, ফক্সাস্ এবং সাইলিনিয়াম দ্বারা। এতদ্ভিন্ন ইহার কার্যের সঙ্গে আর্সিনিক্, বেগাডোনা, ব্রাইওনিয়া, ক্যান্ডেরিয়া-কার্ক্, কষ্টিকাম্, চায়না, কার্বো-বেজিটেবিলিস্, কফির, কোনারাম্, লাইকোপডিয়াম্, নাইট্রিক্ অসিড্, পাল্মেটিগা, পিপিরা এবং সালফারের কার্যের সাদৃশ্য আছে।

প্রতিষেধক ঔষধ। কষ্টিকাম্, ক্যান্ফার, চায়না, মার্কিউরিয়াম্, পাল্মেটিগা।

ডাইলুশন বিচার। হিষ্টিরিয়া ঘটিত অস্থি ১ম, ২য় এবং ৩য় দশ-
মিক ক্রমের আরোক বিশেষ উপকারী। ডাক্তার হলকোম্ (Dr. Holcombe)
বলেন যে, অস্থির অস্থি (অস্থি পোকায় ধরিলে, -Caries) ১২ এবং ৩০
ডাইলুশন বিশেষ উপকারী।

বিস্মাথাম্, -বিস্মাথ্, -বিস্মাথ্

(BISMUTHUM, -BISMUTH SUBNITRATE, -BISM.)

কোন এক বিশ্বস্ত হোমিওপ্যাথিক ঔষধাগর হইতে আদত বিস্মাথ্, সাবনাইট্রেট্ ক্রয় করিয়া যথানিয়মে সুগার অবমিষ্টের সঙ্গে মিশাইয়া ১ম দশমিক হইতে ৩য় শততমিক ক্রম পর্য্যন্ত গুঁড়া প্রস্তুত হইয়া থাকে। ৩য় শততমিক ক্রম হইতে যথানিয়মে ৪র্থ শততমিক ক্রমের আরোক প্রস্তুত হইয়া থাকে।

সাধারণ ক্রিয়া। যে সকল যন্ত্র নিউমোগ্যাট্রিক্ দ্বায়ুর (Pneumo-

gastric nerve) শাসনাধীন, সেই সকল যন্ত্রের উপরই ইহার কার্য অতি প্রবল। পাকস্থলীর উপর ইহার কার্য সর্বাঙ্গিক প্রবল এবং তদনুসারে পাকস্থলীতে বমন সম্বন্ধিত বেদনা উৎপন্ন হইয়া থাকে।

সাধারণ প্রাকৃতিক লক্ষণ ।

মস্তক । মাথায় চাপিয়া ধরার জ্বাৰ বেদনা এবং কপাল প্রদংশে ভারিবোধ ।

চক্ষু । ডাইন চক্ষুর গোলকে বেদনা যাহা সম্মুখ দেশে হইতে আরম্ভ হইয়া পশ্চাৎদিকে এবং নিম্নদিক হইতে আগন্তু হইয়া উপরের দিকে বিস্তৃত হয় ; চক্ষুর দুই কোণে গাঢ় পৃথের জ্বাৰ কেতুবের সঞ্চার ।

মুখগহ্বর । দন্তশূল ঠাণ্ডাজল মুখে লইলে যাহার উপশম হয় (কক্ষিয়া) ।

পাকস্থলী এবং উদর । শেষ বেলা বা সন্ধ্যার সময় জিহ্বা সাধা লেপযুক্ত (প্রাতঃকালে জিহ্বা উক্ত প্রকারের লেপযুক্ত হইলে সাণ্ড) ; বারম্বার কাঠ উদগার উঠা এবং পাকস্থলীতে অত্যন্ত অস্থির বোধ ; আহাৰ বা মাতৃস্তন দ্বারা পানের পর বমন বা বমনোৰ্বেগ ; তরল পদার্থ বমন ; মল পাকস্থলীর মধ্যে প্রবেশ করিবা মাত্রই বমন (ফল) ; কোন একটা ভারি পদার্থ চাপিয়া থাকিলে ঘেঁৰুপ হয়, আহাৰের পর পাকস্থলী প্রদেশে অত্যন্ত কষ্টদায়ক এবং জ্বালাযুক্ত সেরূপ চাপাবোধ (আস্) ; বমন বা আক্ষেপিক বমনোৰ্বেগ বা কাঠবম্বী এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে পাকস্থলীতে অকথ্য বেদনা বা যন্ত্রণা ; পাকস্থলীতে আক্ষেপিক বেদনা ; পাকস্থলীতে একবার জ্বালাবোধ এবং একবার চাপাবোধ ; মেরুদণ্ডে চাপাবোধ, বাহার দরুণ রোগী পশ্চাৎপানে বাঁকিয়া পড়িতে বাধ্য হয়। গুহ্বার দিয়া বারম্বার দূষিত বারু (Flatus) নিঃসরণ ; তলপেটে চিন্‌চিনে বেদনা এবং চাপাবোধ ও উহার সঙ্গে সঙ্গে পেটে গড়্‌গড়্‌, কল কল শব্দ হওয়া এবং মল ত্যাগের ইচ্ছা ।

মূত্রযন্ত্র । বারম্বার প্রচুর পরিমাণে জলবৎমূত্র ত্যাগ ।

শ্বাসযন্ত্র । চলিবার সময় বক্ষ এবং উদর কোটরের মধ্যস্থিত গোল পেশী বা (Diaphragm) প্রদেশের মধ্য দিয়া আক্ষেপিক এবং চাপিয়া ধরার জ্বাৰ বেদনা ; বৃক্, পিঠে ছিদ্র করার জ্বাৰ এবং জ্বালাযুক্ত বেদনা ।

অঙ্গ প্রত্যঙ্গ । ডাইন বাহ্যতে পক্ষাঘাতের ছায় অবশ্য এবং তুর্কল-বোধ ; ডাইন বাহ্যর সম্মুখভাগে অবশ্য কারক এবং ছিঁড়িয়া ফেলা বা চাপিয়া ধরার ছায় বেদনা, বহির্দিকেই বাহ্য অধিক অহুত হয় এবং নড়া চড়া ও স্পর্শনে বাহ্য দূরীভূত হয় ; ডাইন হাতের তর্জনী এবং মধ্যমাস্থলীর হাড়ে ছিঁড়িয়া ফেলার ছায় বেদনা ; ডাইন হাতের আঙ্গুলের অগ্রভাগে ছিঁড়িয়া ফেলার ছায় তীক্ষ্ণ বেদনা বাহ্য নথের নীচেই অধিক অহুত হয় ।

চর্ম্ম । পায়ের টিবিয়া (Tibia) নামক হাড়ের পার্শ্বে এবং উভয়পায়ের পাতার পশ্চাৎদেশে সন্ধির নিকটবর্তী স্থানে ক্ষতকারক চুলকানি, চুলকাইলে যাহার বৃদ্ধি হয়, কিন্তু যে পর্য্যন্ত রক্ত না পড়ে, সে পর্য্যন্ত চুলকাইতে ইচ্ছা হয় ।

নিদ্রা । শেব রাত্রিতে অভ্যস্ত ঘুম হয় না ; ভয় থাকিলে ঘোরতর হয়, রাত্রিতে বারবার সেরূপ জাগিয়া উঠা ; স্ত্রী বা পুরুষ সহবাস সম্বন্ধীয় স্বপ্ন দেখিয়া অস্থির নিদ্রা বা ঘুম ভাল না হওয়া এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে কখন ধাতু-নির্গত হয়, কখন বা ধাতু নির্গত হয় না ।

ব্যবহার । পাকস্থলীর অনুরূপে, বিশেষতঃ বমন সম্বলিত পাকস্থলীতে বেদনার বিস্মাৎ বিশেষ উপকারী । ভেদ, বমন এবং পেটে বেদনা সম্বলিত পেটের অনুরূপ ; উদরাময় ইত্যাদি অনুরূপে ইহা বিশেষ উপকারী । টেষ্ট (Teste) বলেন যে, স্ত্রীলোকের সন্তান প্রসবের পর পায়ের ডিমের শিরাদির সাদা ক্ষাতিতে (Phlegmasia Alba Dolens) বিস্মাৎ ব্যবহার করিয়া তিনি বিশেষ ফল পাইয়াছেন ।

সম্মুখ বিশিষ্ট ঔষধ । বিস্মাণের কার্যের সঙ্গে আর্সিনিক্, আর্জেন্টাম্, হাইড্রোম্যারেনিক্ আর্সিড্ এবং জিকামের কার্যের বিশেষ সাদৃশ্য আছে । এতদ্বির কোন কোন বিষয়ে ইহার কার্যের সঙ্গে আর্টিমোনিয়াম্, ক্রোডাম্, বেলাডোনা, ক্যাকেরিয়া কার্বোনিকা, হাইড্রাষ্টিস্, ইগ্‌নেসিয়া, লাইকোপডিয়াম্, ফক্ষরাস্, নাক্স-বনিকা, পালসেটিল্লা, রাস্ট্রক্স, সিপিরা এবং গাল্‌কারের কার্যেরও সাদৃশ্য আছে ।

প্রতিষেধক ঔষধ । ক্যাল্‌কেরিয়া কার্ব, ক্যাপ্সিকাম্, নাক্স-

কম্বিকা। অধিক মাত্রায় বিস্মাথ দ্বারা বিষাক্ত হইলে বমন উৎপাদক ঔষধ প্রয়োগের পর ছুঁয়াদি ব্যবস্থা।

ডাইলুশন বিচার। হানিমান এই ঔষধের ২য় ক্রমের গুঁড়া ব্যবহার করিতেন। আমরাও ১ম এবং ২য় ক্রমের গুঁড়া ব্যবহার করিয়া বিশেষ ফল পাইয়া থাকি। ডাক্তার ইল্‌চাম্ (Dr. Yeldham) বলেন যে, পাকস্থলীর বমন সম্বলিত বেদনায় এই ঔষধের মিশ্র গুঁড়াতে কোন ফল না পাইয়া আদত বিস্মাথ ৫ গ্রেইন মাত্রায় ব্যবহার করিয়া জীলোক দিগের উক্ত প্রকারের পাকস্থলীর বেদনায় তিনি বিশেষ ফল পাইয়াছেন। লেখকও ডাক্তার ইল্‌চামের উক্ত মতের পোষকতা করেন। তিনি ২।৩ স্ট্রি রোগীর উক্ত প্রকার পেটে বেদনায় আদত বিস্মাথ, ১৫ গ্রেইন মাথায় ব্যবহার করিয়া বিশেষ ফল পাইয়াছেন।

বোরাক্স,-সোহাগা,-বোরাক্স

(BORAX,—BORAX)

কোন এক বিখ্যাত হোমিওপ্যাথিক ঔষধাগর হইতে আদত বোরাক্স (সোহাগা) ক্রয় করিয়া যথা নিয়মে স্ফাগর অব্ মিকের সঙ্গে মিশাইয়া ইহার ১ম দশমিক ক্রমের গুঁড়া প্রস্তুত হইয়া থাকে। ২য় দশমিক ক্রম হইতে যথা নিয়মে ৩য় শততমিক ক্রমের আরোক প্রস্তুত হইয়া থাকে।

সাধারণ ক্রিয়া। মহাঘৃদেহে এই ঔষধ কি প্রকারে বা প্রথাতে কার্য্য করিয়া থাকে, সে বিষয়ে বিশেষ কিছু বুক্তিতে পারা যায় না। কিন্তু শৈল্পিক বিজ্ঞী, প্রধানতঃ মুখগহ্বর, অস্ত্র, স্রাব্য এবং যোনিদ্বারের শৈল্পিক বিজ্ঞীর উপর যে ইহার কার্য্য অতি প্রবল সে সম্বন্ধে সন্দেহ নাই। স্থল যন্ত্র এবং চর্ম্মের উপরও ইহার কার্য্য দেখিতে পাওয়া যায়। নিম্নদিকে নামিতে ভয় এই ঔষধের একটি বিশেষ মানসিক প্রাকৃতিক লক্ষণ মধ্যে পরিগণিত।

সাধারণ প্রাকৃতিক লক্ষণ।

মন। নিম্নদিকে চলিতে ভয় থাওয়া এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে মুখাক্তি উৎসেগের চিহ্নযুক্ত, (দোলায় ছলিলে, দোলায় ভায় কেদারায়

বসিগে, বা উপরের ঘর হইতে সিঁড়ি ভাঙ্গিয়া নীচের ঘরে নামিবার সময় (যেমন হইয়া থাকে); অপর্যাহে কোন কাজ করিতে ইচ্ছা না হওয়ার দরুন চূপ মারিয়া বসিয়া থাকা; কোন কাজ কর্তব্য না করা বা একবার একাজ আবার ওকাজ, একরূপ বারবার কাজ পরিবর্তন করা; বারবার এঘর হইতে ওঘরে যাওয়া এবং কোন বিষয়ে মন নিবিষ্ট না করিতে পারা; মনের অত্যন্ত উবেগ এবং নিত্ৰাবেশ বা নিদ্রার ইচ্ছা; সন্ধ্যা হইতে রাত্রি ১১টা পর্যন্ত মনের উবেগ থাকে; সর্বদা চিড়্ চিড়্, থিট্ থিট্ করা এবং সকল বিষয়েই অসন্তুষ্টি প্রকাশ করা (ব্রাট, ক্যাম্, নাক্স-বম্); সর্বদা অলসভাবে সময় কাটান; সামান্য শব্দ শুনিয়াও সহজে চমকিয়া উঠা ।

মস্তক । চুলের আগা একত্র জড়াইয়া যায় এবং চুলের জড়িত আগা কাটিয়া দেওয়ার পর চুল বড় হইলে উঠা আবার জড়াইয়া যায়; সমুদয় মাথায় কনকনানি এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে বমনোবেগ এবং বমনের ইচ্ছা ও সমুদয় শরীরের কাঁপনি ।

চক্ষু । চক্ষুর পদ্ম (পিছি) চক্ষুর মধ্যদিকে বাকিয়া মধ্যে প্রবিষ্ট হওয়ার দরুন চক্ষু, বিশেষতঃ নাকের নিকটবর্তী কোণ, প্রদাহযুক্ত হয় এবং চক্ষুর পাতার প্রান্ত কতকগুলি হয় ও টাটায় (মার্ক্); ডাইন চক্ষের জাইন বা বহির্দেশের কোণ প্রদাহযুক্ত হয় এবং উহার পদ্ম এলোমেলো ভাবে থাকে; রাত্রিতে চক্ষুর পাতার পাতার লাগিয়া থাকে (লাইকোপ্, মার্ক্, পাল্‌স্, সাল্‌ফ্); প্রাতঃকালে লিখিবার সময় চক্ষুর সম্মুখে পাখির ডানা ঝাড়ার ভায় ধড়্‌কড়ানী, বাহার দরুন দেখিবার ব্যাঘাত জন্মে বা চক্রে কাপ্লা দেখায়; চক্ষুর সম্মুখে যেন উজ্জল চেউ ডাইন দিক হইতে বাম দিকে এবং উপরের দিক হইতে নিম্নদিকে গড়াইয়া যাইতেছে এরূপ অনুভূত হয় ।

কর্ণ । কানে সৌ সৌ শব্দ হওয়া; বাম কানে স্থচীবিধানের ভায় অনুভূত হয় ।

নাসিকা । নাকের মধ্যে শুকনা চুমটি পড়ে বাহা একবার ফেলিয়া দিলে পুনরায় পড়ে; বাম নাসারন্ধ্রের সম্মুখভাগে নাকের নিকট ব্রণ এবং উহাতে বেদনা বা টাটানি ও নাসিকার অগ্রভাগের ক্ষীতি; নাকের

জিঙ্গাল লাল বর্ণের ক্ষীতি এবং উহাতে দগ্ধপানি এবং কসিয়া ধরাইয়া ভাঙ্গা বেদনা (বল) ।

মুখমণ্ডল । মুখমণ্ডল ফিকা বা শিটা এবং মেটে রঙ্গ বিশিষ্ট (আঙ্গ, চায়না); মুখমণ্ডল লালবর্ণ এবং উহাতে অত্যন্ত আলা উৎপাদক উচ্চায়তব (একন, বেল) ।

মুখগহ্বর এবং গলার মধ্য । দন্তমাড়ি ত্রণ (Gum-boil) বাহাতে অত্যন্ত বেদনার উদ্রেক হয় এবং ছিদ্র বিশিষ্ট দাঁতে ঘৃণ, ঘৃশে বেদনা; গাল এবং মুখমণ্ডলের বাম দিকের সমুদয় অংশের ক্ষীতি ; জিহ্বা, গুঠ এবং গালের মধ্যদেশের ক্ষত এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে মুখগহ্বরের শুষ্কতা (হাইড্রিট, হেলিবোরাস, আয়োড, মার্ক, নাইট্রিক-আঙ্গ); জিহ্বার উপরে অত্যন্ত কষ্টদায়ক লাল কোয়ার ভায় ফুস্ফুড়ী (নাক্স-বন্), বাহার দরুণ মনে হয় যেন জিহ্বা পুড়িয়া ছাল উঠিয়া গিয়াছে; পুড়িলে বেরুণ হয়, তালুকার সমুখের ঐংশ বেন সেরুণ কৌচকইয়া যায় এবং কোন দ্রব্য চিবাইবার সময় অত্যন্ত বেদনা-বৃত্ত হয়; মুখে বিষাদ, তিত্ত স্বাদ বা স্বাদ একবারেই থাকে না (ব্যাণ্ট, ব্রাই, পালস, সাল্ফ) । গলার মধ্যে সাদাটিয়া কঠিন শ্লেষ্মার সফার দ্বারা অনেক কঠে বা চেষ্ঠাতে গলার মধ্য হইতে নির্গত হয় (এইলাছ, আমন-মিউর) ।

পাকস্থলী এবং উদর । আহারের পর পাকস্থলীর ক্ষীতি এবং বিস্তৃতি ও উহাতে অত্যন্ত অস্বথবোধ এবং গা বমী বমী করা; কোন ভায় দ্রব্য উঠাইতে চেষ্ঠা করার পর পাকস্থলী প্রদেশে বেদনা আরম্ভ হইয়া কোমরের পশ্চাৎদেশে বিস্তৃত হইয়া স্থচীবিধানের ভায় বেদনার পরিণত হয়; বেদনার দরুণ রাত্রিতে পাশ ফিরিয়া শুইতে পারা যায় না; শেষ রাত্রি বা প্রাতঃকালে বেদনার উপশম । আহারের পর দূষিত বায়ু সঞ্চিত হওয়ার দরুণ উদর ক্ষীত এবং বিস্তৃত হয় (কার্বো-বেজ, চায়না); উদরে ভিন্টিনে বেদনা এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে উদরাময় ।

মল । কোমল ফিকা হরিদ্রাবর্ণ (এণ্ড্রা, চেলিডন্) শ্লেষ্মা ভেদ এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে অত্যন্ত দুর্বলতা এবং বলক্ষয়; শিশু বা বালক বালিকা-গণের সবুজ বর্ণের মল ভেদ এবং দাতের পূর্বে ক্রন্দন (কলেস); প্রাতঃকালে বেদনাহীন উদরাময় (পডোফ, দাল্ফ) ।

মূত্রযন্ত্র । মূত্রত্যাগের অত্যন্ত প্রবল ইচ্ছা (একন্), বাহার দ্রব্য
রাজিতে প্রস্রাব করার জন্য বারম্বার বিছানা হইতে উঠিতে হয় (আব্রু) ;
বারম্বার মূত্র ত্যাগের ইচ্ছা, কিন্তু বেগমিলে এক কোঁটাও মূত্র নির্গত হয় না
(একন্, ক্যাছ) ; মূত্রত্যাগের পর মূত্রনাশীতে জালা ও চিড়িকমারা ;
শিশুগণের উষ্ণ বা জালা উৎপাদক মূত্র নির্গমন (একন্, ক্যাছ) ; শিশু প্রায়
১০।১৫ মিনিট অন্তরই প্রস্রাব করে এবং প্রত্যেকবার মূত্রত্যাগের পূর্বেই
চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠে ।

জননেন্দ্রিয় । জীলোকের নিয়মিত সময়ের অনেক পূর্বে, প্রচুর
পরিমাণে রজঃস্রাব (আম্ন-কার্ক, আস্, ক্যাল্-কার্ক, নাক্স-বম)
এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে বমনোদ্বেগ এবং পেটকামড়ানী বা বেদনা ; ডিম্বের
লালের স্থায় ষ্ঠেতপ্রদর নিঃসরণ (আম্ন-মিউর, বোবিষ্টা, ক্যাফ-কন্,
মেজিরিয়াম) এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে মনে হয় যেন গরম জল জরায়ু হইতে
বোনিহার দিবা বহিরা পড়িতেছে ; সাধা গাঢ় কাঁহিরের স্থায় ষ্ঠেত প্রদর
নিঃসরণ ; রজঃস্রাবের পূর্বে পাকস্থলী হইতে কোমরের পশ্চাৎদেশ পর্যন্ত
বেদনা ; রজঃস্রাবের সময় কুঁচকিতে স্থচীবিধান বা ছিঁড়িয়া ফেলার স্থায়
বেদনা ; শিশুকে শুন পান করানোর পরক্ষণেই শুনে কামড়ানী বা স্থচী-
বিধানের স্থায় বেদনা, বাহার দ্রবণ রোগী হাতের পাতা দিয়া শুন চাপিয়া
রাখিতে বাধ্য হয়, কারণ তাহা না হইলে শুন কন্কন্ করে ।

শ্বাসযন্ত্র । খুশ্-খুশে এবং প্রবল কাশি এবং গলাদিয়া সামান্য পরি-
মাণে বিস্তী আদ এবং দুর্গন্ধযুক্ত স্লেমা নির্গমন ; কাশি এবং গলাদিয়া রক্তের
ছিটবৃত্ত সাধা স্লেমা নির্গমন ; ২।৪ মিনিট অন্তরই ফোণী দীর্ঘনিশ্বাস টানিতে
বাধ্য হয় এবং তৎপর বৃকের ডাইন পার্শ্বে স্থচীবিধানের স্থায় বেদনা বা
যাতনা আরম্ভ হইয়া বেদনা কমে ; দীর্ঘনিশ্বাস এবং আন্তে আন্তে প্রশ্বাস
বহে ; প্রত্যেকবার কাশি ও দীর্ঘনিশ্বাসের সময় বৃকে ষাটিয়া বা কসিয়া ধরার
স্থায় বেদনা (ব্রাই, ক্যালী-কার্ক) ; হাঁইতোলা কাশি দেওয়া অথবা দীর্ঘনিশ্বাস
প্রশ্বাসের সময় বৃকে স্থচী বিধানের স্থায় বেদনা ; চাপিলে, বা ঠাণ্ডা জলে
বুকে ধোয়াইলে বৃকের বেদনার উপশম এবং মদ্যপানে উহার বৃদ্ধি হয় ।

চর্ম্ম । চর্ম্ম অস্বস্থ, বাহার দ্রবণ গায় সামান্য ক্ষত হইলেই

জারিয়া উহাতে পুথের স্ফার হয় (ক্যাম, হিপ-সাল্ফ, গ্রাক, সাইলিসি, সাল্ফ); মুখমণ্ডল এবং হাতের চামড়ার উপর যেন মাৰ্জনার জাল লাগিয়া রহিয়াছে এরূপ অস্বভূত হয়; আঙ্গুলের সন্ধির পশ্চাদ্দেশে অত্যন্ত চুলকানি, যাহার দরুণ অত্যন্ত চুলকাইবার ইচ্ছা হয়; গালে এবং টুটীক চতুর্দিকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লাল ফুসুড়ী; শীতকালে হাত পায়েৰ আঙ্গুল হেজে যাওয়ার ভায়ে লালবর্ণ হয় এবং উহাতে অত্যন্ত জ্বালাস্বভূত হয় (অগারিকাস)।

নিদ্রা। স্বাভাবিক অপেক্ষা অধিক ঘুম হয় বটে, কিন্তু বারবার ঘুম ভাঙ্গিয়া যায়; শেষ রাত্রি ৩ টার সময় ঘুম ভাঙ্গিয়া যায় এবং সমুদয় শরীরে গরমবোধ হওয়ার দরুণ ঘুম হয় না এবং এই সময়ে উরুদেশে ঘর্ষ হয়, তরানক স্বপ্ন দেখিলে বেরূপ হয়, শিশু ঘুমেরঘোরে সেরূপ হঠাৎ চীৎকার করিয়া কাদিয়া উঠে।

ব্যবহার। মুখে যা; শিশু বা বালক বাগিকার উদারময়; জীলোকের কঠোর রক্তঃস্রাব এবং বাধকের বেদনা; স্বেতপ্রদর বা পদীর জ্বাৰ শদাৰ্থযুক্ত রক্তঃস্রাব; বক্ষ্যাত্ৰ ইত্যাদি অমুখে বোরাক্স ব্যবহার্য।

বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ। ডাক্তার গ্যারেলি (Dr. Guorensy) বলেন যে নিম্নদিকে নামিতে ভয়ের উদ্বেগ এই ঔষধের একটি বিশেষ প্রাকৃতিক নির্দিষ্ট লক্ষণ মধ্যে পরিগণিত। শিশুগণের দাঁত উঠার সময় অস্থি এবং তাহাদিগের অত্যন্ত সময়ের অস্থির পক্ষে ইহা বিশেষ উপকারী।

সমগুণবিশিষ্ট ঔষধ। বোরাক্সের কার্যের সঙ্গে বেনাডোনা, আইওনিয়া, ক্যাসোমিলা, সিনা, ক্যাল্কেরিয়া-কার্বোনিকা, ক্যাল্কেরিয়া-ফফরিকা, কফিয়া, হিপার সাল্ফিউরিস, মার্কিউরিয়াম, নাস্ত্র-বমিক, পাল্‌সেটিগার, কার্বোয় সাদৃশ্য আছে।

প্রতিষেধক ঔষধ। ক্যানোমিলা, কফিয়া।

ডাইলুশন বিচার। সচারাচার আদত মোহাংগা শুভ্র করিয়া ১ হইতে ৫ গ্রেইন মাত্রায় ব্যবহৃত হইয়া থাকে। আবার অনেক সময় ইহা ১ম বা ২য় দশমিক ক্রমের শুভ্র ২.৩ গ্রেইন মাত্রায় ব্যবহৃত হইয়া থাকে। মোহাংগার ষৈ শুভ্র করিয়া উহাতে অল্প পরিমাণে মধু মিশাইয়া মুখের দ্বার লাগাইলে বিশেষ উপকার দর্শে। অনেক চিকিৎসক মুখের দ্বার এই ঔষধের

১ম দশমিক ক্রমের শুঁড়া মধুন সঙ্গে নিশাইয়া বাহ প্রয়োগের ব্যবস্থা দিয়া থাকেন। আবার এই ঔষধের কেবল বাহিক প্রয়োগেই অনেক সময় মুখের ঘা সারিয়া যাইতে দেখা যায়।

ক্যানাবিস্ ইণ্ডিকা, -(গাঁজা)-ক্যান-ইণ্ড্ (CANNABIS INDICA, -INDIAN HEMP, -CANN-IND.)

কোন এক বিষস্ত হোনিওপ্যাথিক ঔষধালয় হইতে একটুকটুক ক্যানাবিস্ ইণ্ডিস (Extractum Cannabis Indicae, P. B.) ক্রয় করিয়া যথা নিয়মে রেকটকাইড্ স্পিরিটে নিশাইয়া ইহাৰ মূল আবেক প্রস্তুত হয়।

সাধারণ ক্রিয়া । ইহা স্নায়বিক মণ্ডলীকে অত্যন্ত উত্তেজিত করিয়া মস্তিষ্কে বিকৃত করে এবং স্নায়বিক মণ্ডলীর জ্ঞান এবং গতি উৎপাদক শক্তির চাকলা বৃদ্ধি করে। একত্রে এতদেশে মনের উন্নাস উৎপাদন করার জন্ত অনেক লোক গাঁজা খাইয়া থাকে। বাহ্যিক গাঁজা খাও তাহাদিগের যাত্ন বৃদ্ধিয়া উক্ত উন্নাসের পরিমাণ কম বা অধিক হইয়া থাকে। গাঁজা খাইলে অতি সামান্য বিষণ্ড মনে গুরুতর বলিয়া অনুভূত হয়। স্বাভাবিক অবস্থায় মনের যে যে বৃত্তি প্রাণ থাকে, গাঁজা খাইলে সে সকল বৃত্তি অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়া থাকে। যথা স্বাভাবিক অবস্থায় যে চক্ষু করণ ইচ্ছা থাকে, গাঁজা খাইলে সেই চক্ষু করণের ইচ্ছা চরম সীমা প্রাপ্ত হয় এবং স্বাভাবিক অবস্থায় যে ভাষা কাব্য কবিতার ইচ্ছা থাকে, গাঁজা খাইলে সে ভাষা ইচ্ছা উহার চরম সীমা প্রাপ্ত হয়। এই ঔষধের বিশেষ কার্য্য নিম্ন লিখিত লক্ষণাদিতেই বিশেষ করে প্রকাশ পাইবে।

সাধারণ প্রাকৃতিক লক্ষণ ।

মন । মনের অত্যন্ত উন্নাস এবং নানা বিষয়ে চিন্তা, স্বপ্ন ও জংখ প্রকাশ করা (হারোস্, ল্যাক্, ষ্ট্যানন্); সর্বদা আমোদ করা এবং অনিষ্ট করার ইচ্ছা ও অতিরিক্ত হাসি; অনেক প্রকারের ভ্রম এবং কাল্পনিক বিষয় দেখা (আবিসিগ্, হারোস্, ষ্ট্যানন্); সর্বদা চিন্তাযুক্ত এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে মনের অত্যন্ত কষ্ট, বহির্লব্ধে বাহার উপশম হয়; বারংবার পাগল

হওয়ার ভয় (কাল্‌ক-কার্ক, মার্ক); অল্প সময় অধিক এবং সামান্য দূরত্বে অধিক দূর বলিয়া অনুভূত হয়, যথা ১ মিনিট সময়কে ১ বৎসর এবং ২৩ হাত দূরত্বে ২৪ ক্রোশ বলিয়া অনুভূত হয়; অন্ধকারে ভয়ের উদ্বেক হয়; মৃত্যু যেন নিকটবর্তী রোগী এরূপ মনে করিয়া অত্যন্ত ভয় খায় (একল, আস্); মস্তিষ্কের মধ্যে নানা বিষয়ের চিস্তার উদয় হওয়ার দরুন রোগী কোন বিষয় বা ঘটনার কথা স্মরণ করিতে পারে না; সর্বদা উন্মনস্‌তা (এপিস); অচেতনাবস্থা; মলোন্মত্ততা (Delirium Tremens); শরীর কম্পন; চিত্ত বিভ্রম; সর্বদা চটাচটি করার ভাব; বমনোদেগ; অসহ্য পিপাসা।

মস্তক । বসা অবস্থা হইতে দাঁড়াইলে মাথাঘোরা এবং উঠার সঙ্গে সঙ্গে মাথার পশ্চাৎভাগে অবদমন কারক বেদনা; বারম্বার অনিচ্ছা পূর্বক মাথার ঝাকনি; মস্তিকে অত্যন্ত ভারি এবং চাপা বোধ, যাহার দরুন রোগী ঝাড় হেট করিয়া উপুড় হইয়া থাকিতে বাধ্য হয়; মস্তিষ্কের মধ্যে যেন বারম্বার হঠাৎ ধাক্কা লাগে; কপালে, বিশেষতঃ চক্ষুর উপরিভাগে, কসিয়া ধরার স্থায় ঘূর্ণঘূর্ণে বেদনা; কপালে দপ্পদপিয়া বা কন্‌কনিয়া বেদনা; কপালের ডাইন পার্শ্বে, মাথার মধ্যদেশ এবং পশ্চাৎ দেশ গানে ঝাকি লাগা; কপালের জুই পার্শ্বে কন্‌কনানি, ডাইন পার্শ্বেই যাহা অধিক প্রবল বলিয়া অনুভূত হয়; কপালের ডাইন পার্শ্বে স্থলীবিধানের স্থায় ঘূর্ণঘূর্ণে বেদনা; মাথার ডাইন পার্শ্বের সমুদয় অংশেই বেদনা; মাথায় অত্যন্ত ভারিবোধ এবং রোগী চেতনাহীন হইয়া পড়িয়া যায়।

চক্ষু । একদৃষ্টে তা কাইয়া থাকা; অজ্ঞান অবস্থায় নানা প্রকারের কাল্পনিক বিষয় দেখা; চক্ষুর বহির্দিকের কোণে এবং চক্ষুর পাতার ঝাকনি; চক্ষুর যোজক স্বকেষ্ট শিরাদি লাল বর্ণ (একন্); পড়িবার সময় পুস্তকাদির অক্ষর গুলি যেন একত্রিত হইয়া জড়াইয়া যায়; চক্ষুর কাপনি এবং চক্ষুর সম্মুখে ধড়্‌ফড়াণী।

কর্ণ । জুই কানেই বেদনা; উভয় কানেই দপ্পদপানি এবং পূর্ণ বোধ; কানের মধ্যে টন্‌ টন্‌, বজ্‌ বজ্‌ শব্দ হওয়া; কানের মধ্যে জল সিদ্ধ করার স্থায় শব্দ হওয়া; স্বপ্নের অবস্থায় কোন নির্দিষ্ট সময়ে কানে গান করার স্থায় শব্দ শুনা যাহা স্বপ্নের অবস্থা দূরীভূত হইলে থাকে না।

মুখমণ্ডল । মুখমণ্ডল ক্রান্ত এবং শ্রান্ত হওয়ার চিহ্নবৃত্ত ; মুখাকৃতি নিম্নাবস্থার জ্বর বা বোকার জ্বর চিহ্ন বিশিষ্ট ।

মুখগহ্বর এবং গলার মধ্য । আঠা নাখাইয়া রাখিলে যেকোন হয়, তুই ওষ্ঠ যেন সেরূপ লাগিয়া থাকে ; ঘূমেরঘোরে দাঁতে দাঁতে কড়্, মড়্, খট্, খট্, খট্, খট্ শব্দ করা (সিকুটা) ; মুখগহ্বর এবং ওষ্ঠে শুকাইতব ; মুখে সাদা, গাঢ়, ক্রোমাকৃত এবং আঠা থুথু উঠে ; সমুদয় খাদ্য জ্বায়ই যেন খাইতে খুব ভাল লাগে ; সর্বদা তোতলার জ্বর বৎ গলা কাঁপাইয়া কথা বলা (কষ্ট্, ট্রামন্) ; জিহ্বা যেন একবারে শুকাইয়া যায়, বাহার দরুণ ঠাণ্ডা জল খাইতে অত্যন্ত ইচ্ছা হয় ।

পাকস্থলী । ক্ষুধা ; পাকস্থলীর স্থাপিণ্ডের নিকটবর্তীস্থ মুখে নিকট বেদনা, প্রচাপনে বাহার উপশম হয় ।

মলদ্বার । একটা গোলাব উপর শুষ্কতার চাপিয়া বসিলে যেকোন হয়, শুষ্কতারে সেরূপ অস্বস্তি হয় ; মনে হয় যেন শুষ্কতার এবং মূত্রনালীর এক অংশ একটা কঠিন গোলাকারের পদার্থ দ্বারা পরিপূর্ণ রহিয়াছে ।

মূত্রযন্ত্র । হাসিবার সময় মূত্রকোষে বেদনা ; মূত্রকোষে জ্বালা, কনকনানি অথবা স্বতীবিধানের জ্বর তাক্র বেদনা ; পুরুষাঙ্গ টিপিলেই মূত্র-নালী দিয়া শ্লেষ্মার জ্বর এক প্রকার চক্চকে পদার্থ নির্গত হয় ; মূত্রতাগের সময়, উহার পূর্বে এবং উহার পর মূত্রনালাতে জ্বালা ও চিহ্নিকম্বারা, অথবা হল ফুটানের জ্বর বেদনা (ক্যানাবিস্ সাট্, ক্যান্) ; প্রস্রাবের বেগ হয়, বুটে, কিন্তু বেগ দিলে মূত্র ১ ফোঁটাও নির্গত হয় না ; প্রচুর পরিমাণে রক্তহীন মূত্রতাগ ; প্রস্রাব পাইলে অনেকক্ষণ বসিয়া চেঁচার পর মূত্র নির্গত হয় এবং হাত দিয়া পুরুষাঙ্গ টিপিয়া শেষ কএক ফোঁটা মূত্র বাহির করিতে হয় ; প্রস্রাব ধারে পড়ার পর মূত্র আপনা আপনি গড়াইয়া পড়ে ।

জননেন্দ্রিয় । পুরুষের জীসহবাসের ইচ্ছার অত্যন্ত বৃদ্ধি (ক্যান্) ; জীবিত্যে চিন্তার পুরুষাঙ্গ খাড়া হয় না ; পুরুষাঙ্গ প্রায় সদাসর্বদাই সুজোরে খাড়া হয় এবং শুষ্কতা অত্যন্ত বাতনার উদ্বেক হয় (ক্যান্) ; পুরুষাঙ্গ শিথিল এবং ছোট হয় (আগ্‌নাশ্) ; পুরুষাঙ্গের মাথায় চুলকানি । জীলোকের প্রচুর রক্তপ্রাব (বেল্, নাক্স্-বম্) ।

শ্বাসযন্ত্র । কর্কশ কাশি এবং কাশিবার পরক্ষণই বক্ষাহির পশ্চাৎ দেশে ছাল উঠিয়া যাওয়ার ভ্রায় অহুত হয় (আত্মা, ফস্, কমেস্ব) ; দীর্ঘ নিশ্বাস টানিতে অনেক প্রয়াস পাইতে হয় ; বৃক্ কষ্টাভব এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে শ্বাস প্রস্থাসে কষ্টাভব ; রোগী মনে করে যেন তাঁহার নিশ্বাস প্রস্থাস রুদ্ধ হইবে এবং বাহার দক্ষণ রোগী পাখার বাতাস খাইতে ইচ্ছা প্রকাশ করে (আস্) ।

হৃৎপিণ্ড এবং নাড়ী । হৃৎস্পন্দন, বাহা সময়ে সময়ে এত প্রবল হয় যে, উহার দক্ষণ ঘুম ভাঙ্গিয়া যায় ; হৃৎপিণ্ডে চাপিয়া ধরার ভ্রায় বেদনা এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত দিন শ্বাসকষ্ট ; হৃৎপিণ্ডে ছুরী বিধানের ভ্রায় বেদনা ; মনে হয় যেন হৃৎপিণ্ড হইতে কোন তরল পদার্থ ফোঁটার ফোঁটার পড়িতেছে ; হৃৎপিণ্ডে স্থতীবিশনের ভ্রায় বেদনা এবং উহার সঙ্গে অত্যন্ত বাতনা ; দীর্ঘ নিশ্বাস প্রস্থাসে বাতনার উপশম হয় ; নাড়ী অত্যন্ত মৃদুগতি বিশিষ্ট, এমন কি ইহা প্রতি মিনিটে ৪৬ বারের অধিক স্পন্দন করে না (ভিজিট, ওপিয়াম) ।

পৃষ্ঠদেশ । কৃক এবং মেরুদণ্ডের মধ্যদিয়া বেদনা, বাহার দক্ষণ রোগী সোজা হইয়া চলিতে না পারিয়া ঘাড় হেট করিয়া উপুড় হইয়া চলে ।

অঙ্গ, প্রত্যঙ্গ, হাত, পা ইত্যাদি । নিম্নাঙ্গ এবং ডাইন বাহুর পক্ষাঘাত ; বাহু এবং হাতের মধ্য দিয়া বন্ধনানি বা কোন তীক্ষ্ণ পদার্থ বিধার ভ্রায় অহুত হয় বা কুটকুটানি । পা ইত্যাদি নিম্নাঙ্গ সমূহের সম্পূর্ণ পক্ষাঘাত ; পা ইত্যাদি নিম্নাঙ্গে ক্লান্তিবোধ ও হাঁটুর সন্ধির কঠিনতা এবং উহাতে কন্ধনানি ও প্রায় পক্ষাঘাতের ভ্রায় অবশ বা অসাড়বোধ ; হাঁটুর সন্ধি হইতে নিম্নাঙ্গকে বন্ধনানি এবং কোন তীক্ষ্ণ পদার্থ বিধানের ভ্রায় অহুত হয় বা কুটকুটানি এবং মনে হয় যেন কোন একটা পাখীর পাঞ্জার নদী দিয়া হাঁটু শক্ত করিয়া ধরিয়া রাখিয়াছে ; চলিবার সময় মনে হয় যেন পায়ের পাতার তলায় লোহার কাঁটা ফুটিতেছে এবং উহা যেন পায়ের পাতায় ফুটিয়া পা দিয়া বহিয়া উপরের দিকে উকর সন্ধি পর্য্যন্ত বাইতেছে একরূপ অহুত হয়, বাহা ডাইন অঙ্গেই অধিক অহুত হয় এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে উভয় পায়ের তিমে কসিয়া ধরার ভ্রায় বেদনা ; বাম পায়ের

পাতার অস্থি সন্ধিতে খোঁচা বিধার স্থায় বেদনা, বাহ্য পায়ের বুজাঙ্গুলিতেই অধিক অনুভূত হয় ; বামপায়ের বুজাঙ্গুলির মাথার বুটায় ধরার স্থায় বেদনা ।

নিদ্রা । অত্যন্ত ঘুমের ভাব বা ইচ্ছা (নাঙ্ক-মক্) ; ঘুম ভাল হয় বটে, কিন্তু ঘুমের-ঘোবে বিমর্ষতা উৎপাদক স্বপ্ন হয় ; ঘুমের অবস্থায় চমকিয়া উঠা, বাহ্যর দরুন ঘুম ভাঙ্গিয়া যায় ; ঘুমের-ঘোরে স্ত্রী বা পুরুষ সহবাস বিষয়ে স্বপ্ন দেখিয়া ধাতুনিঃসরণ ; ঘুমের-ঘোরে ভবিষ্যতে কি হইবে, বিরক্তি জনক ভবিষ্যতে বিনাশ এবং বিপদের বিষয়ে স্বপ্ন দেখা ; ঘুনাইয়া পড়িলেই প্রতি রাত্রে ঘোবায় ধরে (Night-mare) ।

জ্বর । শরীরের স্বাভাবিক সন্তাপের হ্রাস বা বিনাশ (সাইলিদি, সিমিয়া) ; সার্বসঙ্গিক শীতবোধ ; মধ্যাহ্নে আহ্বারের পর মুখমণ্ডল, নাক এবং হাতে ঠাণ্ডাবোধ ; কপালে ফোঁটায় ফোঁটায় ঘর্ষ জমিয়া থাকা ।

ব্যবহার । মদোন্মত্ততা (Delirium Tremens) ; উন্মত্ততা ; নিশ্বাস প্রশ্বাস এবং হৃৎপিণ্ডের কার্যে ব্যাভ্যন্তরিত হইয়া অচেতনতা (Catalepsy) ; স্নায়ুশূল ; মূত্রকোষের ব্রাইটস্ ডিজিজ্ (Bright's Disease) ; শিরঃশীড়া ইত্যাদি অস্থখে ক্যানাবিস্ ইণ্ডিকা ব্যবহার্য্য ।

বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ । দিনের বেলা শয়ন করিয়া থাকার অত্যন্ত ইচ্ছা ; সামান্য পথ চলিয়া বেড়াইলেই একবারে নিস্তেজ হইয়া পড়া ; অত্যন্ত দুর্বলতা, বাহ্যর দরুন কথা বলিতেও ইচ্ছা যায় না (ট্যানাম) এবং তদরূপ অতি শীঘ্রই ঘুনাইয়া পড়িতে হয় ; প্রাতঃকালে, স্নাত্তিতে, কাফি খাইলে, খাওয়ার সময়, মদ্যপান বা তামাকু খাইলে অস্থখের বৃদ্ধি এবং বিশুদ্ধ বায়ু, ঠাণ্ডা জল এবং বিশ্রামে অস্থখের উপশম ইত্যাদি ক্যানাবিস্ ইণ্ডিকার কতকগুলি বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ । এই ঔষধের একটি বিশেষ প্রকৃতি এই যে, ইহা সেবনে যখন যে বিষয়ে মন চলে, তখনই উহার চরম সীমার যায় । যথা অস্থখের ভাবের উদয় হইলে মনে অস্থখের আর সীমা পরিসীমা থাকে না । আবার দুঃখের বিষয় যখন মনে হয়, তখন দুঃখের আর সীমা পরিসীমা থাকে না । স্নায়বিক, রক্তাধিক্য এবং কখন কখন পিত্তাধিক্য দ্বাভু বিশিষ্ট রোগীর পক্ষে এই ঔষধ বিশেষ উপকারী ।

সমগুণ বিশিষ্ট ঔষধ । মস্তিষ্কের উপর ক্যানাবিস্ ইণ্ডিকার

কার্য আগারিকাশ্, বেলাডোনা, কান্ফার, ক্রোকাস্, হায়োসসারেনাস্, ওশিয়াম্ এবং ট্র্যামোনিয়ামের জ্ঞায়। এতদ্ভিন্ন কোন কোন বিষয়ে ইহার কার্যের সঙ্গে ডিজিটালিস্, ক্যানাবিস্ স্যাটাইবা, ক্যান্‌হারিস্, নাক্স্ বমিকার কার্যের সাদৃশ্য আছে।

ডাইলুশন বিচার। ১ম, ২য়, ৩য় এবং ৬ষ্ঠ ক্রমের আরোকই সচরাচর অধিক ব্যবহৃত হইয়া থাকে। একটি পাণ্ডলের চিকিৎসায় এই ঔষধের মূল আরোক, ৫ কোঁটা মাত্রায়, ব্যবহার করিয়া বিশেষ ফল পাওয়া গিয়াছে। প্রথমতঃ ৬ষ্ঠ ক্রম ১ সপ্তাহ কাল এবং উহা দ্বারা কোনও ফল না পাওয়াতে উহার পরের ১ সপ্তাহ কাল ৩য় ক্রম, এবং উহাতেও কোন ফল না পাওয়াতে ১ম ক্রম, ১ সপ্তাহ কাল ব্যবহৃত করা গেল। ইহাতেও কোন বিশেষ উপকার না হওয়াতে মূল আরোক, প্রতি মাত্রায় ৫ কোঁটা করিয়া, ব্যবহার করিলে, ২ সপ্তাহের মধ্যেই রোগী সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য লাভ করিল।

ক্যানাবিস্ স্যাটাইবা, -(সিকি,-ভাস্),-ক্যান্-স্যাট্

(CANNABIS SATIVA, -HEMP, -CANN.-SAT.)

এই গাছ ভারতবর্ষ এবং পারশ্বদেশে জন্মিয়া থাকে। রুসিয়া, ফ্রান্স্ এবং ইটালী দেশেও ইহার চাষ হইয়া থাকে। এই গাছের ফুল এবং ফুলের নিকটবর্তী কোমল পাতা বথানিয়মে প্রফ্ স্পিরিটে ভিজাইয়া মূল আরোক প্রস্তুত হইয়া থাকে।

সাধারণ ক্রিয়া। মূত্রনাশী প্লেম্মিকবিল্লী এবং পুরুষদের অগ্রভাগের আবরক চর্শ্বের (Prepuce) উপরই ইহার কার্য অধিক দেখিতে পাওয়া যায়, বাহার দরুণ উক্ত অংশ উত্তেজিত হইয়া প্রদাহযুক্ত হয় এবং উহা হইতে প্রমেহ রোগের জন্ম পুঁয়াদি নির্গত হয়।

• সাধারণ প্রাকৃতিক লক্ষণ।

মন। বিষম্ভাব (ইগ্‌নেস্, নেট্রাম্-মিউর, পাল্‌স্, রাস্‌টক্স্) ; মনের অত্যন্ত উবেগ এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে পাকস্থনীতে কষ্টাধুত্ব, ঘাস কষ্ট ও হৃৎস্পন্দন।

মস্তক । দাঁড়াইলে মাথাধোরা এবং মাথা ঝিম্ ঝিম্ করা ; চলিবার সময় হুই পার্শ্বে টলিয়া পড়ার উপক্রম হওয়া ; কপালে (চক্ষুর কোটির প্রান্ত হইতে কপালের পার্শ্ব পর্য্যন্ত) চাপিয়া ধরার জ্বাৰ অহুত হয়, সমুখ পানে বাঁকিয়া পড়িলেও যাহাব উপশম হয় না ; কপালের হুই পার্শ্বে উচ্চ স্থানের নিম্ন দেশে চাপ পড়াব জ্বাৰ বেদনা, যাহা মস্তিষ্কেব মধ্য দিয়া যেন মাথার পশ্চাৎভাগে বিস্তৃত হয় ; মনে হয় যেন মাথার ফোঁটার ফোঁটার ঠাণ্ডা জল পড়িতেছে ।

চক্ষু । চক্ষুর পশ্চাৎদেশ হইতে সমুখ পানে চাপ পড়ার জ্বাৰ অহুত হয় ; চক্ষে আক্ৰমিকরূপে কদিয়া ধরার জ্বাৰ অহুত হয় ।

নাসিকা । নাসিকায় শুকাইয়া উঠে ।

পাকস্থলী । পাকস্থলীতে, ঠিক পাঁজরের নীচে, ক্রমাগত স্থী বিধানের জ্বাৰ ঘূর্ণ ঘূর্ণ বেদনা ; উদ্গাবে দূষিত বায়ু নিঃসরণ ; উদ্গারে তিক্ত বা উগ্র স্বাদ বিশিষ্ট জল উঠা ; নিশ্বাস প্রশ্বাসের সময় এবং নিশ্বাস প্রশ্বাস ব্যতীতও পাকস্থলীর বাম পার্শ্বে পাঁজরের হাড়ের ঠিক নীচে স্থী বিধানের জ্বাৰ ঘূর্ণ ঘূর্ণ বেদনা ।

গুহ, গুহ্যদ্বার । বসিয়া থাকিলে গুহ এবং গুহ্যদ্বারের ঠিক উপবিভাগে চাপাবোধ, যাহার দরুণ মনে হয় যেন অল্প নিম্নদিকে গুহ্যদ্বার দিয়া চেলিয়া বাহির হইবে ; গুহ্যদ্বারের সঙ্কোচন এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে রোগী (স্ত্রীলোক) মনে করে যেন দুই উরুদেশ একত্রে লাগিয়া আসিতেছে ।

মূত্রযন্ত্র । মূত্রকোষ প্রদেশ হইতে কুঁচুকি প্রদেশ পর্য্যন্ত কদিয়া ধরার জ্বাৰ বেদনা এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে গা বমী বমী করা ; পুরুষদের অগ্রভাগ হইতে উহার গোড়া পর্য্যন্ত মূত্রনাগীতে জ্বাৰ এবং চিড়িকমার ; মূত্র ত্যাগের সময় মূত্রনাগীর পশ্চাৎভাগে স্থীবিধানের জ্বাৰ অহুত হয় ; মূত্রনাগী যেন আগাগোড়া ক্ষীত এবং প্রসারিত হইয়াছে এরূপ অহুত হয় (অর্জেন্ট-নাইট্রাস) ; পুরুষের খাড়া হইলে উহাতে কদিয়া ধরার জ্বাৰ বেদনা ; প্রশ্রাব করার সময় এবং উহার ক্রিয়াক্রান্ত মূত্রনাগীতে জ্বালাবোধ (আকুইবা, কাঙ্ক) ; মূত্রত্যাগের অবস্তা এবং মূত্রত্যাগ শেষ হওয়ার সময় মূত্রনাগীকে জ্বালাইয়া ; মূত্রত্যাগের আভ্যন্তরিক কালেও মূত্রনাগীর সমুখ ভাগে জ্বালা-

যুক্ত বেদনা, যাহার দরুণ রোগী অনবরত মূত্রত্যাগ করিতে বাধ্য হয় ; মূত্র ত্যাগের সময় যেরূপ হয়, মূত্র ত্যাগের আভ্যন্তরিক কালেও মূত্রনালীর সম্মুখ ভাগে সেরূপ চাপাবোধ ; মূত্র ত্যাগের আভ্যন্তরিক কালে মূত্রনালীতে স্থলীবিধানের জ্বায় অহুত হইয়া গা শিহরিয়া উঠা ; মূত্রনালী সোজা না হইয়া একা বাঁকা হইলে যেরূপ হয়, মূত্রত্যাগ করার সময় মূত্রনালীতে সেরূপ অহুত হয় ; মূত্র সন্ধাৰে পড়ে এবং মূত্র পড়িতে পড়িতে মূত্র নিঃসরণ বন্ধ হইয়া যায় (ক্যাছ) ।

* জননেন্দ্রিয় । পুরুষাঙ্গ ক্ষতি, কিন্তু উহা বিশেষ খাড়া হয় না ; পুরুষাঙ্গ বারম্বার খাড়া হইয়া তৎপর মূত্র নালীতে স্থলী বিধানের জ্বায় অহুত হয় ; ক্ষত হইলে বা পুড়িয়া গেলে যেরূপ হয়, চলিবার সময় পুরুষাঙ্গের অগ্রভাগ এবং উহার আনরক চর্ম্ম কাণ্ডে লাগবর্ণ হয় ; দাঁড়াইয়া থাকিলে অণ্ডকোষে কসিরা বা চাপিয়া ধরাব জ্বায় বেদনা (বার্কেরিম্) ।

স্থানযন্ত্র । প্রাতঃকালে বায়ুনের নিম্নভাগে কঠিন শ্লেষ্মার সঞ্চায় যাহা গলায় থেকুর দিয়া বা কাশিলে নির্গত হয় এবং কাশি ও গলায় থেকুর দেওয়ার দরুণ বায়ুনল অত্যন্ত বেদনাযুক্ত হয় বা টাটায় এবং অবশেষে শ্লেষ্মা তরল হয় ও রোগী বারম্বার কাশিবা বা গলায় থেকুর দিয়া শ্লেষ্মা বাহির করিতে বাধ্য হয় ; গলাব মধ্যের গভীরতম অংশ হইতে যেন কাশির উদ্বেক হয় এবং কাশিতে কাশিতে গলা দিয়া লোন্‌তাসাদ বিশিষ্ট এক প্রকারের তরল পদার্থ নির্গত হয় ; বক্ষাহির মধ্যদেশে কসিরা বা চাপিয়া ধরার জ্বায় বেদনার দরুণ স্থানকষ্ট এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে নিদ্রাবেশ ; বুকের মধ্যে কষ্টাশুভব ; গলার মধ্যে আঁটাবোধ, যাহার দরুণ রোগী দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিতে বাধ্য হয় ; বক্ষাহির উপবিভাগের নীচে খনন করার জ্বায় বেদনা, কিন্তু উহার দরুণ স্থানকষ্ট হয় না ।

হৃৎপিণ্ড । নড়িলে বা ঘাড় হেট করিয়া উপুড় হইলে জ্ঞানক আকারের হৃৎস্পন্দন এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে হৃৎপ্রদেশে উত্তাপভব ।

নিদ্রা । ঘুমাবলোরে ভয়ানক অসন্তোষ জনক স্বপ্ন দেখা এবং তদ্রূপ মনের উদ্বেগ এবং হতাশ ; ভয়ানক স্বপ্ন দেখিয়া ঘুম ভাঙিয়া যায় এবং সে কোথায় রহিয়াছে রোগী তাহা বুঝিতে পাবে না ।

ব্যবহার । তদ্বৎ প্রমেহ রোগে যখন একোনাইট ব্যবহার করিয়া প্রবল লক্ষণাদির অনেক হ্রাস হইয়া কেবল পূর্বাদি নির্গত হয় ; মূত্রাধারের প্রদাহ ; মূত্রকোষ প্রদাহ ; মূত্র ক্রচ্ছ বা মূত্রাবরোধ এবং অন্ত্যস্ত প্রকারের মূত্র বস্ত্রের রোগ ; ফুফুস প্রদাহ ; শ্বাসকষ্টে সম্বলিত রোগ ; হৃৎপিণ্ডের প্রদাহ ; চক্ষুর কর্ণিরার অস্বচ্ছতা (Opacity of the Cornea) ; চক্ষে ছানিপড়া (Cataract) ইত্যাদি অস্থখে ক্যানাবিস্ স্কাটাইবা ব্যবহার্য্য । এই ঔষধ দ্বারা ডাক্তার কুইন্ (Dr. Quin) একটী আধকপানীয়া মাথা বাথা (Hemierania) আক্রান্ত রোগীকে আরাম করিয়াছেন এক্ষণ ব্রিটিশ জার্নেল অব হোমিওপ্যাথী (British Journal of Homœopathy) নামক চিকিৎসা বিষয়ক সাময়িক পত্রিকায় পাঠ করা গিয়াছে ।

বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ । যেন ফোঁটার ফোঁটার ঠাণ্ডা জল পড়িতেছে মাথায় এক্ষণ অনুভূত হয় ; শুষ্কতার দিয়া বা হৃৎপিণ্ড হইতে যেন ফোঁটার ফোঁটা ঠাণ্ডা জল পড়িতেছে এক্ষণ অনুভূত হয় ইত্যাদি ক্যানাবিস্ স্কাটাইবার বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ ।

সমগুণ বিশিষ্ট ঔষধ । মূত্রবস্ত্রের উপর ক্যানাবিস্ স্কাটাইবার কার্য্য অনেকটা এপিস্, ক্যান্ডারিস্, কোপেইবা এবং টিরিবিথিনার ত্রায় । চক্ষের উপর ইহার কার্য্য ইউক্লেসিয়ার ত্রায় । এতদ্ভিন্ন কোন কোন বিষয়ে ইহার কার্য্যের সঙ্গে আণিক। এবং নাক্স-বমিকার কার্য্যের সাদৃশ্য আছে ।

প্রতিষেধক ঔষধ । ক্যাম্ফার । অধিক মাত্রায় দিকি খাইয়া বিবাক্ত হইলে লেবুর রস, তেঁতুলগোলা, দধি ইত্যাদি টক দ্রব্য ব্যবস্থা ।

ডাইলুশন বিচার । প্রমেহ রোগে ক্যানাবিস্ স্কাটাইবার মূল আর্য্যকের ১ ফোঁটা হইতে ১০ ফোঁটা পর্য্যন্ত ব্যবহৃত হইয়া থাকে । ডাক্তার ইল্‌ডাম্ (Dr. Yeldham) বলেন যে, প্রমেহ রোগে অধিক মাত্রায় মূল আর্য্যক ব্যবহার না করিয়া মিশ্র আর্য্যক দ্বারা প্রমেহ রোগের চিকিৎসা করা এক প্রকার সময় নষ্ট বলিলেও অতুক্তি হয় না । এতদ্দেশে ১৯-দশমিক ডাইলুশন ব্যবহার করিয়াই প্রমেহ রোগের চিকিৎসায় আমরা যথোচিত ফল পাইয়া থাকি । আবার ডাক্তার হেল্মথ্ (Dr. Helmutb) বলেন তিনি অনেক পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে প্রমেহ রোগে ১২ ক্রম ব্যবহারে

বিশেষ কল পাওয়া যায়। চক্ষে ছানি পড়া (Cataract), কর্ণিয়ার অস্বচ্ছতা (Opacity of the Cornea), ফুফুস প্রদাহ, হৃৎপিণ্ডের প্রদাহ, আধ-কপালিয়া মাথাব্যথা ইত্যাদি অল্পে ১২, ১৮ এবং ৩০ ডাইলুশন ব্যবহার্য্য। চক্ষে ছানি পড়ার প্রথমাবস্থায় ২০০ ডাইলুশন ব্যবহার করিয়া একটা রোগীর চিকিৎসায় লেখক বিশেষ উপকার পাইয়াছেন।

ক্যাপ্সিকাম্ আনুয়াম্, -(লাল মরিচ),- ক্যাপ্স্

(CAPSICUM ANNUUM,-CAPS.)

বড় বড় লাল মরিচের ধোনা (চোকুনা) এবং বিচি যথানিয়মে রেক্ট-ফাইড্ স্পিরিটে ভিজাইয়া মূল আরোক প্রস্তুত হইয়া থাকে।

সাধারণ ক্রিয়া । শৈল্পিকবিল্লী, প্রধানতঃ আহার বহা নালী (Alimentary Canal) এবং মূত্রনালীর শৈল্পিকবিল্লীর উপরই ইহার কার্য্য অতি প্রবল দেখিতে পাওয়া যায়, যাহার দরুন উক্ত বস্তাদি উত্তেজিত হইয়া প্রবাহযুক্ত হওয়ার উপক্রম হইয়া থাকে। আবার স্থানযন্ত্রেব শৈল্পিক বিল্লীর উপরও হস্ত উক্ত প্রকারে কার্য্য করিয়া থাকে। লাল মরিচ বাটিয়া গায় মাথাইরা দিলে ঘেৰুপ হয়, আক্রান্ত বস্তাদিতে সেৰুপ জ্বালা উৎপাদন করা এই ঔষধের একটা বিশেষ প্রাকৃতিক গুণ বা শক্তি মধ্যে পরিগণিত।

সাধারণ প্রাকৃতিক লক্ষণ ।

মন । চূপ মারিয়া থাকা, চিড়্ চিড়্ করা, একগোঁয়েমী, সহজেই বিরক্ত হওয়া (নাঙ্ক-বম্); সর্ব্বদা বাড়িতে বা আপন দেশে থাকিবার ইচ্ছা (হেলিবোরান্, ফস্-আন্) এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে গাল লালবর্ণ এবং টল্-টলে, নিদ্রাশূন্যতা, মুখগহ্বরের পশ্চাত্ভাগে উষ্ণাশুভব; শিশুগণের সর্ব্বলব্ধি বিত্তী মরলায় থাকার ইচ্ছা।

মস্তক । সবিরাম বা পালাজ্বরের নীতলাবস্থায় মাথাঘোরা; শিরঃ-পীড়া, যাহার দরুন মর্মে হয় যেন মাথার ছাড় কাটিয়া যাইবে (ব্রাই, চায়না, নেট্রাম্-মিউর, মার্ক্, পাল্); কাশিলে, মাথা নাড়িলে অথবা

চলিয়া বেড়াইলে মাথা ধরা (ব্রাই); কপালে চাপিয়া ধরার স্থায় বেদনা বাহা ডাইন পার্শ্বেই অধিক অনুভূত হয়; কপালে দণ্ডপিয়া বেদনা; কপালের হাড়ে, প্রধানতঃ ডাইন পার্শ্বের হাড়ে, কসিয়া ধরা বা ছিঁড়িয়া ফেলার স্থায় বেদনা; কর্ণের পশ্চাৎভাগে চাপিয়া ধরার স্থায় বেদনা; মাথার বাম পার্শ্বে কসিয়া ধরা বা ছিঁড়িয়া ফেলার স্থায় বেদনা ।

চক্ষু । কাকর বা বালির কণাদি প্রবিষ্ট হইলে যেরূপ হয়, চক্ষের মধ্যে সেক্রণ চাপিয়া ধরার স্থায় বেদনা; চক্ষু যেন লালচে, বড় এবং বহির্দিকে আকৃষ্ট বলিয়া অনুভূত হয় ।

নাসিকা । মর্দি এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে প্রবল হাঁচি এবং নাক দিয়া তরল স্লেষ্মা নির্গমন ও কখন কখন নাকের মধ্যে জ্বালা, স্ফুটন এবং থস্‌থস্‌বেদন; মর্দি শুকাইয়া বা বসিয়া যাইয়া নাকের মধ্যে স্ফুটন এবং কুটকুটানি; নাক দিয়া রক্ত পড়া ।

কর্ণ । কর্ণের পশ্চাৎভাগের ক্ষীতি এবং তদ্রূপ অত্যন্ত বেদনা; কর্ণের নিকটবর্তী যে অংশ, মাড়ির হাড়েব সে অংশের হাড়ে পোকায় ধরা (Caries) (অরাম); বাম কানের পশ্চাৎভাগে ছিঁড়িয়া ফেলার ন্যায় বেদনা, কাশিলেই যাহা অধিক অনুভূত হয় ।

মুখমণ্ডল । মুখমণ্ডলে হাড়েব মধ্যে বেদনার ন্যায় বেদনা, চাপিলে বা স্পর্শ করিলে যাহার উদ্বেগ হয়; গাল লালবর্ণ, কিন্তু উষ্ণ নহে, যাহা কখন কখন সাদা বা ফিকা হয়; ওষ্ঠ ফাট, কাটাযুক্ত এবং উহাতে উদ্ভুটানি বা চিড়িকমারা ।

মুখগহ্বর এবং গলার মধ্যে । মুখে জ্বর্ণক (আর্ণিকা, চিনিলাম্-আর্স, হিপ্পো-সাল্ফ, ফ্রিয়াজ, মার্ক, নাটটিক্-আর্স); মুখে কঠিন স্লেষ্মার স্থায় পদার্থের সঞ্চার; মুখে জলের স্থায় স্বাদ বা কোন স্বাদই থাকে না এবং তৎপর বুক জ্বালা । গলার মধ্যে জ্বালা (একন্, আর্স, ক্যান্থ, মার্ক-কর) এবং বেদনা, গিলিবার আভ্যন্তরিক কালে বাহার বৃদ্ধি হয়; বেদনামুক্ত ক্ষীতি বা ঘা থাকিলে যেরূপ হয়, কাশিবার সময় গলার মধ্যে সেক্রণ বেদনা; গলার মধ্যের আক্ষেপিক সন্ধোচন (বেল, কার্বো-বেজ, হায়োস্, ট্রায়ন) ।

পাকস্থলী এবং উদর । পাকস্থলীতে জ্বালাভূতব (আর্স,

ক্যাম্ফার, ক্যাহ্), আহারের পর বাহ্যে অধিক অম্লভূত হয় ; বৃকে জ্বালা ; মুখ দিয়া জল উঠা ; বমন ও বমনোদ্বেগ এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে মাথাধরা ; স্নায়বিক, আক্ষেপিক বমন ; শীতের সঙ্গে সঙ্গে তরল শ্লেষ্মার তায় পদার্থ বমন ; সাংঘাতিক আকারের জ্বরের সঙ্গে বমন ; পাকস্থলী বরফের তায় ঠাণ্ডা এবং তৎপর পাকস্থলীর ক্যাপনি ও উহাতে জ্বালাভব এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে সময়ে সময়ে জ্বাল উদ্‌গার উঠা । পেট ক্যাপিলে ঘেরূপ হয়, উদর হইতে বৃক পর্যন্ত কসিয়া ধরার তায় সেরূপ কষ্টানুভব ; উদরে দৃষিত বায়ুর (Flatulence) সঞ্চার হেতু শূল বেদনা (কলোস্, লাইকোপ্), বা পেটে কসিয়া বা মোচড়াইয়া ধরার তায় বেদনা ; উদর ক্ষীণ এবং বিস্তৃত, যাহার দরুণ যেন স্বাস্রোধ হওয়ার উপক্রম হয় ।

মল এবং মলদ্বার । বারম্বার কষ্টদায়ক কোঁথপাড়া এবং পেট-কামড়ানী (মার্ক্) ; গুহদ্বারে জ্বালাভব (মাস্, ক্যাহ্) ; অশ্রোগ, বাহার দরুণ গুহদ্বার জ্বালা করে এবং চুলকায় (মলিফ্) ; শ্লেষ্মাভেদ ; বারম্বার রক্ত মিশ্রিত বা রক্তের ছিটযুক্ত শ্লেষ্মা ভেদ এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে বারম্বার কষ্টদায়ক কোঁথপাড়া এবং পেট কামড়ানী (মার্ক্-কর) ; জলাদি পানের পর উক্ত প্রকারের দাস্ত হওয়া ; প্রত্যেকবার দাস্তের পর পিপাসা এবং প্রত্যেকবার জলাদি পানের পর শীত কম্প ।

মূত্রবন্ধ । প্রস্রাব করার পব মূত্রনালীতে জ্বালা এবং চিড়িক মারা (কাহ্, ক্যানাবিস্-স্তাট্) ; মূত্রত্যাগের সময় এবং উহার পূর্বে ও পর মূত্রনালীর মুখে জ্বালাভব (কাহ্, ক্যানাবিস্-স্তাট্) ; মূত্রত্যাগের আভাস্তবিক কালে মূত্র নালীর সম্মুখভাগে ও উহার মুখে স্থলীবিধানের তায় অম্লভূত হওয়া (ক্যানাবিস্-স্তাট্) ; মূত্রকৃচ্ছ এবং মূত্রত্যাগের সময় কোঁথপাড়া (কাহ্, মার্ক্-কর) ; জ্বালা উৎপাদক মূত্রত্যাগ ।

জননেন্দ্রিয় । পুরুষের ধবজভঙ্গ ; অণ্ডকোষাধার ঠাণ্ডা (বার্কেরিস্) ; মূত্রনালীনিয়া হৃদয়ের লনির তায় পুঁথ নিঃসরণ ; অণ্ডকোষ ছোট হইয়া যাওয়া ।

স্বাসদযন্ত্র । বায়ুনল এবং কণ্ঠনালীতে হানা দেওয়ার তায় হৃৎ হৃদী এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে গুরু শ্বশ্বশে কাশি ; প্রথম রাত্রে শয়নের পর উক্ত প্রকারের কাশি (হায়োস্) ; কাশিবার সময় যেন কুফুস হইতে এক

প্রকারের দুর্গন্ধ বাহির হয় (ক্রোকাশ্, সাক্সুনেরিয়া) ; শ্বাসকষ্ট এবং বৃকে বেদনা ; বৃকে অত্যন্ত পূর্ণবোধ ; বৃকে অত্যন্ত আঁটাবোধ ; বৃকে দপ্পদপিয়া বেদনা ; শ্বাসকষ্ট যাহা উদরের অস্থত্বের দরুণ বলিয়া অনুভূত হয় ।

গ্রীবা এবং পৃষ্ঠদেশ । গ্রীবার ডাইন পার্শ্বের গ্রন্থিতে চিড়িক যারা এবং ছিঁড়িয়া ফেলার জ্বর বেদনা ; মেরুদেশে এবং উহার নিকটবর্তী স্থানে কসিয়া ধরা বা ছিঁড়িয়া ফেলার জ্বর বেদনা ।

নিম্নাঙ্গ । উরুর সন্ধি হইতে হাঁটু এবং পায়ের পাতার সন্ধি পর্যন্ত ঘোঁচা বিধা বা ছিঁড়িয়া ফেলার জ্বর বেদনা, কাশিনেই যাহা অধিক অনুভূত হয় ; উরুর সন্ধিতে কসিয়া ধরার জ্বর বেদনা, স্পর্শনে এবং শরীর পশ্চাদ্বাদিকে বাকিয়া পড়িলে যাহার বৃদ্ধি হয় ; হাঁটুর সন্ধিতে বাটিয়া বা কসিয়া ধরার জ্বর বেদনা ।

নিদ্রা । হাঁইতোলা ; অস্থির নিদ্রা ; ঘুমেরষোবে স্বপ্ন দেখা ।

জ্বর । পৃষ্ঠদেশ হইতে শীত আরম্ভ হয় (ইউপেট্-পাপূর, ল্যাক) এবং শীতের সঙ্গে সঙ্গে পিপাসা ; জ্বলাদি পানের পর শীতের বৃদ্ধি হয় ; প্রত্যেকবার জ্বলাদি পানের পর শীত কম্প (টারেক্স) ; শীতের পর ঘর্ম বা উষ্ণাবস্থা ও উহার সঙ্গে সঙ্গে ঘর্ম এবং পিপাসা ; শরীর অত্যন্ত উষ্ণ এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে গায় অত্যন্ত জ্বালা (একন্, আন্) । বাথরগঞ্জ, চট্টগ্রাম, নোরাখালি ইত্যাদি লোণা জল বিশিষ্ট স্থানের জ্বরে ক্যাপ্সিকাম্ বিশেষ উপকারী লেবক পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন ।

ব্যবহার । কাকিপানের অপব্যবহার জনিত অস্থ ; কোইনাইনের অপব্যবহার জনিত বা কোইনাইনের আট্‌কান জ্বর ; সর্দি ; তালু-কার পার্শ্বস্থিত গ্রন্থি বা টন্সিল প্রদাহ (Tonsillitis) ; ডিপ্‌থিরিয়া (Diphtheria) ; আরক্ত-জ্বর ; অজীর্ণ রোগ ; উদরাময় ; আমাশয় ; মুখদিয়া জল উঠা ; হিক্কা ; অর্শরোগ ; নৃত্রাধার প্রদাহ ; নৃত্রাধারের মৈথ্রিক রোগ ; তক্ষণ এবং পুরাতন আকারের প্রমেহ রোগ ; সবিরাম বা পালাজ্বর, বিশেষতঃ লোণা স্থানের ; কান দিয়া পুঁবা দি পড়া ; কর্ণ প্রবাহ ; বৃক জ্বালা বা পেটে জ্বালা সম্বন্ধিত শূল বেদনা ইত্যাদি অস্থত্বে এই ঔষধ ব্যবহার্য ।

বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ । অক্রান্ত স্থানের নানা অংশে জ্বালা ।

এবং চিড়িকমারী ; নড়াচড়াতে অনিচ্ছা ; আক্রান্ত স্থানে অসাড়বোধ ; ইন্ড্রিয়াদির অতিরিক্ত চেতনা ; শীতলাবস্থা দীর্ঘকাল স্থায়ী এবং উষ্ণাবস্থার স্বর্ণ ; কাশি রোগে প্রত্যেকবার কাশিকার সময় কানে বেদনা ; মাভাল-দিগের অজীর্ণরোগ ; কাশিবার সময় ফুফুস হইতে পচা দুর্গন্ধ বাহির হওয়া ; প্রাতঃকালে ঘুম ভাঙিলে, সন্ধ্যার সময় আহারের পর, জ্বলাদি পানের পর, ঠাণ্ডা লাগিলে অথবা অঙ্গ চাণনা করার প্রারম্ভে অস্থির বৃদ্ধি এবং উত্তাপে ও ক্রমাগত নড়াচড়াতে অস্থির উপশম ইত্যাদি ক্যাপ্সিকামের কতকগুলি বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ । যাহারা মোটা, অলস, অপরিষ্কার, চিড়্ চিড়ে এবং সামান্ত কারণেই বিরক্ত হয়, তাহাদিগের পক্ষে এই ঔষধ বিশেষ উপকারী ।

সমগুণবিশিষ্ট ঔষধ । ক্যাপ্সিকামের কার্যের সঙ্গে আর্জেন্টাম্ নাইট্রিকাম্, আর্সিনিকাম্, ক্যালেলিডিয়াম্, ক্যাস্টোরিস্, চায়না, ক্রোটন, ইগনেসিয়া, লাইকোপডিয়াম্, নাক্স-বমিকা, পালসেটীলা, ইউফর্সিয়াম্ এবং বিরেটাম্ আল্‌বামের কার্যের সাদৃশ্য আছে ।

প্রতিষেধক ঔষধ । ক্যালেলিডিয়াম্, ক্যাস্কার, সিনা, চায়না, সাল্‌ফার ।

ডাইলুশন বিচার । হানিমানের মতে ৯ম ডাইলুশন ব্যবহার্য্য । জ্বর রোগে ৬ এবং ১২ ডাইলুশন ব্যবহার করিয়া বিশেষ ফল পাওয়া যায় । কোন কোন চিকিৎসক ৩০ ডাইলুশনও ব্যবহার করিয়া থাকেন । অজীর্ণ এবং আমাশয় রোগে ৩য় এবং ৬ষ্ঠ ডাইলুশন উপকারী । প্রমেহ রোগ, বুক জ্বালা ইত্যাদিতে ১ম দশমিক ক্রমের আরোক ব্যবহারে বিশেষ ফল পাওয়া যায় । সংক্ষেপে ইহা বলা যাইতে পারে যে, ১ হইতে ১২ ডাইলুশনের মধ্যে সকল ডাইলুশনই ব্যবহার্য্য । বুক বা পেটে জ্বালা সম্বলিত শূল বেদনার শূল আরোক ২।১ ফোঁটা মাত্রায় বিশেষ উপকারী । এমন কি, ২।১ মাত্রা সেবনেই শূল বেদনা সারিয়া যাইতে দেখা গিয়াছে ।

কলোফিলাম্ থ্যালিকট্রয়েড্‌স্,-কলোফ্ (CAULOPHYLLUM THALICTROIDES,-CAULOPH.)

উত্তর আমেরিকার এই গাছ জন্মে। ইহার শিকড় যথা নিয়মে প্রফ্-স্পিরিটে ভিজাইয়া মূল আরোক প্রস্তুত হইয়া থাকে। ইহার শুঁড়াও প্রস্তুত হইয়া থাকে। শুঁড়াকে কলোফিলিন্ বলে।

সাধারণ ক্রিয়া। জীজনেনেদ্রিয়ার পৈশিক অংশ, জরায়ুর গতি উৎপাদক দ্রাব্য এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পেশী ও সন্ধির উপর ইহার কার্য্য অতি প্রবল।

সাধারণ প্রাকৃতিক লক্ষণ।

মস্তক। বাত জনিত বা দ্রাব্যশূল লনিত মাথা ধরা, জীলোককেই যাহা অধিক আক্রমণ করিয়া থাকে (নিমিসিল্); জরায়ুর অস্থল লনিত মাথাধরা।

চক্ষু। চক্ষুর পশ্চাৎভাগে চাপাবোধ; চক্ষু দিয়া প্রচুর পরিমাণে জল পড়া।

মুখমণ্ডল। ফপালে (জীলোকের) একপ্রকার কীটজ (Parasitic) ক্ষুদ্রুড়ী এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে খেতপ্রদর।

মুখগহ্বর এবং গলার মধ্য। দাঁতে টাটানি এবং উহা যেন লম্বা হইয়াছে এরূপ অনুভূত হয়; জিহ্বা সাদা লেপযুক্ত; মুখগহ্বরে শুষ্ক এবং উষ্ণানুভব। মুখগহ্বরের ঠিক পশ্চাৎদেশে অত্যন্ত কষ্টানুভব, যাহার দরুন বারম্বার ঢোক গিলিবার ইচ্ছা যায়।

পাকস্থলী এবং উদর। কাঠ উদগাব উঠা; বারম্বার গলাদিয়া তিক্ত বা টকস্বাদ বিশিষ্ট জল উঠা এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে মাথাঘোরা; জরায়ুর উত্তেজনার সঙ্গে সঙ্গে আক্ষেপিক বমন, পাকস্থলীতে বেদনা, অত্যন্ত বমনোদ্বেগ; অজীর্ণ এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে আক্ষেপিক লক্ষণ; জরায়ুর উত্তেজনার দরুন অজীর্ণ। গতিউৎপাদক দ্রাব্য উত্তেজনা এবং বাতের দরুন অস্ত্রের পৈশিক অংশের আক্ষেপিক ক্রিয়া।

জী-জনেনেদ্রিয়। মনে হয় যেন জরায়ুতে রক্তাবরোধ হইয়াছে

এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে তলপেটে পূর্ণ এবং আঁটবোধ (আলোজ, বেল্, সিমিসিফ, পাল্‌স) ; জরায়ু এবং তলপেটের নানা স্থানে আক্ষেপিক বেদনা ; রক্তস্রাব এবং উহার দরুণ পেটে বেদনা ; জরায়ুর মুখ ও গ্রীবা মোচড়াইয়া পড়া ; রক্তরোধ এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে জরায়ুর আক্ষেপ বা উহার জড়তা (সিমিসিফ) ; আক্ষেপিক আকারের কষ্টকর রক্তস্রাব এবং বাধকের বেদনা ; গর্ভস্রাব এবং সে সময়ে তলপেটে বেদনা অত্যন্ত মূহ, অনিয়মিত এবং আক্ষেপিক আকারের হয় ; মূহ বা অপ্রচুর আক্ষেপিক প্রসব বেদনা (জেল্‌স) ; জরায়ুর মুখের আক্ষেপিক কঠিনতার দরুণ মূহ বা অপ্রচুর প্রসব বেদনা (বেল্, সিমিসিফ, জেল্‌স) ; গর্ভস্রাব বা সন্তান প্রসবের পর জরায়ু হইতে রক্তস্রাব (চারনা) ; সন্তান প্রসবের পর জরায়ুর জড়তার দরুণ অনেকদিন ধরিয়া ক্রোধ বা লোকিয়া নিঃসরণ ; জরায়ুর সঘিরাম সংকোচন (সিকেল্‌ কণ্টাম্‌) ; অনেক কষ্টে সন্তান প্রসবের পর পেটে বেদনা ।

শ্মান যন্ত্র । বৃক এবং কঠিনাঙ্গীর আক্ষেপিক অস্থখ ।

অঙ্গ, প্রত্যঙ্গ, হাত, পা ইত্যাদি । ক্ষুদ্র সন্ধিবাতে (আক্টিরা স্পাইক্‌, লেডাম্‌) বাহু এবং পায়ের স্থানে স্থানে বেদনা যাহা এক স্থানে অনেকক্ষণ থাকে না ; বাহু, পা, হাত এবং পায়ের পাতার সন্ধিতে কদিয়া ধরার দ্বায় বেদনা । মণিবন্ধ এবং হাতের আঙ্গুলের সন্ধিতে অত্যন্ত প্রবল বেদনা ; হাতের আঙ্গুল অত্যন্ত শক্ত হয় বা উহা নোয়ান যায় না ; মুট করার সময় হাতের আঙ্গুলের সন্ধিতে কর্তনবৎ প্রবল বেদনা ।

ব্যবহার । অস্বাভাবিক প্রসববেদনা ; সন্তান প্রসবের পর পেটে বেদনা, ক্রোধ (Lochia) নিঃসরণ ; গর্ভস্রাব ; কষ্টকর রক্তস্রাব এবং বাধকের বেদনা (Painful menstruation) ; রক্তরোধ ; জরায়ু হইতে অতিরিক্ত রক্তস্রাব (Metrorrhagia) ; জরায়ু স্থানভ্রষ্ট হওয়া (Prolapsus uteri) ; নিম্নাঙ্গের পক্ষাঘাত ও উহার সঙ্গে সঙ্গে জরায়ুর গ্রীবা এবং মুখ মোচড়াইয়া পড়া এবং জরায়ুতে রক্তাধিকা বা রক্তারোধ ; জ্রীলোকের ঘোবন কালে হিষ্টিরিয়া, কমেসক্কার উত্তেজনা এবং কোরিয়া (Chorea) ; জ্রীলোকের ঘোবনাবস্থা, হিষ্টিরিয়া বা মূগী রোগের আক্রমণ বা আক্ষেপ ; ক্ষুদ্র সন্ধি (লেডাম্‌), বিশেষতঃ মণিবন্ধ এবং আঙ্গুলের ক্ষুদ্র সন্ধিবাতে ; মূহ

এসব বেদনা যাহা আর্গট্ দিয়াও প্রবল হয় না ; কৃত্রিম এসব বেদনা ইত্যাদিতে কলোফিলাম্ ব্যবহার্য্য ।

বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ । জীলোকের অস্থখেই কলোফিলাম্ বিশেষ উপকারী ।

সমগুণ বিশিষ্ট ঔষধ । কলোফিলামের কার্যের সঙ্গে সিমিকি-উগা, পালসেটীলা এবং সাবাইনার কার্যের বিশেষ আদৃশ্য আছে । এতদ্ভিন্ন কোন কোন বিষয়ে ইহার কার্যের সঙ্গে সিকেল্-কর্নুটাম্ এবং সাব-ডিলার কার্যেরও সাদৃশ্য আছে ।

ডাইলুশন বিচার । কলোফিলামেব মূল আরোক বা ১ম দশমিক ক্রমের আরোক এবং কলোফিলিনের ১ম হইতে ৬ষ্ঠ দশমিক ক্রমের গুঁড়াই সচরাচর অধিক ব্যবহৃত হইয়া থাকে ।

সিড্রন্,-সিড্রন্

(CEDRON,-CEDRON)

নিউগ্রানেনডা এবং মধ্য আমেরিকায় এই গাছ জন্মে । ফলের বিচি যথা নিয়মে রেক্টিফাইড্ স্পিরিটে ভিজাইয়া ইহার মূল আরোক প্রস্তুত হইয়া থাকে ।

সাধারণক্রিয়া । মস্তিষ্ক, কসেরুকা মর্জ্জা এবং সিম্প্যাথেটিক্ স্নায়ু মণ্ডলের উপর ইহার কার্য্য অতি প্রবল, যাহার দরুনু মস্তিষ্কে রক্তাধিক্য বা রক্তাবরোধ হয় এবং তৎপর ভিজা শেত্শেতিয়া, উষ্ণ, নিম্ন জ্বাভূমীতে বেরূপ হয়, সেরূপ সবিরাম-অব উৎপন্ন হইয়া থাকে । প্রতি দিন ঠিক এক সময়ে রোগের আক্রমণ এই ঔষধের একটী বিশেষ প্রাকৃতিক নির্দিষ্ট লক্ষণ ।

ব্যবহার । যে প্রকার সবিরাম বা পালাজর কোন মতেই সাধে না এবং যাহার সঙ্গে সঙ্গে মস্তিষ্কের উত্তেজনা বর্তমান থাকে ও যাহা কোন চিকিৎসায়ই না থামিয়া রোগীকে বারম্বার আক্রমণ করে এবং যাহা ভিজা শেত্শেতিয়া, গ্রীষ্ম ঋতান, জলাশয় বিশিষ্ট স্থানে বাসের দরুনু উৎপন্ন হয়, সে

প্রকার সবিরাম বা পালা অরেই সিড্রুন্ বিশেষ উপকারী। ডাক্তার কাসানোবা (Dr. Casanova) বলেন যে, যে সকল রোগী গ্রীষ্ম প্রধান দেশে বাস করে, তাহাদিগের অস্থুথেই এই ঔষধ অধিক উপকারী। তিনি আরো বলেন যে, কোইনান্ এবং আর্সিনিকের ছায় ইহা আন্টিপিরিয়োডিক্ (Anti-periodic) ঔষধের ছায় কার্য্য করিয়া থাকে। অতএব স্নায়ুশূল, সবিরাম জ্বর ইত্যাদি যাহা কোন নির্দিষ্ট সময়ে রোগীকে আক্রমণ করিয়া থাকে, সে সকল রোগেই তিনি সিড্রুন্ ব্যবহার করিয়া বিশেষ ফল পাইয়া থাকেন। তিনি আরো বলেন যে, যেসকল দ্রীলোকের প্রত্যেকবারই ঠিক এক নির্দিষ্ট সময়ে গর্ভশ্রাব হয় তাহাদিগের গর্ভশ্রাব নিবারণের পক্ষে সিড্রুন্ সর্বোৎকৃষ্ট ঔষধ মধ্যে পরিগণিত। ডাক্তার আলেন্ (Dr. Allen) এবং ডাক্তার নর্টন্ (Dr. Norton) বলেন যে, চক্ষুর আইরিস প্রদাহ (Iritis), চক্ষুর কোরয়েড্, কিল্লী প্রদাহ (Choroiditis) এবং চক্ষুর অন্ত্রাচ্ছ গভীরতম অংশের যে প্রকার প্রদাহে চক্ষুর উপরিভাগে বেদনা থাকে, তাহার চিকিৎসায় এই ঔষধ দ্বারা তাহারা বিশেষ ফল পাইয়া থাকেন। দক্ষিণ আমেরিকাতে সিড্রুন্ বিবাক্ত স্বর্ণের কামড়ের এক অব্যর্থ (Specific) ঔষধ মধ্যে পরিগণিত। ইহার কার্য্যের সঙ্গে আর্সিকা চায়না, জেল্‌সিমিয়াম্ এবং ল্যাকেসিমের কার্য্যের সাদৃশ্য আছে।

ডাইলুশন বিচার। জ্বর রোগে ২য় এবং ৩য় ডাইলুশনই আশ্রয় সচরাচর ব্যবহার করিয়া থাকি। টেষ্টির (Taste) মতে ৬ষ্ঠ ক্রমের আরোক্ত অধিক উপকারী। স্নায়ুশূলদি অস্থুপ যাহা নির্দিষ্ট সময়ে রোগীকে আক্রমণ করে, তাহাতে ৬ষ্ঠ ক্রম বিশেষ উৎকারী।

সিকুটা বিরোসা,-সিকুটা

(CICUTA VIROSA, - Cic. V.)

উত্তর এবং মধ্য ইউরোপ, কসিয়াস্থ আদিয়া এবং উত্তর আমেরিকার এই গাছের জন্ম। ইংলণ্ড, স্কটল্যান্ড এবং আয়ারলণ্ডেও ইহা প্রচুর পরিমাণে জন্মে। ইহার কাঁচা শিকড় যথানিয়মে প্রক্‌স্পিরিটে ভিজাইয়া মূল আরোক্ত প্রস্তুত হইয়া থাকে।

সাধারণ ক্রিয়া। ইহা মস্তিষ্ক এবং কসেরূকা সর্জার উত্তেজক স্বরূপ কার্য্য করিয়া থাকে, যাহার দরুণ ধমুঠেকার, মৃগীরোগ এবং মৃগীরোগের জ্বর আক্ষেপ, দাঁতলাগা এবং সর্কাজেই স্থানিক এমন আক্ষেপের উদ্রেক হয়, যাহার দরুণ আক্রান্ত অঙ্গাদি পর্য্যায়ক্রমে একবার প্রসারিত এবং একবার সংকুচিত হইয়া থাকে। ইহার কার্য্যের সঙ্গে নাক্স্ বমিকার কার্য্যের সাদৃশ্য আছে। তবে নাক্স্ বমিকাতে রোগীর কতক পরিমাণে চেতনা থাকে, সিকুটাতে মস্তিষ্কের পক্ষাঘাত হইয়া চেতনা একবারে থাকে না।

সাধারণ প্রাকৃতিক লক্ষণ।

মন। জন্মন, কৌথানি বা কৌকানি এবং চীৎকার করা (বিরেট্ আলব্); মনের বিকৃতি, গানকরা, অঙ্গ ভঙ্গি করিয়া নাচা এবং উচ্চৈঃস্বরে জয়ধ্বনী বা অস্ত্র কোন প্রকারের শব্দ করা (হায়োস্, ট্রায়ম্); নিস্তব্ধভাবে থাকার স্বভাব, সর্কাদা আপন অবস্থার সন্তুষ্ট এবং স্থখী থাকা; মনের অস্তাণ্ড জড়তা এবং তদরূপ কোন প্রকার মানসিক চিন্তার অশক্তি (হায়োস্, ওপিয়াম্); মনের উদ্বিগ্ন এবং কোন প্রকারের ছুঃখের কাহিনি শুনিয়া মন অত্যন্ত ব্যাকুল হওয়া।

মস্তক। মাথাঘোরা; মাথার বাকনি এবং স্পন্দন; মাথার পশ্চাৎভাগে ভরানক কন্কনিয়া বেদনা; মাথার আঘাত লাগিয়া মস্তিষ্কের কার্য্যাবরোধের দরুণ আক্ষেপ (কুপ্রায়্)।

চক্ষু। কোন বস্তু পানে একদৃষ্টে তাকাইয়া থাকা; চক্ষুর তারা বিস্তৃত এবং উজ্জ্বল আলোক জ্ঞানাদি রহিত হওয়া (বেল্, হায়োস্, ওপিয়াম্, ইনাই); চক্ষুর তারা প্রথমতঃ সংকুচিত এবং তৎপর বিস্তৃত হয়; এক বস্তু দুই চীত্ৰ দ্বারা দেখার (অরাম্, বেল্, ফাটিটোল্, ট্রায়ম্); সম্মুখস্থিত বস্তুগুলি যেন একবার আগে যায় এবং একবার পাছে যায়।

কর্ণ। কানে কম শুনা।

মুখমণ্ডল। মুখমণ্ডল লালবর্ণ, শিটা, ফিকা বা মলিন, মৃতবৎ (আস্, বিরেট্-আলব্); মুখাকৃতি বিকৃত, -হয় ভয় উৎপাদক, নতুবা ঘৃণা উৎপাদক (কুপ্রায়্); মুখমণ্ডলের পেশীর আক্ষেপ (আগারিকান্, ইগ্‌নেস্, নাক্স্-বম্)।

মুখগহ্বর ও গলার মধ্য । দাঁতে দাঁতে আঁটিয়া খাওয়া বা দাঁত লাগা (আবিসিহ, ইগ্নেস, সিনা, পডোক); জিহ্বার ধারে সাধা, বেদনামূলক, জালাহুত্ব কত; কণা বলিবার সময় দ্বিকা হইলে বেদনাপ্রবণ হয়, মাথায় স্বেদপ্রবণ হঠাৎ ব্যাকি লাগা; মুখে ফেলা উঠা (ককিউল, কুপ্রাম, লরোস, নেজা)। গিলিতে অশক্তি; গলার মধ্য যেন জুড়িয়া-যায়; গলার মধ্যে শুকাহুত্ব।

পাকস্থলী এবং উদর । অত্যন্ত পিপাসা (একন, ব্রাই, ক্যাম); প্রবল দ্বিকা (নাক্স-বম, হায়োস, ট্রামন, সিকেল, কর্ণটাম); পাকস্থলীতে জালাহুত্ব (আর্স, ক্যাম্ফার, ক্যাস); পাকস্থলীর মধ্যে ক্ষীতি এবং দপ্-দপনি; বমন এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে আক্ষেপ; পাকস্থলীর গভীরভাগ অংশে হঠাৎ ধাক্কা লাগা, যাহার দরুন আক্ষেপ হইয়া শরীর পশ্চাৎদিকে বাঁকিয়া পড়ে। উদরে গড়-গড়, কল কল এবং সোঁ-সোঁ শব্দ হওয়া; উদর ক্ষীত, বিস্তৃত এবং বেদনামূলক হয়।

মল । বারম্বার ভরল মলত্যাগ।

মূত্র । অসাড়ে বা অনিচ্ছাপূর্বক মূত্রত্যাগ (আর্স, বেল, হায়োস, ওপিয়াম); হয় অতিরিক্ত পরিমাণে মূত্রত্যাগ, নতুবা মূত্র একবারেই নির্গত হয় না।

জননেন্দ্রিয় । পুরুষের অশুকোষ উপরের দিকে আকৃষ্ট; পুরুষের গোড়ায় স্থচীবিধানের স্থায় বেদনা এবং স্নাত্তিতে যুগ্মেরঘোরে অনিচ্ছাপূর্বক ধাতু নিঃসরণ (স্বপ্নদোষ); স্ত্রীলোকের গোণে রজঃস্রাব; রজঃস্রাব রুদ্ধ হইলেই আক্ষেপ বা বেঁচনির উদ্ভেদ হয়; রজঃস্রাবের সময় গর্ভঘারের ঠিক উপরিভাগে ছিঁড়িয়া ফেলা বা কসিয়া ধরার স্থায় বেদনা; সন্তান প্রসবের সময় আক্ষেপ বা বেঁচনি।

শ্বাসযন্ত্র । বৃক্ কষ্টহুত্ব এবং শ্বাসরোধ হওয়ার উপক্রম হওয়া, যাহা বৃকের পেক্টোরেল (Pectoral) পেশীর আক্ষেপের দরুন ঘটিয়া থাকে (কুপ্রাম); বৃক্ আঁটাবোধ, যাহার দরুন নিশ্বাস গ্রহণে অত্যন্ত কষ্টহুত্ব হয়; বৃকের মধ্যে ঠাণ্ডাবোধ।

পৃষ্ঠদেশ । পৃষ্ঠদেশ ব্যাকিয়া ধনুকের স্থায় হয় (নাক্স-বম, ওপিয়াম); শ্বাসযন্ত্রের ঠিক উপরিভাগে ছিঁড়িয়া ফেলা বা চিড়িক্ মারার স্থায় বেদনা।

অঙ্গ, প্রত্যঙ্গ, হাত, পা ইত্যাদি । সমুদয় অঙ্গের কম্পন; বাহু এবং পায়ের হ্রস্বগতা; অঙ্গ প্রত্যঙ্গের আক্কেপিক বিকৃতি (দিনা); হঠাৎ খাঁকা লাগার পর অঙ্গ প্রত্যঙ্গের শক্তি একবারেই না থাকে। বাহু এবং হাতের আঙ্গুলের ঝাঁকনি বা স্পন্দন (কুপ্রীম); চলিবার সময় পায় শক্তি না থাকা। অতএব রোগী কাঁপিয়া কাঁপিয়া বা হেলিয়া টলিয়া চলে; এক পায়ের কাঁপনি।

নিদ্রা । বারম্বার ঘুম ভাঙ্গিয়া যায় এবং সমুদয় শরীরে ঘর্ম্ম হয়; রোগী আপনাকে আপনি হুহু বোধ করে; পূর্ন দিনেব ঘটনাগুলি স্মরণে স্পষ্ট দেখা।

চর্ম্ম । মুখমণ্ডল এবং হাতে মটরের দানার জায় ফুস্ফুড়ী এবং স্পর্শ করিলে উহাতে আলায়ুক্ত বেদনার উদ্বেক হয় ও যাহা কএক দিন পর মিশিয়া একত্রিত হয় (আন্টি-টার্চ, ফ্রোটন্); গায় আলায়ুক্ত পুঁথ সম্বলিত ফুস্ফুড়ী।

ব্যবহার । সকল প্রকারের আক্কেপ বা কন্বাল্‌সন্স (Convulsions); মৃগীরোগ; কোরিয়া (Chorea); হিষ্টিরিয়া; উন্মত্ততা; অন্ধতা; মস্তিষ্ক ও কসেককা মজ্জার প্রদাহ (Cerebro-spinal Meningitis); মস্তিষ্কে আঘাত লাগিয়া মস্তিষ্কের কার্যাবরোধ (Concussion of the brain) হেতু অস্থখ; সকল প্রকারের আক্কেপ বা খেঁচনি সম্বলিত রোগ; ঘুমের ঘোরে স্বপ্ন দেখিয়া আপন কার্যাদি করা বা পলায়ন করা; (Somnambulism); ধমুঠেকারি; পুস্কবের টুটীতে বিকচ বা একজ্জিমা (Eczema); আক্কেপিক রকমের হিকা এবং উগ্গার উঠা ইত্যাদি অস্থখে দিকুটা ব্যবহার্য্য।

বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ । পেশির সর্বপ্রকারের আক্কেপ (আগারিকান, জিক্); আক্কেপ ও উহার সঙ্গে সঙ্গে চেতনা-রহিততা; সমুদয় অঙ্গ প্রত্যঙ্গের ভয়ানক বিকৃতি; আক্কেপ এবং তদ্রূপ শরীর পশ্চাৎদিকে ঝাঁকিয়া পড়া; ডায়েফ্রাম্ (Diaphragm) নামক পেশীতে প্রবল আক্কেপ হইলে যেৰূপ হয়, মৃগীরোগের দেরূপ আক্রমণ এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে পাক-স্থলীর ক্ষতি, হিকা, চীৎকার করা, দাঁত লাগা, অচেতন হওয়া এবং অঙ্গ প্রত্যঙ্গের বিকৃতি; সামান্য স্পর্শন, ঘরের দরজা খুলিলে এবং সজোরে কথা বলিলেই আক্কেপের পুনরাক্রমণ; ঘর্ম্ম, যাহা দ্ব্যতীতেই অধিক হয়; উদরে

ষষ্ঠ ; শীত ; শীতবোধ এবং তদ্বর্ণন উদ্ভাপ প্রয়োগের ইচ্ছা ইত্যাদি সিকুটার কতকগুলি বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ ।

সমগুণ বিশিষ্ট ঔষধ । সিকুটার কার্যের সঙ্গে একোনাইট্, হাইড্রোসাবেনিক্ অ্যাসিড এবং ষ্ট্রিক্‌নিয়ার কার্যের বিশেষ সাদৃশ্য আছে । এতদ্ভিন্ন কোন কোন বিবরে ইহার কার্যেব সঙ্গে বেলাডোনা, কোনায়াম্, ল্যাকেসিস্, হায়োসায়েরাম্, পাল্‌সেটেলা, ট্র্যামোনিয়াম্ এবং বিরেট্রাম্ আল্‌বামের কার্যেরও সাদৃশ্য আছে ।

প্রতিষেধক ঔষধ । আর্বিকা, ওপিয়াম্ । অধিক মাত্রায় সিকুটা বাইয়া বিষাক্ত হইলে তামাকু ব্যবস্থা ।

ডাইলুশন বিচার । ৬, ১২ এবং ৩০ ডাইলুশনই সচরাচর অধিক ব্যবহৃত হইয়া থাকে । কোন কোন চিকিৎসক এই ঔষধের ২০০ ক্রমও ব্যবস্থা করিয়া থাকেন ।

কলিন্সোনিয়া ক্যানেডেন্সিস্,-কলিন্স্

(COLLINSONIA CANADENSIS,-COLLLNS.)

উত্তর আমেরিকার ভিজা জঙ্গলা ভূমিতে এই গাছ জন্মে । ইহার শিকড় যথানিয়মে ফ্রক্‌স্পিরিটে ভিজাইয়া নূল আরোক প্রস্তুত হইয়া থাকে । যথানিয়মে সুগার অব্‌মিকে মিশাইয়া ইহার গুঁড়াও প্রস্তুত হইতে পারে । গুড়াকে কলিন্সোনিন্ বলে ।

সাধারণ ক্রিয়া । পাকস্থলী এবং অন্ত্রের উপর ইহার কার্য অতি প্রবল, বিশেষতঃ গুহের উপর । ইহা হৃৎপিণ্ড এবং জননেন্দ্রিয়কে প্রবলরূপে আক্রমণ করিয়া থাকে । অর্শরোগে ইহা বিশেষ উপকারী ।

সাধারণ প্রাকৃতিক লক্ষণ ।

মস্তক । কপালে ঘুশঘুশে বেদনা ; অর্শরোগের রক্তস্রাবাদি বন্ধ হইয়া মাথা ধরা ।

মুখগহ্বর । জিহ্বার মধ্য ও পশ্চাৎভাগ হরিক্রান্ত লেপযুক্ত এবং

উহার সঙ্গে সঙ্গে যুখে তিক্তস্বাদ; বমমোষণ এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে পাকস্থলীতে খিলধরার স্থায় বেদনা ।

উদর । তলপেটে কঠিনবৎ অবল বেদনা ।

মল । কোষ্ঠবদ্ধ; মল ফিকা রস বিশিষ্ট, মোটা নেড় বাহা বহির্গত হইতে অত্যন্ত কৌথ পাড়িতে হয় এবং মলত্যাগের পর গুহদ্বার এবং তলপেটে ঘৃশ্‌ঘৃশ বেদনার উদ্রেক হয়; উদরাময়, মল রক্তমিশ্রিত শ্লেমা অথবা তরল হরিদ্রাবর্ণের পদার্থ, বা জলবৎ তরল এবং মলত্যাগের সময় অত্যন্ত কৌথপাড়া ও অঙ্গের মধ্যে ভয়ানক কঠিনবৎ বেদনা (মার্ক); রক্তস্রাবক অর্শ (Bleeding Piles) বা অন্ধ অর্শ (Blind Piles) (ইন্‌ফ্লাস্‌ম); গুহদ্বারে ভার বোধ; গুহদ্বারের চুলকানি বা কুট্‌কুটানি, বাহার দরুণ মনে হয় যেন গুহদ্বারে বালি বা কাঁকর ইত্যাদি লাগিয়া রহিয়াছে ।

জননেন্দ্রিয় । হৃৎপিণ্ডের স্নায়ু উত্তেজনা; হৃৎপিণ্ডের কার্যের অতিরিক্ত চাঞ্চল্য; হৃৎপিণ্ডের কার্য সঞ্চয় অস্বাভাবিক; নাড়ী দ্রুতগামী; হৃৎকের মধ্যে পূর্ণ এবং কঠিনবৎ; স্বানকষ্ট এবং অবসন্নবোধ (একন) ।

ব্যবহার । অর্শরোগ এবং তদরূপ যান্ত্রিক কার্য সঞ্চয় অস্বাভাবিক; কোষ্ঠবদ্ধ; উদরাময়; হৃৎপিণ্ডের যান্ত্রিক এবং কার্য সঞ্চয় অস্বাভাবিক; শোথ; কষ্টকর রক্তস্রাব এবং বাধকের বেদনা (Painful Menstruation); যোনি দ্বারের চুলকানি এবং অর্শ জনিত অন্যান্য প্রকারের অস্বাভাবিক; অণ্ডকোষের শিরার প্রদাহ; স্ত্রীলোকের জরায়ু স্থানভ্রষ্ট হওয়া (Prolapsus Uteri); আমাশয় এবং মলত্যাগের পূর্বে ও পর তলপেটে শূল বেদনার স্থায় বেদনা এবং বারবার কষ্টদায়ক কৌথ পাড়া; গর্ভাবস্থায় বা সন্তান প্রসবের পর স্ত্রীলোকের অর্শরোগ এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে কোষ্ঠবদ্ধ ও জরায়ু স্থান ভ্রষ্ট হইয়া মোড়াইয়া পড়া ইত্যাদি অস্বাভাবিক কলিম্বোনিয়া ব্যবস্থা ।

সমগুণ বিশিষ্ট ঔষধ । কলিম্বোনিয়ার কার্যের সঙ্গে আন্দোলক, ইন্‌ফ্লাস্‌ম হিপোক্যাঠেনাম্ এবং পডোফিলামের কার্যের বিশেষ সাদৃশ্য আছে । অভ্যস্ত কোন কোন বিষয়ে ইহার কার্যের সঙ্গে হাইড্রাণ্টিস্‌, নাক্স-বমিকা, সাল্‌ফার, ডায়োকসিমা এবং ডিজিটালিসের কার্যেরও সাদৃশ্য আছে ।

ডাইলুশন বিচার । ২য় এবং ৩য় স্কেলের আরোকই সচরাচর

অধিক ব্যবহৃত হইয়া থাকে । গর্ভাবস্থায় অর্শরোগ এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে অনিবার্য কোষ্ঠবদ্ধ থাকিলে এই ঔষধের মূল আরোক, ২ ফেণীটা মাত্রায় ব্যবহার করিয়া বিশেষ ফল পাওয়া যায়, আপন চিকিৎসার ফল দেখিয়া লেখক এরূপ স্থির করিয়াছেন ।

ক্রোকাশ্ স্যাটাইবাস্, -(যাক্রাঙ্গ), -ক্রোকাশ্

(CROCUS SATIVUS, -CROC. SAT.)

আসিয়া মাইনারে এই গাছের জন্ম । স্পেইন্, ফ্রান্স্ এবং ইটালী দেশ হইতেও নানা দেশে ইহার আমদানি হয় । শুকনা যাক্রাঙ্গ্ যবানিয়মে রেক্টিফাইড্ স্পিরিটে ভিজাইয়া মূল আরোক প্রস্তুত হইয়া থাকে । যাক্রাঙ্গ্ প্রায় সমুদয় পসারি বা বেনের দোকানেই পাওয়া যায় ।

সাধারণ ক্রিয়া । মস্তিষ্ক এবং কসেরুকা মজ্জার উপর ইহার কার্য অতি প্রবল । ইহা মস্তিষ্কের উত্তেজনা এবং রক্তাববোধ উৎপাদন করিয়া হিষ্টিরিয়া জনিত উন্নততা উৎপাদন করে । ইহা জরায়ুতে শিরঃস্রাব (Venous) রক্তাববোধ আনয়ন করে এবং তদক্ষণ জরায়ু হইতে কাল্পেট লাগবর্ণ, চাপ্ চাপ, থানা থানা, রসির জ্বর রক্তস্রাব হয় । রসির জ্বর রক্তস্রাব হওয়া এই ঔষধের একটি বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ ।

সাধারণ প্রাকৃতিক লক্ষণ ।

মন । সর্বদা মনের ভাবের পরিবর্তন ; রাগ করিয়া উহার পরক্ষণেই উহার দমন সমুদায় করা ; মনে অবসন্নতা এবং আনন্দ বা সুখ ; একবার চট্টিয়া বা ছুঁখিত হইয়া উহার পরক্ষণেই মনের উল্লাস বা সুখভাব (একন্, ইগ্‌নেস্, নাক্স-মক্স্, প্লাটিনা) ; মন অস্থির, উদ্বেগযুক্ত এবং মনে ছুঁধের ভাব ; উন্নততা এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে সর্বদা মনের উল্লাস বা খুসি থাকা ; গান করা, ঠাট্টা ভাষা এবং হাসিবার অত্যন্ত প্রবণ ইচ্ছা (হায়োস্, ট্রান্ন) ; রোগী সকলের মুখেই চুপন করিতে চাহে ।

মস্তক । ডাইন ককেনর পশ্চাৎভাগে এবং কপালের বাম পার্শ্বের

উন্নত স্থানে মস্তিষ্কের মধ্যে যেন হঠাৎ ধাক্কা লাগে, যাহার দরুণ রোগী হঠাৎ চমকিয়া উঠে ।

চক্ষু । কেতুব পড়িলে ঘেঁরুণ হয়, চক্ষু সেরূপ টিপান এবং বারম্বার চক্ষু মুছা (আলম, পাল্‌স্) ; চক্ষুর তারি অত্যন্ত বিস্তৃত ; ধূম প্রবেশ করিলে ঘেঁরুণ হয়, চক্ষে সেরূপ জ্বালা এবং কুট্‌কুটানি ; একখানি অতি সরু কাপ-ডের নখ দিয়া তাকাইলে ঘেঁরুণ হয়, চক্ষে আলোক সেরূপ ঢিমা বা অস্পষ্ট দেখায় (ব্যারাইটা-কার্ক, কষ্ট, হারোস্, পিট্রোং, পাল্‌স্) ; চক্ষের মধ্যে জলের সঞ্চার হইলে ঘেঁরুণ হয়, চক্ষে অনবরত সেরূপ অশ্রুভূত হয় ; অনেক-ক্ষণ কাশিলে ঘেঁরুণ হয়, চক্ষে সেরূপ অশ্রুভূত হয় ; পুস্তকাদি পাঠের পর চক্ষে জ্বালা এবং টাটানি ; চক্ষে ঝাপ্সা দেখা, যাহার দরুণ বারম্বার চক্ষু টিপাইতে হয় (ইউ-ফ্রেন্‌স্) ; সময় সময় চক্ষু পাতা সজোবে চাপিবার ইচ্ছা (ইউফ্রেন্‌স্) ; চক্ষু উপরের পাতার স্পন্দন ।

নাগিকা । নাকদিয়া চট্‌চটয়া আঁঠা এবং কাল রক্তস্রাব ও উহার সঙ্গে সঙ্গে কপালে বড় বড় ফোঁটার ঘণ্টা ; প্রবল হাঁচি ।

গলার মধ্য । গিলিবার সময় এবং উহার আভ্যন্তরিক কালেও জিহ্বা লম্বা হইয়াছে এরূপ অশ্রুভূত হয় ।

পাকস্থলী । অত্যন্ত পিপাসা এবং শীতল জ্বালাদিপানের ইচ্ছা (একন্‌, ব্রাই) ; উদ্যার উঠা ; কোন একটী জীবিত প্রাণী লাফাইবা বেড়াইলে ঘেঁরুণ হয়, পাকস্থলী এবং উদরের মধ্যে সেরূপ অশ্রুভূত হয় (থুজা) এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে বমনোদ্যেগ ও শরীর কম্পন ।

মলদ্বার । সময়ে সময়ে গুহদ্বারের বামপার্শ্বের নিকটবর্তী স্থানে স্ত্রীবিধানের জ্বায়ে যুগ্মবৃন্দে বেদনা এবং টাটানি ; গুহদ্বারের অসহ্য মোড়ানী ; স্ত্রবৎকৃন্দা থাকিলে ঘেঁরুণ হয়, গুহদ্বারে হামা দেওয়ার জ্বায়ে সেরূপ হৃৎহুড়া ।

জননেন্দ্রিয় । পুরুষের স্ত্রীসংহবাসের ইচ্ছার অতিরিক্ত উত্তেজনা । স্ত্রীলোকের রক্তস্রাব আরম্ভ হইবে এরূপ অশ্রুভূত হয় এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে তলপেটে বেদনা এবং যোনির নিম্নদিকে ঠেলিয়া বাহির হওয়ার জ্বায়ে অশ্রুভূত হওয়া (সিমিনিক্‌, পাল্‌স্, কালোক্‌) ; জরায়ু হইতে অতিরিক্ত

পরিমাণে কাল্চে (ক্যালী-নাইট্রিক্), অঁটাল, রদির জায় রক্তস্রাব বাহ্য
কাল চাপে চাপে নির্গত হয় (অ্যাম্-কার্ক, সাইক্লোমেন্, ইগ্-নেন্, প্লাটিনা,
সাবাইন) ; সামান্য নড়াচড়াতেই জরায়ু হইতে অতিরিক্ত রক্তস্রাব ।

ঋাসযন্ত্র । অত্যন্ত অবসন্ন কারক প্রবল শুষ্ক কাশি ; ঋাস প্রস্থানে
বমনোৎপাদক দুর্গন্ধ বাহির হয় (ক্যাম্প্, সাস্কুনেরিয়া) ; বুকের বাম পার্শ্বে
হৃদীবিধানের জায় ঘূর্ণঘূর্ণে বেদনা ; বুকে অত্যন্ত ভারিবোধ, বাহ্যর দক্ষণ
মোণী বারম্বার দীর্ঘ নিশ্বাস টানিতে বাধ্য হয় ।

অঙ্গ, প্রত্যঙ্গ । বাহ্য হিউমারাস্ (Humerus) নামক অস্থির
মাথা চল্চলে হইলে ঘেক্রপ হয়, বাহ্য উপরিভাগ সঞ্চালনে সেক্রপ বেদনার
উদ্বেক হয় ।

নিদ্রা । ঘুমেরঘোরে শ্রলোমেলো এবং ভয়ানক স্বপ্ন দেখা ।

ব্যবহার । কোরিয়া (Chorea) ; হিষ্টেরিয়া জনিত অস্থি ; রক্তস্রাব ;
জরায়ু হইতে অতিরিক্ত পরিমাণে রক্তস্রাব (Metrorrhagia) ; নাক দিয়া
রক্তস্রাব ; অতিরিক্ত বা প্রচুর রক্তস্রাব ; চক্ষু ঝাপসা দেখা ; চক্ষুর পেশীর
অতিরিক্ত ব্যবহার জনিত চক্ষু ঝাপসা বা কম দেখা (Asthenopia) ইত্যাদি
অস্থি ক্রোকাশ্ ব্যবস্থা ।

বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ । পেটে কোন জীবিত প্রাণী লাফাইয়া
বেড়াইতেছে, এক্রপ অল্পভূত হওয়া ; নানা বস্তু হইতে রক্তস্রাব, (রক্তস্রাবের) রক্ত
কাল্চে এবং চাপ চাপ, থানা থানা ; (ডাক্তার গারেন্সি (Dr. Guereusy)
বলেন আল্-কাতরার হায় অঁটাল) ; অত্যন্ত শারীরিক পারিশ্রমে ঘেক্রপ হয়,
সন্ধ্যার সময় সেক্রপ অতিরিক্ত পরিমাণে শ্রান্তিবোধ বা অবসন্নতা এবং
উহার সঙ্গে সঙ্গে নিদ্রার ভাব এবং মনে হয় যেন চক্ষুর পাতা ফুলিয়া ভারি
হইয়াছে ; পুস্তকাদি পাঠে উপদ্রবের উপশম হয় ; পেণার ঝাকান ; প্রাতঃ-
কালে লক্ষণাদির বৃদ্ধি এবং বাহ্যায়ুতে উহার উপশম ইত্যাদি ক্রোকাশের
কতকগুলি বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ ।

সমগুণবিশিষ্ট ঔষধ । ক্রোকাশের কার্যের সঙ্গে বেলাডোনা,
প্লাটিনা, সাবাইন এবং সর্কোপেক্কা কটীর কার্যের বিশেষ সাদৃশ্য আছে ।
এতদ্ভিন্ন কোন কোন বিষয়ে ইহার কার্যের সঙ্গে একোনাইট, ক্যাল্-কোরিয়া

কার্বোনিকা, ইপিকাকিউএনা, ইগ্নেসিয়া, নাক্স-বমিকা; ওশিয়াম, পাল-সেটিল, রাস্টল্জ, সিপিয়া এবং সাল্ফারের কার্যেরও সাদৃশ্য আছে।

প্রতিষেধক ঔষধ। একেনাইট, বেলাডোনা, ওপিয়াম।

ডাইলুশন বিচার। ডাক্তার হিউজ্ (Dr. Hughes) সচরাচর ২য় ক্রম ব্যবহার করিয়া থাকেন। তাঁহার মতে কখন কখন ১ম ক্রম ২য় ক্রম অপেক্ষা অধিক উপকারী। লেখক স্বয়ং ২য়, ৩য়, এবং ৬ষ্ঠ ক্রমই সচরাচর ব্যবহার করিয়াই বোধোচিত ফল পাইয়া থাকেন।

ক্রোটন্ টিগ্লিয়াম্,—ক্রোটন্

(CROTON TIGLIUM,—CROT.)

ভারতবর্ষ, লঙ্কাদ্বীপ, মালাক্কা দ্বীপ এবং আসিয়ার অন্যান্য স্থানে এই গাছের জন্ম। ইহার বিচি আব্‌সোলিউট্ আল্‌কোহালে (Absolute Alcohol) (১ ভাগ ক্রোটন্ এবং ২০ ভাগ আব্‌সোলিউট্ আল্‌কোহল্) ভিজাইয়া ইহার মূল আরোক্ত প্রস্তুত হইয়া থাকে।

সাধারণ ক্রিয়া। অস্ত্রের যোজক ঝিল্লী এবং চর্মের উপর ইহার কার্য অতি প্রবল। ইহা রক্তের জলীয় পদার্থ পরিবর্তন করিয়া প্রচুর পরিমাণে উদরাময় এবং চর্মের উপর প্রকৃত বিকচ (Eczema) উৎপাদন করিয়া থাকে।

সাধারণ প্রাকৃতিক লক্ষণ।

চক্ষু। চক্ষু দিয়া প্রচুর পরিমাণে জল পড়া (ইউফ্রেন)।

কর্ণ। বামকর্ণের গভীরতম অংশে আক্কেপিক রক্তের কুটুকাণী বা খোঁচা বিধার জ্বর বেদনা।

পাকস্থলী এবং উদর। পাকস্থলীর মধ্যে খালি খালিবোধ (সিপিরা); পাকস্থলীতে হ্রস্বলবোধ এবং পেটে পিঠে ঘেন লাগিয়া যার (ইগ্নেস)। উদর পূর্ণ, স্নীত এবং বিস্তৃত ও নাভি প্রদেশে বেদনা বা পেটকামড়ানী (কলোস্); উদরে কষ্টকর খালিবোধ এবং ক্ষুধাবোধ; উদরে

কল কল, গড়্ গড়্ শব্দ হওয়া ; কেবল জল ভরা থাকিলে যেরূপ হয়, অল্পে সেরূপ গড়্ গড়্ শব্দ হওয়া (হেলিবোরাস্), যাহা বাম পার্শ্বেই অধিক অল্পভূত হয় ; জল থাকিলে যেরূপ হয়, অল্পের মধ্যে সেরূপ গড়্ গড়্ কল কল শব্দ হওয়া ।

মল এবং মলদ্বার । উদবে দূষিত বায়ুর সঞ্চার (Flatulence) হওয়ার পরই মলত্যাগের অত্যন্ত ইচ্ছা বা বেগ (আলোজ্) ; মল হঠাৎ সজোরে নির্গত হয় এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে শুষ্কতার দিয়া প্রচুর দূষিত বায়ু নিঃসরণ (আলোজ্) ; শুষ্কদ্বারে অনবরত বহির্দিক পানে চাপাবোধ এবং নাভি-প্রদেশে চাপ দিলে শুষ্কতার পর্য্যন্ত অত্যন্ত কষ্টকর বেদনানুভব ; শুষ্কদ্বারে একরূপ অল্পভূত হয় যে, উহার দরুণ মনে হয় যেন সহজেই উদরাময় হইবে ; একখানি কাঠের টুকরা বহির্দিকে ঠেলিয়া বাহির হইলে যেরূপ হয়, শুষ্কদ্বারে সেরূপ বেদনা ; অনবরত বাহ্যের বেগ হইয়া তৎপর হর্গন্ধযুক্ত, মলিন সবুজ-বর্ণের কাইয়ের স্রাব মল ভেদ, যাহা শুষ্কতার দিয়া বন্ধকের গোলার স্রাব হঠাৎ সজোরে বাহির হয় (নেস্টাম্-কার্ক্, গ্রাটিওলা) ; মল অত্যন্ত তরল, হরিত্রা-বর্ণের জলের স্রাব, যাহা শুষ্কতার দিয়া সজোরে বাহির হয় (গ্রাটিওলা, থুজা, সেনিগা) ; বেদনাহীন জলবৎতরল ভেদ (আস্, চারনা, পডোফ্) ।

জননেন্দ্রিয় । পুরুষের পুরুষাঙ্গের অগ্রভাগ এবং অণ্ডকোষাধারে বারবার ক্ষতকারক চুলকানি ; অণ্ডকোষাধার ছোট হয়, অত্যন্ত চুলকায়, যাহার দরুণ ঘুম ভাঙ্গিয়া যায় এবং চুলকাইলে যাহার উপশম হয় ও যাহার দরুণ জীসহবাসের ইচ্ছার উদ্রেক হয় ; অণ্ডকোষাধারে ক্ষতকারক চুলকানি, চলিবার সময় যাহার বৃদ্ধি হয় ; আক্রান্ত স্থান লালবর্ণ ; অণ্ডকোষাধার এবং পুরুষাঙ্গে ফোড়ার স্রাব ফুফুড়ী (রাস্টজ্) । জীলোকের বোনি ইত্যাদিতে অত্যন্ত চুলকানি, সামান্য চুলকাইলেই যাহার উপশম হয় ; স্তন কঠিন এবং স্কীত ও উহার বোটার মধ্য দিয়া স্বচ্ছাঙ্গি পর্য্যন্ত বেদনা ; স্তনের বোটা স্পর্শ করিলেও টাটানির উদ্রেক হয় ; শিশু যে স্তন পান করে সে স্তনের বোটার মধ্যদিয়া স্বচ্ছাঙ্গি পর্য্যন্ত বেদনা ।

শ্বাসযন্ত্র । বুকের মধ্যে আঁটাবোধ, যাহার দরুণ মনে হয় যেন কুফল বিস্তৃত হইবে না (আসফি) ; বুকের দুই পার্শ্বেই পূর্ববোধ এবং উহার

সঙ্গে সঙ্গে বুকের বাম পার্শ্বে এবং উপর স্বকের দিকে জ্বালাযুক্ত স্থী বিধা-
নের জ্বর বেদনা ।

চর্ম্ম । বাম উরুতে, অণ্ডকোষাধাৰের বিপরিতদিকে লাল, আর্দ্র
ফুস্কুড়ী, যাঁহা হইতে দুর্গন্ধযুক্ত কলতানি পড়ে এবং যাঁহা স্পর্শ করিলে বা
চলিবার সময় অত্যন্ত বেদনাযুক্ত হয় এবং টাটায় ; চর্ম্মের চুলকানি এবং
জ্বালাযুক্ত বেদনা ও আক্রান্ত স্থান লালবর্ণ ; গায় ফোঁস্কার জ্বর ফুস্কুড়ী
বা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্রণ যাঁহা ফাটিয়া বা হইয়া কলতানি পড়ে এবং ফুস্কুড়ীতে
ধোঁসা বা চুনটি জন্মিয়া পড়িয়া যায় (আন্টি-টর্চ, সিকুটা, রাস্টক্স, সাল-
কার) ; গায় চুলকানি বিশিষ্ট ফোঁস্কাব জ্বর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্রণ ।

জ্বর । পায় ঠাণ্ডাবোধ যাঁহা পায়ের ভিত্ত পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয় ।

ব্যবহার । উদবাসন ; গ্রীষ্মকালীয় উদ্যোময় এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে
বমন ; ওলাউঠা ; বিকচ (Eczema), বিশেষতঃ মুখমণ্ডল এবং জননেন্দ্রিয়ে ;
গায় ফোঁস্কার জ্বর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফুস্কুড়ী বা ব্রণ ; স্ত্রীলোকের শিশুগণকে স্তনদুগ্ধ
পান করান সময়ে স্তনের বোঁটা হইতে বন্ধ পর্য্যন্ত ধোঁচা বিধার জ্বর বেদনা
ইত্যাদি অস্থখে ক্রোটিন ব্যবহার্য্য ।

বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ । শুষ্কতাব দিয়া মল বন্ধকের গোলা বা
পিচকারীর নালের জ্বর সঙ্গেই নির্গমন, গায় ফুস্কুড়ী হইলে অত্যন্ত চুল-
কানি এবং তদ্রূপ জ্বালা ও কলতানি পড়া ক্রোটিনের বিশেষ প্রাকৃতিক
লক্ষণ ।

সমগুণ বিশিষ্ট ঔষধ । অঙ্গের উপর ক্রোটিনের কার্য্য ইলেকট্রিয়ারাম,
বিরেট্রাম্ আল্‌বাম্ এবং কল্‌চিকামের জ্বর । চর্ম্মের উপর ইহার কার্য্য
রাস্টক্স, এপিস্ এবং মেজিরিয়ারামের জ্বর । এতদ্ভিন্ন কোন কোন বিষয়ে
ইহার কার্য্যের সঙ্গে আনাকার্ডিয়ারাম্, গ্রাটিওলা এবং খুজার কার্য্যেরও
সাদৃশ্য আছে ।

প্রতিষেধক ঔষধ । রাস্টক্স ।

ভাইলুশন বিচার । ৩য় দশমিক হইতে ৬ষ্ঠ শততমিক ক্রমের
আরোহই সচরাচর অধিক দ্রাব্যত্ব হইয়া থাকে ।

ডায়োকরিসা বিলোসা,-ডায়োক্

(DIOSCOREA VILLOSA,-DIOSC.)

দক্ষিণ আমেরিকার জঙ্গল ভূমিতে এই গাছ জন্মে। ইহার শিকড় যথা নিয়মে প্রক্ স্পিরিটে ভিজাইয়া মূল আরোক প্রস্তুত হইয়া থাকে। ইহার গুঁড়াও প্রস্তুত হয়। গুঁড়াকে ডায়োকরিন্ বলে।

সাধারণ ক্রিয়া। গ্যাঙ্গ্লিয়োনিক্ স্নায়ু মণ্ডলের (Ganglionic nervous System) মধ্যদিয়া নাতি প্রদেশের উপর ইহার কার্য অতি প্রবল, বাহার দরুণ পেট ও নাতিপ্রদেশে পিত্তাধিক্য জনিত শূল বেদনার (Bilious Colic) ভায় বেদনা উৎপন্ন হয়। এই বেদনার দরুণ রোগী হাঁটু গুঁড়াইয়া জড়নড় হইয়া থাকিতে চাহে বটে এবং মনে হয় যেন আক্রান্ত স্থানে চাপ দিলে বেদনার উপশম হইবে; * বাস্তবিক তাহা নহে, প্রচাপনে বরং উক্ত প্রকারের বেদনার বৃদ্ধি হয় এবং শরীর বিস্তৃত করিলে বেদনার উপশম হয়।

সাধারণ প্রাকৃতিক লক্ষণ।

মন। এক বস্তকে উহার প্রকৃত নাম ধরিয়া না বলিয়া অস্ত্র একটা নাম ধরিয়া বলার ইচ্ছা।

মস্তক। মাথাঘোরা এবং মাথা ঝিম্ ঝিম্ করা; মাথা এবং কপালের দুই পার্শ্বে ঘুশ্ ঘুশে বেদনা; কপালের দুই পার্শ্বে অত্যন্ত প্রথর বেদনা।

চক্ষু। প্রাতঃকালে চক্ষুর পাতার পাতায় লাগিয়া থাকে।

কর্ণ। কর্ণের সম্মুখ ভাগে চাপিয়া ধরার ভায় ঘুশ্ ঘুশে বেদনা; কর্ণের সম্মুখ এবং পশ্চাৎভাগে প্রথর বেদনা।

নাসিকা। নাকের মধ্যে অত্যন্ত জ্বালাহুভব এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে অনবরত হাঁচি দেওয়া (একনু, জেল্‌স্); বাম নাসারন্ধ্র দিয়া উজ্জল লালবর্ণ রক্ত পড়া; নাসারন্ধ্রে জ্বালা এবং টাটানি; নাকে বিশ্রী হর্গন্ধ।

মুখমণ্ডল। বাম নিম্ন মাড়ির কোণে চর্ক্বনবৎ, কসিয়া ধরা, খনন করা অথবা ছুরি বিধানের ভায় প্রবল বেদনা।

মুখগহ্বর এবং গলার মধ্য। প্রাতঃকালে জিহ্বা কটাবর্ণের পুরু লেণযুক্ত; পুড়িলে খবরূপ হয়, জিহ্বার ধারে দেরূপ টাটানি এবং জ্বালাহুভব (কলোস্, আইরিস্, প্লাটিনা, সাঙ্গুনেরিয়া, বিরেট্-বিন্নাইড্);

জিহ্বার অগ্রভাগে ক্ষত বা টাটানি ; প্রাতঃকালে মুখগহ্বর অত্যন্ত শুষ্ক, তিক্ত এবং চট্‌চটিয়া আঠা ; মুখগহ্বরের তালুতে এবং মাড়িতে টাটানি । মুখগহ্বরের পশ্চাৎভাগ এবং গলার অধো চড্‌চড়ানি, জ্বালা এবং চিড়িক মারা ; কর্ণমূলস্থিত গ্রন্থিতে বেদনা এবং টাটানি ।

পাকস্থলী এবং উদর । টক বা তিক্ত উদগার উঠা ; গলাদিয়া অধিক পরিমাণে স্বাদশূণ্ণ উল্কাব উঠা, বাহার দরুণ পাকস্থলীর অস্থির অনেকটা উপশম হয় (কার্বোলাক্-আস্) ; বমনোদ্বিগ্ন ; পাকস্থলীর মধ্যে ভারি হওয়ায় স্থায়ী অস্থির বোধ ; পাকস্থলীর মধ্যে অনবরত কষ্টমুভব এবং বারম্বার প্রবল বেদনা, বাহার দরুণ রোগী কোমরের কাপড় ঢলঢলে করিয়া পরিতে বাধ্য হয় ; উদরোৰ্দ্ধ প্রদেশে অত্যন্ত কষ্টদায়ক বেদনা, উল্কারে টক বা তিক্ত স্বাদ বিশিষ্ট দূষিত বায়ুনিঃসরণে বাহার উপশম হয় ; পাকস্থলীতে জ্বালা বোধ (আস্) ; পাকস্থলীর মধ্যে খিল ধরার স্থায়ী প্রবল বেদনা এবং উহার পর উদগার ও গলাদিয়া স্বাদশূণ্ণ দূষিত বায়ু নিঃসরণ এবং তৎপর হিকা ও গুহুদ্বার দিয়া দূষিত বায়ু (Flatulence) নিঃসরণ ; উদরোৰ্দ্ধ প্রদেশে বর্জনবৎ প্রথর বেদনা (কলোস্) । তলপেটের বাম পার্শ্বে প্রথর বেদনা ; যকৃত প্রদেশে ভারিবোধ এবং চর্জনবৎ ঘৃণ্‌ঘৃণে বেদনা, সন্ধ্যার সময় বাহার বৃদ্ধি হয় ; যকৃত প্রদেশে কর্জনবৎ বেদনা ; যকৃতের পিত্তাধাব প্রদেশে কঠিন বোধ এবং ঘৃণ্‌ঘৃণে বেদনা ; নাভি প্রদেশ এবং তলপেটে অনবরত অস্থির বোধ এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে পাকস্থলী এবং অন্ত্রের মধ্যে মুতর্জ মুতর্জে কর্জনবৎ শূল বেদনার স্থায়ী বেদনা (কলোস্) ; নাভি প্রদেশে খিলধরায় স্থায়ী বা আক্কেপিক বেদনা এবং পেট কামড়ানী (কলোস্) ; অন্ত্রের মধ্যে গড়্‌গড়্‌, কল কল শব্দ হওয়া এবং গুহুদ্বার দিয়া প্রচুর দূষিত বায়ু নিঃসরণ ; আহারের পর উদরে প্রচুর দূষিত বায়ু সঞ্চাব এবং দূষিত বায়ুর সঞ্চাব ছেজ শূল বেদনা, কিন্তু উহার সঙ্গে যকৃতের সামান্য অস্থির থাকে, অথবা যকৃতের অস্থির একবারেই থাকে না ; গুহুদ্বার দিয়া দুর্গন্ধযুক্ত প্রচুর দূষিত বায়ু নিঃসরণ ; অন্ত্রের মধ্যে মোচড়ানের স্থায়ী বা প্রথর কর্জনবৎ বেদনা ; চাপিলে অন্ত্রের মধ্যে বেদনা এবং টাটানির উদ্রেক হয় ; কুঁচকি প্রদেশে বেদনা বাহ্য অণ্ডকোষ পর্য্যন্ত বিস্তৃত হব ।

মল এবং মলদ্বার । শুষ্কদ্বারে চুলকানি ; শুষ্কদ্বারে লাল, বড় বগী বাহা অতি বেদনায়ুক্ত হয় এবং টাটায় ; বারদ্বার অত্যন্ত বাহ্যে বেগ ; অতি প্রত্যাঘে উদরাময়, বাহার দরুণ রোগী বিছানা হইতে তাড়াতাড়ি উঠিয়া পায়থানায় যাইতে বাধ্য হয় (আলোজ, পডোক্, রুমেক্, সাল্ফ্) ; প্রাতঃকালে প্রচুর পরিমাণে হরিদ্রা বর্ণের তরল ভেদ ; তরল ভেদ এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে অত্যন্ত কৌপপাড়া, মল চট্‌চটিয়া আঠা, কাল্‌চে, পিত্তযুক্ত ; অত্যন্ত দুর্গন্ধযুক্ত, পাতলা রাখা সাগুর ভায় ।

জননেদ্রিয় । পুরুষের বারদ্বার স্ত্রী সহবাসের ইচ্ছা এবং তদরূপ পুরুষাদি খাড়া হওয়া ; পুরুষাদি গীতল এবং শিথিল (আগ্নাস্, ক্যাম্ফার) ; অণুকোষাধার এবং উহার নিম্নদেশে উগ্র গন্ধযুক্ত ঘৃণ ; স্ত্রী সহবাসের ইচ্ছার হ্রাস ; নিক্রাবস্থার বাহু নিঃসরণ বা স্বপ্নদোষ (চায়না, কন্-আস্) ।

শ্বাসযন্ত্র । গলাব মধোব নিম্নদেশে হুড়্‌হুড়্ বা কুট্‌ কুট্‌ করার দরুণ থুশ্‌ থুশে কাশি ; উভয় কুক্ষুসেই ঘৃণ্‌ ঘৃশে রকমের কনকনান অথবা কর্জনবৎ শব্দ বেদনা ।

হৃৎপিণ্ড । হৃৎপ্রদেশে প্রথর বেদনা ।

গ্রীবা এবং পৃষ্ঠদেশ । গ্রীবার পশ্চাৎদেশে ঘৃণ্‌ ঘৃশে বেদনা ; প্রাতঃকালে পৃষ্ঠদেশে বেদনা, বাহার দরুণ উপুড় হওয়া যায় না ; পৃষ্ঠদেশে ভয়ানক বেদনা ; পৃষ্ঠদেশে তীক্ষ্ণ বেদনা ।

অঙ্গ, প্রত্যঙ্গ, হাত, পা ইত্যাদি । বাম দিকে বেদনা ; বাহ্য সমুখ ভাগ, হাত এবং মাণবন্ধের হাড়ে কঠিন বেদনা । উক্ত দিক্তিতে কঠিন ঘৃণ্‌ ঘৃশে অথবা ছিঁড়িয়া ফেলার ভায় বেদনা ; চলিবার সময় অথবা সোজা হইয়া বসিলে ডাইন পায়ের গোড়াভী হইতে পাতা পর্য্যন্ত বেদনা ; হাঁটু দুর্বল, কঠিন এবং উহাতে সঞ্চালনের শক্তির অভাব ; পায়ের পাতার দিক দুর্বল এবং বেদনায়ুক্ত ।

চক্ষু । পায়ের নখকোণীর প্রান্ত্রে যখন নখের মধ্যে কুট্‌ কুট্‌ করে এবং নখ অত্যন্ত বেদনায়ুক্ত হয় ; নখ মট্‌কা বা সহজে ভাঙ্গিয়া যায় ।

ব্যবহার । বিরাম রহিত বা স্বল্প বিরাম বিশিষ্ট শূল বেদনা (সবিরাম

শূল বেদনার কলোসিহ্ উপকারী); উদরাময়; ওলাউটার জ্বায় প্রবল উদরাময় বা ওলাউটার পূর্ববর্তী উদরাময়; পিত্তাধিকা জনিত অসুখ; অর্শরোগ ইত্যাদি অসুখে ডায়োকরিয়া ব্যবহার্য্য।

বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ। অস্থিরতা, শরীর কম্পন, অবসন্নবোধ, ক্রান্তি এবং শ্রান্তি বোধ; শরীরের নানা স্থান এবং অঙ্গ প্রত্যঙ্গের চুলকানি (কার্বোলালিক্-আস); সন্ধ্যার সময় বা প্রথম রাত্ৰিতে বিছানায় শয়ন করিলে, রাত্ৰিতে, শয়ন করিয়া থাকিলে, হাঁটু শুটাইয়া জড় সড় হইলে অসুখের বৃদ্ধি এবং বহির্জ্বায়ুতে নড়াচড়াতে, নড়া চড়া, ঘোড়ায় চাপিলে বা চলিয়া বেড়াইলে অথবা সোজা হইয়া দাঁড়াইলে অসুখের উপশম; প্রায় সমুদয় অসুখই, বিশেষতঃ শূল বেদনা, বিরাম রহিত বা স্বল্প বিরাম বিশিষ্ট ইত্যাবি ডায়োকরিয়ার কতকগুলি বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ।

সমগুণ বিশিষ্ট ঔষধ। ডায়োকরিয়ার কার্বোর সঙ্গে ইন্ধুলাস্, আলোজ্, ব্রাইওনিয়া, কলোসিহ্, নাক্সবমিকা, পডোফিলাম্ এবং সাল্-কারের কার্বোর সাদৃশ্য আছে।

ডাইনুশন বিচার। ডায়োকরিয়ার মূল আরোক এবং ১ম দশমিক ক্রমের আরোকই সচরাচর অধিক ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ডায়োকেরিণের ১ম দশমিক ক্রমের গুঁড়া, ১ হইতে ৩ গ্রেইন মাত্রায় ব্যবহৃত হইয়া থাকে। শূল বেদনার জন্ত লেখক ১ম দশমিক ক্রমের গুঁড়া ২৩ গ্রেইন মাত্রায় ব্যবহৃত করিয়া থাকেন। ১ম দশমিক ক্রম অপেক্ষা উচ্চ ক্রম ব্যবহার করিয়া বিশেষ ফল পাইতে দেখা যায় না।

ইউকেলিপ্‌টাস্ গ্লোবুলাস্,-ইউকেলিপ্‌ট্

(EUCALYPTUS GLOBULUS,-EUCALYPT.)

এই গাছ অষ্ট্রেলিয়াতে জন্মে। ইহার শুকনা পাতা দিয়া মূল আরোক প্রস্তুত হইয়া থাকে।

সাধারণ ক্রিয়া। পরিপাক কার্য্য সম্বন্ধীয় যন্ত্রের উপর ইহার কার্য্য

অতি প্রবল, বাহার দক্ষণ অজীর্ণ হইয়া উদরাময় হয় এবং মলে ইউকেলিপ্-টোলের (Eucalyptol) গন্ধ বর্তমান থাকে । ইহা জ্বপিত্তের কার্য বৃদ্ধি করে, রক্তের সঞ্চালন ক্রিয়ার জোর বাঁতেজ কমায় এবং তদক্ষণ মেলেরিয়া জনিত সবিরাম বা জ্বরবিরাম অবস্থায় লক্ষণাদি বিশিষ্ট জ্বর উৎপন্ন হয় । অতএব এই ঔষধ উক্ত প্রকারের জ্বরে বিশেষ উপকারী ।

সাধারণ প্রাকৃতিক লক্ষণ ।

মস্তক । স্নায়বিক এবং অস্ত্রান্ত প্রকারের মাথাধরা ।

নাসিকা । নাসারক্ত সম্বন্ধীয় সর্দি (হাইড্রাঈ, ক্যালী-বাই) ।

চক্ষু । স্লেম্মাজনিত চক্ষু প্রদাহ ।

মুখগহ্বর । মুখগহ্বরে জ্বালাহুতব বাহা মুখগহ্বরের পশ্চাত্তাঙ্গ এবং আহার্য্য গলনালী পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয় এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে পিপাসা ; মুখে অতিরিক্ত পরিমাণে লালের সঞ্চাব (মার্ক, আয়োড, নাইট্রিক-অ্যাস) ।

পাকস্থলী এবং উদর । উগ্র গন্ধবিশিষ্ট উদ্রার উঠা ; উদরস্থ আহার্য্য জ্বাদি ভাল হজম হয় না ; পাকস্থলীতে গরম এবং জ্বালাবোধ ; পাকস্থলীতে পূর্ণ, চাপা এবং ভারিবোধ (অ্যাস্, ব্রাই, নাক্স-বম্, পাল্‌স) । নাভি প্রদেশে অত্যন্ত কষ্টকর চাপা এবং পূর্ণবোধ ; মনে হয় যেন উদরাময় হইবে (অ্যালোজ) ।

মল । আমাশয় এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে শুষ্কতার মধ্যে গরম বোধ, কষ্টদায়ক কৌথপাড়া এবং স্লেম্মা ভেদ ; অত্যন্ত বলক্ষয় ; শুষ্কতার দিয়া রক্তস্রাব (হামামেলিস, ইপিকাক) ; জলবৎ তরল উদরাময় এবং দান্তের পূর্বে অস্ত্রের মধ্যে প্রথর কন্‌কনিয়া বেদন ।

শ্বাসযন্ত্র । শ্বাস প্রশ্বাস ঘন ঘন ; জ্বপিত্ত সম্বন্ধীয় হাঁপানি (Cardiac Asthma) ; যদি ধমনির স্ফীতি এবং বিস্তৃতির দক্ষণ নিউমোগ্যাট্রিক্‌ স্নায়ু এবং উহার শাখাতে চাপ পড়ে ।

চর্ম্ম । গায় দাঁদের জ্বায় ফুস্‌ফুড়ী; গ্রহির বিবৃদ্ধি ; গায় পচাশুষ্ক ক্ষত বাহা সহজে শুকায় না ।

ব্যবহার । মেলেরিয়া জনিত ঐক্যাহিক বা জ্বাহিক জ্বরে কোইনাইন

ব্যবহার না করা হইয়া থাকিলে ; কোইনাইনের অপব্যবহার জনিত পুরাতন আকারের জ্বর ; সর্দি ; আমাশয় ; উদরাময় ; শ্বেত প্রদর ; বায়ুনল প্রদাহ ; গায় কুসুড়ী এবং ক্ষত ; পুঁথ সম্বন্ধিত ক্ষত ; শ্রায়ুশূল ; বাতরোগ ; জ্বর বিকার বা আন্ত্রিক জ্বর ; জরায়ুর যে প্রকার শৈশ্বিক রোগ, নাসিকার প্রদাহ, ককট রোগ এবং গগন বিশিষ্ট বা হহতে অত্যন্ত দুর্গন্ধযুক্ত ক্লেদ নির্গত হয়, সেপ্রকার অস্থখে এই ঔষধ ব্যবহার্য । মেলেরিয়া জনিত জরে ইউকেলিপ্টাসের উরকারীতা সম্বন্ধে হেল্‌স্‌ নিউ রেমিডিজ্‌ (Hale's "New Remedies") নামক গ্রন্থে লিখিত আছে “যে সকল স্থানে এই গাছ জন্মে, সে সকল স্থানে মেলেরিয়া জনিত জ্বর হয় না।” “যে জলে এই গাছ জন্মে অথবা যে জলে ইহার পাতা পড়ে, সে জল যে পথিকেরা পান করে, তাহাদিগকে মেলেরিয়া জনিত জ্বর দ্বারা আক্রান্ত হইয়া কষ্ট পাইতে দেখা যায় না।”

সমগুণবিশিষ্ট ঔষধ । ইউকেলিপ্টাসের কার্যের সঙ্গে আর্দ্র-নিক্‌, ব্যাপ্‌টিসিয়া, চায়না, সিড্রন্‌ এবং কার্বোলিক্‌ আনিডের কার্যের বিশেষ সাদৃশ্য আছে ।

ডাইলুশন বিচার । ১ম, ৩য় এবং ৬ষ্ঠ দশমিক ক্রমের আরোক বা মূল আরোক এক কোঁঠা মাত্রায় ব্যবহৃত হইয়া থাকে । এই ঔষধ দ্বারা লেখক জরাক্রান্ত যত রোগীর চিকিৎসা করিয়া বিশেষ ফল পাইয়াছেন, উহার সমুদয় রোগীকেই মূল আরোক সেবন করাইতে হইয়াছে । ইহার মিশ্র আরোক দ্বারা তাহাদিগের বিশেষ ফল হয় নাই । ইহার মিশ্র আরোক দ্বারা, বিশেষতঃ জ্বররোগে, কোনও উপকার পাওয়া যায় না লেখক একরূপ বিশ্বাস করেন । যে সকল স্থানে অধিক পাতা জলাশয় থাকে এবং উহার বাসীগণ মেলেরিয়া জনিত জ্বরের দরুন অত্যন্ত কষ্ট পায়, সে সকল স্থানে এই গাছ রোপন করিলে অনেক উপকার দর্শে, এদৃশ চিকিৎসা বিবধক গ্রন্থে হেথিতে পাওয়া যায় ।

ইউপেটেরিয়াম পার্ফোলিয়েটাম,-ইউপেট-পার্ক

(EUPATORIUM PERFOLIATUM,-EUPAT.-PERF.)

উত্তর আমেরিকাতে এই গাছ জন্মে। যখন ফুল ফুটে, তখন এই গাছের সমুদয় অংশ সংগ্রহ করিয়া উহা যথানিয়মে প্রফ্ স্পিরিটে ভিজাইয়া ইহার গুল আরোক প্রস্তুত করিতে হয়।

সাধারণ ক্রিয়া। পাকস্থলী এবং যকৃত, শরীরের আশাণ অংশ এবং বায়ু নলের শৈল্পিক বিস্তার উপর ইহার কার্য অতি প্রবল। মেলেরিয়া জনিত, পিত্তাধিক হেতু অস্থখ উৎপাদন করা এই ঔষধের একটি বিশেষ প্রাকৃতিক গুণ বা শক্তি মধ্যে পরিগণিত।

সাধারণ প্রাকৃতিক লক্ষণ।

মস্তক। মাথাধরা এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে মাথার মধ্যে টাটানি, ঘরের মধ্যে থাকিলে বাহার উপশম হয় এবং প্রথম বহির্বাযুতে বাওয়ার সময় বাহার বৃদ্ধি হয় ও কথোপকথনে বাহার আরাম বা বিশেষ উপশম হয়; একদিন অস্তর একদিন প্রাতঃকালে ঘুম ভাঙ্গিলেই মাথাধরা এবং বমনোদ্বগ; শয়ন করিলে মাথার পশ্চাত্ভাগে বেদনা এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে মাথায় ভারিবোধ, বাহার দরুন মাথা হাত দিয়া না উঠাইলে রোগী মাথা খাড়া করিতে বা তুলিতে পারে না (চেলিডন)।

চক্ষু। চক্ষু গোলকে টাটানি (ব্রাই, মিমিসিক্); চক্ষে আলোক লাগে বা আলোক সহ হয় না (একন্, বেগ্, মাক্)।

নাসিকা। সর্দি এবং নাক দিয়া তরল স্লেয়া নির্গমন এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে হাঁচি (একন্, সান্ডুনেরিয়া) এবং প্রত্যেক হাড়ে কনকনানি।

পাকস্থলী এবং উদর। পিপাসা এবং শীতল জল পানের ইচ্ছা (একন্, আস্, ব্রাই); বমনোদ্বগ এবং উদরস্থ আহার দ্রব্যাদি বমন (আন্ট-টার্ট্, ইপিকাক্); কাঠবমী এবং পিত্তবমন (আইরিস্, পডোফ্) এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে পাকস্থলীতে কঁপনি এবং বেদনা ও তদরূপ অত্যন্ত দুর্বলতা এবং প্রায় মুচ্ছার ভাব; বমনের পূর্বে পিপাসা; প্রত্যেকবার জল বা জলীয় পদার্থ পানে বমন (কস্, সাইলিসি)। যকৃত প্রদেশে টাটানি

(এপিস্, ব্রাই, চেলিডন, মার্ক্, পডোক্); কোমবে অঁটা কাপড় পরা নহু
হয় না (ক্যাক্-কার্ক্, কার্কো-বেজ্) ।

মল । মলতাগের সময় শুষ্কহ্বরে গরমবোধ, চিড়িক্কারা ও জ্বালা ।

মূত্রযন্ত্র । কাল্চে স্বচ্ছ মূত্রতাগ ।

শ্বাসযন্ত্র । শ্বরভঙ্গ (একন্, কার্কো-বেজ্, হিপ্-সাল্ফ্, কন্);
সন্ধ্যাকালে খুশ্-খুশ্ কাশি (কষ্ট্); কাশি এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে বায়ুনের
মধ্যে গরম এবং জ্বালাবোধ বা টাটানি, মুখমণ্ডল আরক্ত ও টল্‌টলে;
চক্ষু জলপূর্ণ; রক্ত সবিরাম জ্বর হেতু বৈকালে কাশি (চায়না); বুকের মধ্যে
টাটানি, নিশ্বাসে ঘাটার বৃদ্ধি হয় (আর্গিকা) ।

গ্রীবা এবং পৃষ্ঠদেশ । ঘাড় এবং মাথার পশ্চাৎভাগে দণ্ডদণ্ডা
বেদনা (চেলিডন), উষ্ণতা দাঁড়াইলে ঘাটার উপশম হয়; মোচড়াইয়া পড়িলে
বা ধেঁতলিয়া গেলে যেকপ হয়, পৃষ্ঠদেশে সেকপ কন্‌কনানি (আর্গিকা,
ব্রাই); কোমরের পশ্চাৎদেশে দুর্বলবোধ; জরের সময় পৃষ্ঠদেশের কম্পন ।

অঙ্গ, প্রত্যঙ্গ । মোচড়াইয়া পড়িলে, ধেঁতলিয়া গেলে বা পিটিলে
যেকপ হয়, অঙ্গ প্রত্যঙ্গে সেকপ বেদনা (আর্গিকা, চায়না); অস্থি স্থান
লষ্ট হইলে বা ভাঙ্গিলে যেকপ হয়, মণিবন্ধে সেকপ বেদনা (একন্, ব্রাই,
ক্যাক্-কার্ক্, রাসটন্) ।

জ্বর । সমস্ত রাত্রি এবং প্রাতঃকালে শীতবোধ; সামান্য নড়াচড়াতেই
শরীর কম্পন এবং বমনোদ্যোগ; পৃষ্ঠদেশ এবং হাত, পা ইত্যাদিতে অত্যন্ত
বেদনা, কন্‌কনানি এবং টাটানি; দেহপরিমাণে শীত হব, তব্‌পেক্ষা কম্পন
অধিক হয়; শীতলাবস্থার পব পিত্তবমন; প্রবল শিরঃশীতা; শীতলাবস্থার
অনেককক্ষ পূর্বে হইতেই পিপাসা আরম্ভ হইয়া শীতলাবস্থা এবং উজ্জ্বলতা
পর্যন্তও ব্যাপিয়া থাকে; জ্বররাত্রি ১২টার পর বা প্রাতঃকালে আরম্ভ
হয় এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে শরীরে বেদনা, কম্প, দুর্বলতা এবং টাটানি থাকে,
কিন্তু সামান্য পরিমাণে ঘর্ষ হয় বা ঘর্ষ একবারেই হয় না ।

ব্যবহার । সবিরাম এবং স্নগ্ধবিরাম জ্বর (নেলেরিয়া জনিত হই-
লেই অধিক উপকারী); পিত্তাধিক এবং পাকস্থলীর অস্বাভাবিক জনিত অস্বাভাবিক;
সর্দি জনিত জ্বর; বাতঃপ্রোগ; ডেস্কুজর ইত্যাদি 'অস্বাভাবিক' এই ঔষধ ব্যবস্থা ।

ইউফর্বিয়াম অফিসিনেলি ।

৩৩৭

ডেজুজের ইউপেটেরিয়াম পার্ফোলিয়েটাম ব্যবহার সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার, এম, ডি, মহাশয় বলিয়াছেন “ইহার লক্ষণের সঙ্গে ডেজুজের লক্ষণের সাদৃশ্য আছে বটে, কিন্তু কএকটা রোগীর চিকিৎসায় ইহা ব্যবহার করিয়া কোনও ফল না পাওয়াতে ইহা আর ব্যবহার করি নাই এবং ইহা ব্যবহার না করার দরুণ অন্ততাপও করিতে হয় নাই । এই ঔষধ ব্যবহার করিয়া কোন কোন রোগীর রোগের লক্ষণাদি বৃদ্ধি পাইয়াছিল এক্ষণে শুনিতে পাওয়া গিয়াছে ।”

বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ । জ্বররোগে অল্প প্রত্যঙ্গে অত্যন্ত বেদনা, মাথাধরা বা প্রবল শিরঃসীড়া, অত্যন্ত নীতল জল পানের ইচ্ছা এবং জলাদি পান করিলেই উদরস্থ জলাদি বা পিত্ত বমন বা বমনোদ্বেষণ, জ্বরের সময় পিত্তবমন এবং সার্মীয়া ঘর্ম বা একবারে ঘর্ম না হওয়া ইত্যাদি ইউপেটেরিয়াম পার্ফোলিয়েটামের কতকগুলি বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ ।

সমগুণবিশিষ্ট ঔষধ । ইহার কার্যের সঙ্গে ট্রাইওনিয়া, আর্বিকা, ব্যাপ্টিসিয়া, ক্যামোমিলা, চেলিডোনিয়াম, সিনিসিকিউগা, জেল্‌সিমিয়াম, ইপিকাকিউএনা, মার্কিউরিয়াম, নাক্স-বমিকা, পডোফিলাম, ফাইটোলাকা ইত্যাদি ঔষধের কার্যের সাদৃশ্য আছে ।

ডাইলুশন বিচার । ১ম, ৩য় এবং ৬ষ্ঠ দশমিক ডাইলুশন এবং কখন কখন মূল আরোক, ১ ফোঁটা হইতে ৫ ফোঁটা পর্যন্তও, ব্যবহৃত হইয়া থাকে । জ্বররোগে ১ম দশমিক ডাইলুশন এবং মূল আরোকই অধিক উপকারী ।

ইউফর্বিয়াম অফিসিনেলি, -ইউফর্বি-অফিস্

(EUPHORBIIUM OFFICINALI, -EUPHORB.-OFF.)

আফ্রিকা দেশে এই গাছ জন্মে । ইহার আঠা রেক্টিফাইড স্পিরিটে ডিস্কাইয়া মূল আরোক প্রস্তুত হইয়া থাকে ।

সাধারণ ক্রিয়া । পরিপাক কার্য সম্বন্ধীয় বস্ত্রের উপর ইহার কার্য ক্রোটন, বাটোফা ইত্যাদি উগ্র রেচক ঔষধের স্থায়, বাহার দ্রুত ভেদ, বমন

এবং ওলাউঠার ভায় অজ্ঞাত লক্ষণ প্রকাশ পায়। মস্তিষ্কের উপরও ইহার কার্য দেখিতে পাওয়া যায়, যাহার দরুণ মস্তিষ্কে রক্তাধিক্য বা রক্তাবরোধ হইয়া তরুণ প্রবল উন্নততার লক্ষণাদি প্রকাশ পায়। ডাক্তার হেম্পেল (Dr. Hempel) বলেন “যদি অজ্ঞাত লক্ষণের সঙ্গে সঙ্গে মস্তিষ্ক আক্রান্ত হওয়ার প্রাকৃতিক লক্ষণাদি প্রকাশ না পায়, তবে এই ঔষধ ব্যবস্থা করা উচিত নহে। যদি মস্তিষ্ক আক্রান্ত না হয়, মস্তিষ্কে রক্তাধিক্য বা উহার উত্তেজনা না হয়, মস্তিষ্ক আক্রান্ত হওয়ার লক্ষণাদি প্রকাশ না পায়, প্রলাপ না হয়, তবে পাকস্থলী এবং অন্ত্রের অস্থির লক্ষণাদি প্রকাশ পাইলেও এই ঔষধ ব্যবস্থা নহে।” চর্মের উপরও ইহার কার্য দেখিতে পাওয়া যায়, যাহার দরুণ বিকচ এবং বিসর্পের ভায় (Erysipelatous) প্রদাহ প্রকাশ পাইয়া থাকে।

সাধারণ প্রাকৃতিক লক্ষণ ।

মন । তরুণায়ু; মনের উত্তেজনা; ভয়; তরুণ উগ্র উন্নততা (বেল, হায়োস্, ওপিয়াম্, ট্রামন) এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে মস্তিষ্কে রক্তাধিক্য বা রক্তাবরোধের লক্ষণাদি প্রকাশ পাওয়া (বেল) এবং নাড়ী দ্রুতগামী ও অনিয়মিত গতিবিশিষ্ট।

মস্তক । দাঁড়াইলে বা বহির্কায়ুতে চলিয়া বেড়াইলে প্রবল আকস্মিক মাথাবোরা; মাথার চাপিয়া ধরার ভায় বেদনা।

চক্ষু । চক্ষের মধ্যে কামড়ানী এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে চক্ষু দিয়া জল পড়া, চক্ষে আলোক লাগে বা আলোক সহ্য হয় না (একন্, বেল, মার্ক, সাল্ক)।

কর্ণ । কানে টন্ টন্ শব্দ হওয়া, হাঁচি দিলেও কানে টন্ টন্ শব্দ হয়।

নাসিকা । বারম্বার হাঁচিদেওয়া এবং নাক দিয়া তরল স্লেম্মা নির্গমন।

মুখমণ্ডল । গালে বিসর্পের ভায় প্রদাহযুক্ত ক্ষীতি এবং ক্ষীত স্থানে মটরের ভায় বড় হরিজ্রা বর্ণের কল্‌তানি পূর্ব কোণার ভায় ফুড়ী।

মুখগহ্বর ও গলার মধ্য । ছিঞা বিশিষ্ট স্বাদের মধ্যে বেদনা

এবং উহাতে চিড়িকমারা, বাহার দরুণ মনে হয় বেন আক্রান্ত স্থান ছিঁড়িয়া বাইবে; মুখে অতিরিক্ত পরিমাণে লাগের সঞ্চার (চায়না, মার্ক্, আয়োড্); গলার মধ্যে আলা বাহা পাকস্থলী পর্য্যন্ত রিক্ত হইয়া (আর্স্, ক্যাঙ্ক্, ক্যাপ্, মার্ক্-কর) ।

পাকস্থলী এবং উদর । শীতল জলাদি পানের ইচ্ছা (একন্, আর্স্, বাই); উদগার উঠা; বারম্বার হিকা; বমনোদ্বেগ এবং বমন; পাকস্থলীতে আলাহুভব (আর্স্, ক্যাঙ্ক্, ক্যাপ্, মার্ক্-কর); পাকস্থলীর আক্কেপিক-সঙ্কোচন এবং পেটকানড়ানি, পেটে পিঠে লাগিয়া থাকা; পেটে গড়্গড়্, কল্ কল শব্দ হওয়া এবং তৎপর গুহ্বার দিয়া দূষিত বায়ু নিঃসরণ (আলোজ্, কলোস্, লাইকোপ্); উদরে অতিরিক্ত পরিমাণে দূষিত বায়ুর সঞ্চার হেতু আক্কেপিক রকরের প্রবল শূল বেদনা (কলোস্) ।

মল । অধিক পরিমাণে ভেদ এবং বমন; মল পরিমাণে অধিক, উদরাময়ের ভ্রায় তরল; মল আমাশয়ের ভ্রায় শ্লেমা, পচা এবং জলের ভ্রায় পাতলা; কাইয়ের ভ্রায়, হরিদ্রার আভাযুক্ত বা কাদার ভ্রায় মলভেদ (বেল্, ক্যাক্-কার্ক্, হিপ্-সাল্ফ্, পডোফ্); কোষ্ঠবদ্ধ ।

শ্বাস যন্ত্র । গলার মধ্যে বা বুকের মধ্যে খুশ্‌খুশী বা হুড়্‌হুড়ীর দরুণ শুষ্ক খুশ্‌খুশে কাশি; শ্বাস কষ্ট; বুকের বাম পার্শ্বে স্থলী বিধানের ভ্রায় বেদনা ।

নাড়ী । নাড়ী ক্ষুদ্র, অনির্ঘমিত গতি বিশিষ্ট এবং দ্রুতগামী ।

চর্ম । গায় বিসর্পের ভ্রায় (Erysipelatous) প্রদাহ; হরিদ্রাবর্ণের দিগম পরিপূর্ণ বড় বড় ফোঁকা; গায় সাংঘাতিক আকারের প্রদাহ; গায় ফোঁকার ভ্রায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্রণ; বিকচ (Mozema) এবং পচা পূর্ব সঞ্চিত বা বা ক্ষত (আর্স্, ল্যাক্); গায় ক্ষতকারক চুলকানি ।

জ্বর । সমুদয় শরীরে শীতবোধ এবং কম্প; চর্ম শুষ্ক এবং উষ্ণ (একন্, টেল্); গায় শীতল ঘর্ম (ক্যাম্ফার, বিরেট্-আক্) ।

ব্যবহার । সামান্য আকারের ওলাউঠা এবং ওলাউঠার পূর্ববর্তী প্রবল উদরাময়; পাকস্থলী এবং অন্ত্রের প্রদাহ; তরুণ আকারের উন্নততা; বিসর্প (Erysipelas); বিকচ ইত্যাদি অন্ত্রের ইউক্ৰিয়াম্ অফিসিনেলী ব্যব-

হার্ভ্য। ডাক্তার চ্যাপম্যান (Dr. Chapman) বলেন যে, এই ঔষধ ব্যবহৃত করিয়া তিনি একটি আক্ষেপিক কাশি আক্রান্ত রোগীকে আরাম করিয়াছেন। কাশির সঙ্গে সঙ্গে গাকস্থলীর মধ্য হইতে বুকের পার্শ্ব পর্য্যন্ত স্থচী বিধানের ভায় বেদনা ইহার একটি বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ। তাঁহার মতে আক্রান্ত স্থানে আলায়ুক্ত উষ্ণাভাব সম্বলিত গালের লাল প্রদাহের পক্ষেও এই ঔষধ বিশেষ উপকারী। আমেরিকাতে ইউফোরিয়াম করোলেটা (Euphorbium Corollata) শিশুগণের ওলাউঠায় বিস্তৃতরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ডাক্তার হেম্পেল (Dr. Hempel) বলেন যে, গোড়া ঘাঘের চিকিৎসায় ইহার বাহু প্রয়োগে বিশেষ উপকার দর্শিবার সম্ভাবনা।

বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ। উরু এবং উরুর সন্ধির হাড়ের সন্ধিতে আলায়ুক্ত বেদনা এবং মুচ্ছার্তাব এই ঔষধের বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ।

সমগুণবিশিষ্ট ঔষধ। ইহার কার্যের সঙ্গে বিরোটাম্ আল্‌বাম্, কল্‌চিকাম্, ইলেটেরিয়াম্, টার্টার এমিটিক্, আসিনিক, ক্যাম্‌ফার, ক্রোটন ইত্যাদি ঔষধের কার্যের সাদৃশ্য আছে।

ডাইলুশন বিচার। ১ম, ৩য় এবং ৬ষ্ঠ দশমিক ক্রমের আরোক ব্যবহার্য। বাহু প্রয়োগের জন্য মূল আরোক, ৫ হইতে ১০ ফোঁটা, ২ কাঁচা পরিষ্কার জলে মিশাইয়া আক্রান্ত স্থানে লাগাইবে। ইহার মাত্রা সম্বন্ধে লেখক স্বয়ং বিশেষ কিছু বলিতে পারেন না, কারণ, তিনি ইহা অধিক ব্যবহার করিয়া দেখেন নাই।

যাটোকা কার্কিশ,-যাটোফ্

(JATROPHA CARCAS,-JATROPH.)

ব্রেজিল, গুয়েট্, ইণ্ডিস্ এবং আফ্রিকার পশ্চিম উপকূলে এই গাছ জন্মে। ইহার বিচি বথানিয়মে সুগার অব্ নিক্কে মিশাইয়া ইহার গুঁড়া প্রস্তুত হইয়া থাকে। ইহার আরোকও প্রস্তুত হইয়া থাকে।

সাধারণ ক্রিয়া। ইহা দ্বারা বিষাক্ত হইলে চাউল খোয়া জলের

স্তায় ভেদ ও বমন হয়। অতএব ইহা ওলাউঠাতে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। চাউল ধোয়া জলের স্তায় প্রচুর পরিমাণে ভেদ, মল শুষ্ক হইয়া দিয়া যেন প্রবল স্রোতের স্তায় নির্গত হয়; সমুদ্র দ্বিবারে বৈরাগ্য বা অমনোযোগ এবং বেদনা যন্ত্রণাদিরও যেন জ্ঞান থাকে না; অত্যন্ত অনিবার্য পিপাসা; অধিক পরিমাণে ডিমের লালের স্তায় জলবৎ পদার্থ বমন; পাকস্থলীতে আক্কেপিক বেদনা; একটি বোতল হইতে জল ঢালিয়া ফেলিবার সময় যেরূপ হয়, দান্তের পূর্বে পেটের মধ্যে সেক্রপ গড়্ গড়্, কল কল শব্দ হওয়া যাহা দান্তের পরও থাকে; পা এবং পায়ের পাতায় প্রবল আকারের খিল খরা; সমুদ্র শরীর ঠাণ্ডা; সমুদ্র শরীরে ঠাণ্ডা চট্ চটিয়া শব্দ; ঠাণ্ডা জলে হাত দিয়া রাখিলে লক্ষণাদির উপশম ইত্যাদি লক্ষণ বর্তমানে ওলাউঠা রোগে এই ঔষধ ব্যবহার্য। পাকস্থলী এবং অন্ত্রের উপর ইহার কার্য অনেকটা ক্রোটনের স্তায়। ডাক্তার হিউজ্ (Dr. Hughes) বলেন যে ওলাউঠা রোগে ষাট্রোফা দ্বারা বিশেষ উপকার পাওয়া যায় না, কেবল উষ্ণ রকমের উদরাময়েই ইহা ব্যবহার্য। এতদ্দেশে লক্ষণ বিশেষে এই ঔষধ ব্যবহার করিয়া ওলাউঠার চিকিৎসায় অনেক সময় বিশেষ ফল পাওয়া যায়।

ডাইলুশন বিচার। ১ম, ৩য় এবং ৬ষ্ঠ ক্রমের আরোক এবং ৩য় বা ৬ষ্ঠ ক্রমের শুঁড়া ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

ক্যালমিয়া ল্যাটিফোলিয়া,-ক্যাল্ম্

(KALMIA LATIFOLIA,-KALM.)

এই গাছের পাতা যথা নিয়মে প্রফ্ স্পিরিটে ভিজাইয়া মূল আরোক প্রস্তুত হইয়া থাকে। ইহা একটি বিষাক্ত ঔষধ মধ্যে পরিগণিত।

সাধারণ ক্রিয়া। হৃৎপিণ্ডের উপর ইহার কার্য অতি প্রবল, যাহার দরুণ হৃৎপিণ্ডের নিয়মিত কার্য করার শক্তি কমিয়া যায় এবং তদরুণ হৃৎপিণ্ড আস্তে আস্তে স্পন্দন করে। পেশীর উপরও ইহার কার্য দেখিতে পাওয়া যায়, যাহার দরুণ শরীরের স্থানে স্থানে বাতের বেদনার স্তায় বেদনা অনুভূত হয়।

সাধারণ প্রাকৃতিক লক্ষণ ।

মস্তক । মাথাধোরা এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে অঙ্গ প্রত্যঙ্গে বেদনা ।

চক্ষু । চক্ষুর সম্মুখে পাখীর ডানা বাড়ার ভায় ধড়ফড়ানী ; চক্ষে বেদনা, চক্ষু ঘুরাইলে বাহার বৃদ্ধি হয় (ব্রাই) ; চক্ষুর চতুঃস্পার্শ্বভী স্থান এবং চক্ষুর পাতা শক্ত হয় বা উহা নোমান যায় না (রাস্টক্স) ।

মুখমণ্ডল । মুখমণ্ডলের স্নায়ুশূল, বাহা ডাইন পার্শ্বই অধিক আক্রমণ করিয়া থাকে এবং বাহার দরুণ আক্রান্ত স্থানে অত্যন্ত কষ্টদায়ক বেদনার উদ্বেগ হয় ; হৃৎপিণ্ডের বাতরোগে মুখাকৃতি অত্যন্ত উদ্বেগযুক্ত ।

পাকস্থলী । বমনোদ্বেগ ; চক্ষে যেন সমুদয় বস্তুই কাল দেখায় এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে গলার মধ্যে চাপা রোধ ; উদরে দূষিত বায়ুর সঞ্চার হেতু ঝাঁসকষ্ট এবং অঙ্গ প্রত্যঙ্গে বাতের বেদনার ভায় বেদনা ; পাকস্থলীর মধ্যে চাপাবোধ, উপুড় হইয়া বাকিয়া বসিলে বাহার বৃদ্ধি হয় এবং সোজা হইয়া বসিলে বাহার উপশম হয় ও উহার সঙ্গে সঙ্গে মনে হয় যেন পাকস্থলীর নিয়মিক দিয়া কোন পদার্থ চেলিয়া বাহির হইবে ; পাকস্থলীতে খিল ধরার ভায় বেদনা এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে উল্কার দ্বারা দূষিতবায়ু নিঃসরণ, হৃৎস্পন্দন, পাকস্থলীতে বেদনা এবং বমন ও হৃৎস্নায়ুশূল বা হৃৎবেদনা ।

মূত্রযন্ত্র । মূত্র আলবুমেনযুক্ত এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে পা ইত্যাদি নিম্নাঙ্গে বেদনা ।

শ্বাসযন্ত্র । বায়ুনলের মধ্যে স্ফুঃ স্ফুঃ করা ; ঝাঁসকষ্ট ; বুকের নিম্ন ভাগে স্ফুটী বিধানের ভায় বেদনা ; বুকের মধ্যে হৃৎপিণ্ডের উপরিভাগ দিয়া স্বচ্ছাঙ্কি পর্য্যন্ত খোঁচাবিবার ভায় বেদনা (কালী-কার্ক) এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে বাহতে বেদনা (একন্, রাস্টক্স) ; ঝাঁসকষ্ট এবং বুকে বেদনা ; হৃৎস্নায়ুশূল বা হৃৎবেদনা (Angina Pectoris) ।

হৃৎপিণ্ড এবং নাড়ী । হৃৎস্পন্দন এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে মনের উদ্বেগ ও ঝাঁসকষ্ট (একন্, আন্) ; হৃৎপ্রদেশে বাতের বেদনার ভায় বেদনা (বাস্টক্স, স্পাইজেল) ; নাড়ী মুহুগতি বিশিষ্ট এবং হ্রস্বল, অনিয়মিত প্রতিবিশিষ্ট, ক্ষতগামী, কিন্তু হ্রস্বল ; হৃৎপিণ্ডের বিবৃদ্ধি, হৃৎকপাটের অপ্রচুরতা

অথবা বাত রোগের পর উহা পুরু হওয়া; হৃৎপিণ্ড হইতে বাম বক্ষ পর্যন্ত
খোঁচাবিধার স্থায় বেদনা, বাহ্যিক দক্ষণ হৃৎপিণ্ডে ভয়ানক দগ্ধপানির
উল্লেখ হয়; হৃৎপিণ্ডের বাতরোগ।

অঙ্গ, প্রত্যঙ্গ। বাম বাহুতে বেদনা (একন্, রাস্ট্র); বাম-
বাহুতে চাপাবোধ; সন্ধিগুলি ঊষ, লালবর্ণ এবং শীত; অঙ্গ প্রত্যঙ্গে
বাতের বেদনা; কুঁচ্কির নিকটবর্তী সন্ধি হইতে পায়ের পাতা পর্যন্ত হাড়-
শুলের স্থায় বেদনা।

ব্যবহার। হৃৎপিণ্ডের অস্থখ; বাতরোগ; হৃদস্তাবরক বিনীগ্রদাহ
(Endocarditis); হৃৎপিণ্ডের বিবৃদ্ধি; হৃৎকপাটের অস্থখ; পেশীবাত;
হাড়শূল ইত্যাদি অস্থখে ক্যালমিয়া ব্যবহার্য।

বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ। সমুদয় শরীরে বাতের বেদনার ন্যায়
বেদনা; উপুড় হইয়া বসিয়া থাকিলে বেদনাদির বৃদ্ধি, অথচ ঐ অবস্থায়ই
থাকিতে ইচ্ছা হয়; সোজা হইয়া বসিলে বেদনাদির উপশম; প্রথম
রাত্রিতে শয়ন করার পর বেদনাদির বৃদ্ধি; বেদনাদি অনিশ্চিত সময়ের
অন্ত ব্যাপিয়া থাকে এবং কখন যে উহার উপশম হয় তাহারও নিশ্চয়তা
থাকে না; হাড়শুলের পর অক্রান্ত স্থানে অবশ্যবোধ; বাতের বেদনা ভঙ্গ
হইলেও উহার সঙ্গে অর বর্তমান থাকে না ইত্যাদি ক্যালমিয়ার কতকগুলি
বিশেষ প্রাকৃতিক নির্দিষ্ট লক্ষণ।

সমগুণ বিশিষ্ট ঔষধ। একোনাইট, বেলাডোনা, ডিলিটালিস,
ছিগার সাল্‌ফিউরিস, স্পাইজেলিয়া, রাস্ট্র ইত্যাদির কার্যের সঙ্গে
ক্যালমিয়ার কার্যের সাদৃশ্য আছে। ডাক্তার হেরিং (Dr. Hering) বলেন
যে, হৃৎপিণ্ডের অস্থখে স্পাইজেলিয়ার পর ক্যালমিয়া ব্যবহারে বিশেষ
উপকার দর্শে।

প্রতিষেধক ঔষধ। একোনাইট, বেলাডোনা।

ডাইলুশন বিচার। ডাক্তার বেজ (Dr. Bayes) ৩য় দশমিক
ক্রমের আরোক ব্যবহারের ব্যবস্থা দিয়া গিয়াছেন। বাত জনিত হৃদস্তাবরক
বিনীগ্রদাহে (Rheumatic Endocarditis) লেখক এই ঔষধের মূল
আরোক, ৩ কোঁটা মাত্র ব্যবহার করিয়া একটি রোগীর চিকিৎসার বিশেষ

কল পাইয়াছেন । ২য় এবং ৩য় ক্রমের আরোক ছাড়া কোনও উপকার না পাওয়াতেই মূল আরোক উক্ত নাত্রায় ব্যবহার করা হইয়াছিল ।

ল্যাক্তান্থিস, টিক্টোরিয়া,—ল্যাক্‌ন্যাঙ্ক্

(LACHNANTHES TINCTORIA, -LACHNANTH.)

আমেরিকার জলা বা কাদাবিশিষ্ট স্থানে এই গাছ জন্মে । কাঁচা গাছ দিয়া ইহার মূল আরোক প্রস্তুত হইয়া থাকে ।

সাধারণ ক্রিয়া । মস্তিষ্ক এবং কসেরিকা মজ্জার উপর ইহার কার্য দেখিতে পাওয়া যায় । মস্তিষ্কের জ্ঞান উৎপাদনের সহায়কারী অংশ (Sensorium) এবং পেশীতেই ইহার কার্য অধিক প্রবল, যাহার দরুণ রক্তাধিক্য বা রক্তাবরোধ এবং প্রদাহ উৎপন্ন হইয়া থাকে ।

সাধারণ প্রাকৃতিক লক্ষণ ।

মূল । সামান্ত কারণেই চটিয়া যাওয়া ; প্রলাপ এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে চক্ষু উজ্জ্বল (বেল্, ট্র্যামন্) ।

মস্তক । মাথার, বিশেষতঃ কপালে, ঘৃণ্মুশে বেদনা; কপালে ছিঁড়িয়া ফেলার স্থায় বেদনা যাহা বামদিক হইতে আরম্ভ হইয়া ডাইনদিকে বিস্তৃত হয় ; মাথার হাড় স্পর্শ করিলেই বেদনার উল্লেখ হয় ; মাথার উপরিভাগ ঘন স্বাভাবিক অপেক্ষা অনেক বড় হইয়াছে এবং উপরের দিকে বৃদ্ধি হইতেছে এরূপ অনুভূত হয় ।

চক্ষু । চক্ষুর সম্মুখে ঘন হরিত্রাবর্ণের বা সাদা দাগ তাসে ; চক্ষু উজ্জ্বল এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে প্রলাপ (বেল্, ট্র্যামন্) ; বালির কণাদি প্রবিষ্ট হইলে, ঘেৰুপ হয়, চক্ষে সেরূপ চাপাবোধ এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে চক্ষে সাদা জেয়ার সঞ্চার ; চক্ষুর উপরের পাতার স্পন্দন (আগারিকান্), চক্ষু শক্ত করিয়া বুজিলে বাহ্যিক বৃদ্ধি হয় ; চক্ষে ঝাপসা দেখা ।

কর্ণ । কানের মধ্যে চুলকানি বা কুটকুটানি বা হুড়হুড়ী, হাতের আঙ্গুল কানের মধ্যে প্রবেশ করাইয়া দিলে বাহ্যিক উপশম হয় এবং আঙ্গুল

বাহির করিয়া আনিলে বাহার পুনরায় বৃদ্ধি হয় ; কানের মধ্যে গানের ভাৱ শব্দ হওয়া ।

মুখমণ্ডল । মুখমণ্ডলের স্থানে স্থানে চক্রাকারে লাল দাগ পড়ে (সাল্‌মোনিয়া) এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে প্রলাপ ও চক্ষু উজ্জল (বেল) ।

মুখগহ্বর এবং গলার মধ্যে । সমুদয় দাঁতের গোড়ায় বেদনা, উষ্ণ প্রয়োগে বাহার বৃদ্ধি হয় । গলার মধ্যে বেদনা বা টাটানি এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে ক্ষণস্থায়ী কাশি ; আহারবহা গলনালীর উপরিভাগে ক্ষীত হওয়ার ভাৱ অস্বভূত হয় এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে ঘাড় শক্ত হয় বা উহা নোয়ান যায় না ও মাথা একদিকে ঝুকিয়া পড়ে ; ডিপথিরিয়া (Diphtheria) ; গলার মধ্যে শুষ্কবোধ এবং তৎপর উহাতে টাটানি বা বেদনা ।

পাকস্থলী এবং উদর । মাংসে অরুচি (অগ্নিকা, কার্কো-বেজ, গ্রাক্স, পাল্‌স) । দূষিত বায়ুর সঞ্চায় হইলে বেরুপ হয়, উদরে অনবরত সেকুপ গড়, গড়, কল কল শব্দ হওয়া ও পেট গুলিয়া উঠা (আলোজ, লাইকোপ) ।

মল এবং মলদ্বার । বারবার মলত্যাগ এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে গুহ্বার দিয়া প্রচুর পরিমাণে দূষিত বায়ু নিঃসরণ ।

শ্বাসযন্ত্র । শুষ্ককাশি এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে গলার মধ্যে বেদনা ; বৃক ডাইন স্তন এবং কণ্ঠস্থির নীচে স্তীবিধানের ভাৱ বেদনা ; বৃক উষ্ণাহতব (একন, অস্, সাল্‌মোনিয়া) ।

হৃৎপিণ্ড এবং নাড়ী । নাড়ী মুহু এবং অনিয়মিত গতিবিশিষ্ট (ডিজিট) ; হৃৎপ্রদেশে উষ্ণাহতব ।

গ্রীবা এবং পৃষ্ঠদেশ । গ্রীবা শক্ত হয় বা উহা নোয়ান যায় না (রাস্টক্স) ; অস্থি স্থান ভ্রষ্ট হইলে বেরুপ হয়, ঘাড়ে সেকুপ বেদনা বোধ ; কোমর এবং শুষ্ক দ্বারের ঠিক উপরিভাগে জ্বালাহতব ।

চক্ষু । শরীরের নানা স্থানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বর্ণের ভাৱ ফুস্‌ফুড়ী (গ্রাক্স) ; উরুদেশ, পা, পায়ের পাতা, বাহু ইত্যাদিতে চুলকানি, কুটুটানি এবং হুল ফুটানের ভাৱ অস্বভূত হয় (একন, অস্, আটিকা ইউরেস্) ।

নিদ্রা । নিদ্রাপূর্ণতা, অস্থির বা ভয় নিদ্রা এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে কষ্টদায়ক স্বপ্ন দেখা ; সহজে ঘুম না হওয়া ।

জ্বর। গার একবার গরমবোধ এবং উহার পরক্ষণই শীতবোধ ; পায়ের পাতা এবং হাতের তালুতে জ্বালাবোধ (সাল্‌ফ্‌) ; শরীর গরম এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে মুখমণ্ডল লালবর্ণ ; উষ্ণাবস্থার পর উভয় গাল চক্রাকারে লালবর্ণ হয়, ডাইন গালেই যাহা অধিক অমুভূত হয় (সালুনেরিয়া) ; প্রচুর পরিমাণে ঘৰ্ম, বিশেষতঃ রাত্রি হুই প্রহরের পর ; শীতলাবস্থায় চৰ্ম্ম আর্দ্র এবং চট্‌চটিয়া আঠা ।

ব্যবহার । ডিপ্‌থিরিয়া ; মস্তিষ্ক এবং কসেফক মৰ্জ্জাপ্রদাহ ; গ্রীবাতে বেদনা বা শক্ত গ্রীবা (Wry-neck) ইত্যাদি অন্ত্বে ল্যাক্‌ন্যাহিস্‌ ব্যবহার্য্য । লণ্ডন নিবাসী ডাক্তার আলাবোন্‌ (Dr. Alabone) এই ঔষধ ব্যবহার করিয়া যক্ষাক্রান্তের চিকিৎসায় বিশেষ ফল পাইয়াছেন এবং ডাক্তার এইচ্‌, নান্‌কিবেল্‌ (Dr. H. Nankivell) তাঁহার উক্ত মতের পোষকতা করিয়াছেন । ডাক্তার নান্‌কিবেল্‌ বলেন “যে প্রকার যক্ষাক্রান্তের দ্বিতীয় এবং তৃতীয়াবস্থায় ফুফুস অধিক পরিমাণে ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়া ধ্বংসকার্য্য কিছুকালের জগ্ৰ স্থগিত থাকে, এবং বৈকালে বা সন্ধ্যার সময় শরীরের সস্তাপ ১০০° ফারণ্‌হাইট্‌ ডিগ্রীর অধিক না হয়, সে প্রকার যক্ষাক্রান্তে এই ঔষধ সেবনে বিশেষ উপকার দর্শে ।” তিনি এই ঔষধের মূল আরোক ৩ হইতে ৫ কোঁটা পর্য্যন্ত ব্যবহার করিয়া দেখিয়াছেন ।

সমগ্ৰণবিশিষ্ট ঔষধ । আগারিকাশ, বেলাডোনা, সিকুটা, সিমিসিফিউগা, ক্যাম্‌ফার, হায়োসায়ামাস, ল্যাকেসিস, ট্রামোনিয়াম্‌ ইত্যাদি ঔষধের কার্য্যের সঙ্গে ল্যাক্‌ন্যাহিসের কার্য্যের সাদৃশ্য আছে ।

ডাইলুশন বিচার । ইহার মূল আরোকই ১ হইতে ৫ কোঁটা মাত্রায় ব্যবহৃত হইয়া থাকে । এই ঔষধের মাত্রা সম্বন্ধ লেখকের কোনও অভিজ্ঞতা নাই, কারণ, তিনি উহা ব্যবহার করিয়া দেখেন নাই ।

ল্যাক্টুকা বিরোঙ্গা ।

(LACTUCA VIROSA, -LACT.-VIR.)

এই গাছের সমুদয় অংশ কাঁচা অবস্থায় সংগ্রহ করিয়া যথা নিম্নে ২০-
ডিগ্রী ওয়ার প্রফ্‌ স্পিরিটে ভিজাইয়া ইহার মূল আরোক প্রস্তুত হইয়া থাকে ।

সাধারণ ক্রিয়া । মস্তিষ্ক এবং স্নায়ু মণ্ডলীর উপর ইহার কার্য্য
অতি প্রবল । ইহা নাজীর গতি হ্রাস করে এবং তদ্রূপ ঘূর্ণ হয় । আকিমের
দ্বারা ইহা মস্তিষ্ক ক্রিয়া রক্ত সঞ্চালন ক্রিয়াকে উত্তেজিত করে না । শরীরের
অত্যন্ত অংশেও ইহার কার্য্য আছে ।

সাধারণ প্রাকৃতিক লক্ষণ ।

মন । সর্বদা চটিয়া থাকি; চিড়্‌ চিড়্‌, থিট্‌ থিট্‌ করা; কোন প্রকার
মানসিক পরিশ্রমে অনিচ্ছা; মন গোলমেলে হইয়া যায়; কোন বিষয়ে চিন্তা
করিতে অশক্তি (জেন্স্‌, নাক্স্‌-বম্‌, ফস্‌-আস্‌) ।

মস্তক । মাথায় গোলমেলে বোধ; মাথাঘোরা; ঘূর্ণ ঘূর্ণে মাথাধরা ।

চক্ষু । চক্ষুর তারা অত্যন্ত বিস্তৃত (বেল্‌, হায়োস্‌, ট্রামিন্‌) ।

পাকস্থলী এবং উদর । পাকস্থলী যেন পশ্চাৎদিকে আকৃষ্ট এবং
তদ্রূপ পাকস্থলীতে সামান্য বেদনা, যাহা প্রচাপনে বৃদ্ধি হয়; পাকস্থলীতে
উষ্ণাহত্ব এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে বমনোদ্বেগ এবং গলার মধ্যে জল উঠা,
জিহ্বার গোড়ায় কোন প্রকারের স্বাদের অভাব, যাহার পর পাকস্থলীতে
এবং গলার মধ্যে বরফের দ্বায় ঠাণ্ডাবোধ হয়; পাকস্থলীর মধ্যে অঁটাবোধ
এবং তৎপর হৃৎপ্রদেশে অত্যন্ত উদ্বেগ । উদরে পূর্ণবোধ, বিশেষতঃ ডাইন
দিকে, যাহার দরুণ নিশ্বাস প্রস্থানের ব্যাঘাত জন্মে এবং উদগারে বা
দ্বার দিয়া দূষিত বায়ু নিঃসরণে যাহার উপশম হয় ।

মূত্রযন্ত্র । মূত্রের অতিরিক্ত সঞ্চার (মাস্‌, ফস্‌-আস্‌) ।

শ্বাসযন্ত্র । অনবরত আফেপিক কাশি, যাহার দরুণ মনে হয় যেন
বুক ফাটিয়া যাইবে, মুখগহ্বরের পশ্চাৎভাগে শুষ্ক শুষ্কীর দরুণ যাহার উদ্রেক
হয় এবং গলার মধ্যে ফাঁপড় করার দ্বারা বোধ হওয়ার দরুণ যাহার উদ্রেক
হয়; মধ্যে মধ্যে ক্ষণস্থায়ী শুষ্ককাশি, যাহার দরুণ মাথায় পশ্চাৎভাগ এবং

বুক ঝাকিয়া উঠে ; বৃক্ক অঁটাবোধ হওয়ার দরুণ ঘুম ভাঙ্গিয়া যায় এবং তদরূপ অত্যন্ত কষ্টান্বিত হয় (একন); বৃক্কের নানা স্থানে খিলধরা বা চাপিয়া ধরার ভ্রায় বেদনা ; বৃক্কের বাম পার্শ্বের উপরিভাগে চিন্তিনে, ঘুশ্-ঘুশে এবং ষাটিনা ধরার ভ্রায় বেদনা ; বাম পার্শ্বের খাট পাজরার হাড়ের নীচে স্ফুটী বিধানের ভ্রায় প্রথর বেদনা ।

নিদ্রা । নিদ্রাবেশ ; তৃপ্তি জনক নিদ্রা ; স্নাত্তিতে অজ্ঞানবৎ নিদ্রা ; স্নাত্তিতে অস্থির নিদ্রা ।

ব্যবহার । ইহা হোমিওপ্যাথিক মতে রোগ চিকিৎসায় কম ব্যবহৃত হইয়া থাকে । ডাক্তার আলেন্ (Dr. Allen) বলেন, অনবরত আক্ষেপিক কাশি, যাহার দরুণ মনে হয় বেন বুক ফাটিয়া যাইবে ; শ্বসনরোগের পশ্চাৎভাগে হুড়্-হুড়ী বা কুটকুটানি বা গলার মধ্যে ফাঁপড় করার ভ্রায় অনুভূত হওয়ার দরুণ এই কাশির উদ্রেক হইলে ল্যাক্টুকা বিরোসা বিশেষ উপকারী । ডাক্তার হিউজের (Dr. Hughes) মতে ইহা বক্তৃত এবং ক্ষুধা-সের কোন কোন প্রকার রক্তাধিক্য বা রক্তাবরোধ, মস্তিষ্কের দুর্বলতা এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে নিদ্রাবেশ বা ঘুমের অত্যন্ত ইচ্ছা ইত্যাদি অস্থখে ব্যবহার্য্য ।

বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ । অত্যন্ত শ্রান্তিবোধ ; শরীরে অস্বাভাবিক রকমের হাল্কাবোধ ; সামান্য কম্প ইত্যাদি এই ঔষধের বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ মধ্যে পরিগণিত ।

সমগুণ বিশিষ্ট ঔষধ । ওপিয়াম্, কফিয়া ।

ডাইলুশন বিচার । এই ঔষধের মাত্রা সম্বন্ধে এ পর্যন্ত কিছুই স্থিরীকৃত হয় নাই ।

লরোসিরেসাম্ প্রুনাস্,-লরোস্

(LAUROCERASUS PRUNUS,-LAUROC.)

পারস্য দেশ এবং আদিয়া নাইনরে এই গাছ জন্মে । পরিপক্ব কাঁচা পাতা যথা নিয়মে প্রফ্ স্পিরিটে ভিজাইয়া ইহার মূল আরোক প্রস্তুত হইয়া থাকে ।

সাধারণ ক্রিয়া । মস্তিষ্ক এবং কসেফকা মজ্জার উপর ইহার কার্য অতি প্রবল । ইহা হাইড্রোসারেনিক্ আপিডের ত্রায় মস্তিষ্কের পক্ষা-
ঘাত উৎপাদন করে ।

সাধারণ প্রাকৃতির লক্ষণ ।

মন । অচেতনতা এবং স্পর্শ জ্ঞানের সম্পূর্ণ বিনাশ (ওপিয়াম) ।

মস্তক । অবসন্নতা এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে মাথার ঘোরা ; মাথার সমুদয় অংশেই অবসন্নকারক বেদনা ; কপালে ঠাণ্ডা বোধ (আর্গিকা) ; মাথার উপরিভাগে ঠাণ্ডাবোধ (ক্যাক্স-কার্বি, কস), বাহার দরুণ মনে হয় যেন মাথায় ঠাণ্ডা বাতাস বহিতেছে এবং বাহ্য গ্রীবায় মধ্য দিয়া নিম্নদিকে পৃষ্ঠদেশে যেন নামিতেছে বলিয়া অনুভূত হয় ।

চক্ষু । একখানি অত্যন্ত পাতলা কাপড়ের মধ্য দিয়া তাকাইলে যেদৃশ্য হয়, চক্ষে সেদৃশ্য কাপ্সা দেখা (কষ্ট, হায়োস্, কস, মার্ক, পিটোল্, সাগ্ফ) ; চক্ষু বোলা এবং স্থির ভাব বিশিষ্ট, বিকৃত (বেল্, হায়োস্, ট্রামন্) ।

মুখমণ্ডল । মুখমণ্ডল নীলের আভাযুক্ত, ধূসরের আভাযুক্ত হরিজ্ঞা বর্ণ এবং যেন বসিয়া যায় ; মুখমণ্ডলের পেশীর স্পন্দন এবং আক্ষেপ (সিকুটা) ।

মুখগহ্বর এবং গলার মধ্য । দাঁতলাগা (বেল্, সিকুটা, হায়োস্, ইগ্নেস্, নাক্স-বন্, ইনাস্) ; মুখে ফেণাউটা (সিকুটা, ককিউল্, কুপ্রাম্, হায়োস্, নেজা) ; বাকরোধ (ডাক্স, জেল্, কষ্ট, নেজা) । কোন জ্বর্য গিলিতে অশক্তি (বেল্, হায়োস্, ট্রামন্) ; গলার মধ্য এবং আহার বহা গলনালীতে আক্ষেপিক সঙ্কোচন (বেল্, হায়োস্, ট্রামন্) ।

পাকস্থলী এবং উদর । উদরস্থ আহার জব্যাদি বমন এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে কাশি । নাভি হইতে কোমরের পশ্চাৎদেশে ডেগার ত্রায় কোন একটা ভারি পদার্থ হঠাৎ পড়ার ত্রায় অনুভূত হয়, কথাবল্য বা কোন প্রকার শারীরিক পরিশ্রমের দরুণ বাহ্য উৎপন্ন হয় ।

শ্বাসযন্ত্র । বৃক্কের আক্ষেপিক রকমের অস্থ (ইগ্নেস্) ; শ্বাসকষ্ট এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে মনে হয় যেন নিশ্বাসে ফুফুস যথোচিতরূপে বিস্তৃত হইবে না (আগাফিটিডা, ক্রোটন্) ; নিশ্বাস প্রস্থানে অত্যন্ত কষ্টানুভব এবং

তদ্রূপ ফাঁপড়বোধ ; কাশি এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে বুকের মধ্যস্থিত পর্দা। সমূহ শুকাইয়া গেলে ঘেরূপ হয়, বুকের মধ্যে সেরূপ বশ্‌বশ্‌ শব্দ হওয়া ; স্বপ্রদেশে স্থলীবিধানের ভ্রায় বেদনা (ক্যাল্‌ম্, ক্যালী-কার্ক) ।

হৃৎপিণ্ড এবং নাড়ী। হৃৎপিণ্ডের অনিয়মিত স্পন্দন এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে নাড়ী যুগ্মতি বিশিষ্ট (ডিক্টিট্, লাক্সাহ্) ।

নিদ্রা। নাকে গোঁ গোঁ শব্দ করিয়া ঘোরনিদ্রা ; নিত্রালুতা (আর্স্, ওপিয়াম্, সাল্‌ক্) ।

ব্যবহার। সংজ্ঞাশ রোগ ; বিশেষ বিশেষ ইন্ধিয়ার পক্ষাঘাত ; জননেন্ধিয়ার পক্ষাঘাত ; হৃৎফুসের পক্ষাঘাত ; হাত পায়ের পক্ষাঘাত ; কোরিয়ার (Chorea) ভ্রায় আক্ষেপ ; আক্ষেপের দরুণ আক্রান্ত অঙ্গের পর্য্যায় ক্রমে সঙ্কোচন এবং বিস্তৃতি (Clonic spasms) ; মূগীরোগ ইত্যাদি-অস্থখে লরোসিরেসাম্ ব্যবহার্য্য। যে প্রকার ওলাউঠাতে রোগীর শরীর নীল বর্ণ হয়, খাঁস কুচ্ছ হয় এবং পক্ষাঘাতের লক্ষণাদি দৃষ্ট হয়, ডাক্তার-জারের (Dr. Jahr) মতে সে প্রকার ওলাউঠাতে লরোসিরেসাম্ ব্যবহারে বিশেষ উপকার পাওয়া যায়।

বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ। জীবনীশক্তির হ্রাস এবং প্রতি-ক্রিয়ার অভাব (ক্যাল্‌ম্, কার্কো-বেজ্) ; অস্থখের বেদনা, যন্ত্রণাদি রোগী বড় টের পায় না ; সমুদয় শক্তির অতি শীঘ্র শীঘ্র হ্রাস (আর্স্, ক্যান্‌ফার, সিকেল্‌ কর্ণুটাম্) ইত্যাদি এই ঔষধের কতকগুলি বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ। ডাক্তার গারেঞ্জি (Dr. Guerenzy) বলেন, শৈশবাবস্থার অস্থখে সামান্য নড়াচড়াতেই রোগীর শরীর নীল বর্ণ হওয়া বা নীলবর্ণের ভাব বুদ্ধি হওয়া, অথবা পাকস্থলী এবং অঙ্গের অস্থখে গিলিবার সময় আহারবহা গলনালীতে গড়্‌ গড়্‌ শব্দ হওয়া লরোসিরেসাসের কতকগুলি বিশেষ প্রাকৃতিক নির্দিষ্ট লক্ষণ।

সমন্বিত বিশিষ্ট ঔষধ। ব্যারাইটা কার্কোনিকা, ব্রাইওনিয়া, ক্যাল্‌কেরিয়া কার্কোনিকা, হাইড্রোসারেনিক্‌ আসিড্‌, লাইকোপডিয়াম্‌, নাক্স-বমিকা, বেলাডোনা, ওপিয়াম্‌, ফক্ষরাস্‌, পাল্‌মেটিল্লা, রাস্‌টক্স্‌, সিমিয়া, সাল্‌ফার, বিরেট্রাম্‌ আল্‌বাম্‌ ইত্যাদি ঔষধের কার্য্যের সঙ্গে লরোসিরেসাসের কার্য্যের সাদৃশ্য আছে।

প্রতিষেধক ঔষধ । ক্যান্সার, কফিরা, ইলিকাক, ওপিগাম্ ।
অধিক মাত্রায় লরোসিরেসান্ দ্বারা বিষাক্ত হইলে আমোনিয়াম্ এবং
কফির গাঢ় কাত সেবা ।

ডাইলুশন বিচার । ৩য়, ৬ষ্ঠ বা ১২ ক্রমই সচরাচর অধিক ব্যবহৃত
হইয়া থাকে ।

লেপ্টাণ্ড্রা, -লেপ্ট্

(LEPTANDRA, -LEPT.)

আমেরিকার ইউনাইটেড্ স্টেট্‌সের সমুদয় স্থানেই এই গাছ জন্মে ।
কাঁচা শিকড় যথা নিয়মে প্রস্তুত্ স্পিরিটে ডিজাইয়া ইহার মূল আরোক
প্রস্তুত হইয়া থাকে । ইহার শুঁড়াও প্রস্তুত হইয়া থাকে । শুঁড়াকে লেপ্টা-
ণ্ড্রিন্ (Leptandrin) বলে । যথা নিয়মে জুগার অব্ মিল্কে মিশাইয়া
ইহার মিশ্র শুঁড়া প্রস্তুত হইয়া থাকে । ডাক্তার হেল্ (Dr Hale) বলেন
কাঁচা শিকড়ে গাছের সমুদয় অংশের গুণই থাকে ।

সাধারণ ক্রিয়া । রক্ত এবং অন্ত্রের উপরই ইহার বিশেষ কার্য
দেখিতে পাওয়া যায়, যাহার দরুণ উহার নিঃসরণ শক্তির কার্যের বৃদ্ধি হয় ।
প্রচুর পরিমাণে অত্যন্ত দুর্বলযুক্ত আল্‌কাতরার ভায় কাল গোলাণীর ভায়
ভেদ এই ঔষধের একটি বিশেষ প্রাকৃতিক নির্দিষ্ট লক্ষণ মধ্যে পরিগণিত ।
পিত্তাধিক্য হেতু শিরঃস্রাব এবং পিত্তের বিকৃতিবস্থার দরুণ যে প্রকার
অসুখ হয়, তাহাকে যদি উক্ত প্রকারের কাল্‌চে ভেদ হয়, তবে এই ঔষধ
বিশেষ উপকারী । এক্ষণেই পুরাতন আকারের উদরাময় এবং আমাশয়
রোগে এই ঔষধ প্রয়োগে কখন কখন উপকার পাওয়া যায় । ব্রাইওনিয়া,
আইরিস্, পডোফিলাম্, চায়না এবং আসিনিকের কার্যের সঙ্গে লেপ্টাণ্ড্রার
কার্যের সাদৃশ্য আছে । ১ম, ৩য় এবং ৬ষ্ঠ ক্রমের আরোকই সচরাচর
অধিক ব্যবহৃত হইয়া থাকে । কোন কোন সময় লেপ্টাণ্ড্রিনের ১ম, ২য়
বা ৩য় ক্রমের শুঁড়াও ব্যবহৃত হইয়া থাকে ।

লিলিয়াম টাইগ্রিনাম, -লিলিয়াম

(LILIAM TIGRINUM, -LIL.-TIG.)

চীন এবং জাপান দেশে এই গাছ জন্মে। অনেক সময় বাগানেও এই গাছ রোপন করা হয়। উহার ফুল এবং বিচি যথা নিয়মে ২০° ডিগ্রী ওয়ার এক্‌স্পিরিটে ভিজাইয়া ইহার মূল আরোক প্রস্তুত হইয়া থাকে।

সাধারণ ক্রিয়া। স্নিজননেক্রিয় এবং হৃৎপিণ্ডের উপর ইহার কার্য অতি প্রবল, যাহার দরুন জরায়ুর উত্তেজনা, উহাতে রক্তাধিকা বা রক্তাবরোধ এবং উহাতে কতক পরিমাণে পুরাতন আকারের (Sub-acu'a) প্রদাহ উৎপন্ন হইয়া থাকে। উহার সঙ্গে সঙ্গে জরায়ু নানা প্রকারে স্থান ভ্রষ্ট হয়। গোণ কার্য (Reflex action) দ্বারা ইহা হৃৎপিণ্ডের কার্যের অবসন্নতা উৎপাদন করিয়া হৃৎপিণ্ডের উত্তেজনার লক্ষণ, হৃৎস্পন্দন ইত্যাদি অস্বাভাবিক উৎপাদন করিয়া থাকে। জরায়ু যেন নীচের দিকে যোনিদ্বার দিয়া ঠেলিয়া বাহির হইয়া পড়িবে জরায়ুতে একরূপ অস্বাভাবিক হওয়া এই ঔষধের একটা বিশেষ প্রাকৃতিক নির্দিষ্ট লক্ষণ।

সাধারণ প্রাকৃতিক লক্ষণ।

মন। মানসিক অবসন্নতা; কান্দিবার ইচ্ছা, ভীকতা এবং সমুদ্র বিষয়েই আশঙ্কা (নাঙ্গ-মক্, পাল্‌স্, ফস্); রোগী (স্ত্রীলোক) তাহার মুক্তির বিষয় অনন্তরত ভাবিয়া সর্বদা অস্থির থাকে এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে জরায়ুর অস্বাভাবিকতা; কোন বিশেষ কর্তব্য কর্ম করিতে হইলে স্বেচ্ছা হয়, সর্বদা স্বেচ্ছা ভাড়াভাড়া করা এবং উক্ত কার্য করিতে অক্ষম হওয়া; সর্বদা অভিলাষ দেওয়া, মারা এবং অসুখ বিষয়ে চিন্তা করার ইচ্ছা ও এই প্রকার মানসিক অবস্থা হইলেই জরায়ুর উত্তেজনা কমিয়া যায়।

মস্তক। মাথা ধরা, বিশেষতঃ উহা যদি জরায়ুর অস্বাভাবিকতা জনিত হয় (কলোক্, সিমিসিক্); কপালে, চক্ষুর ঠিক উপরিভাগে ঘূর্ণ ঘূর্ণ বেদনা।

চক্ষু। নিকটবর্তী বস্তু দেখিবার শক্তির হ্রাস বা অভাব; চক্ষুর হাইপার মিট্রোপিয়া (Hypermetropia) নামক রোগ।

পাকস্থলী এবং উদর। বমনোন্মেষ এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে

ভয়াক ভুলিবার সময় গলা দিয়া জেগ্না নির্ভয়ন; কুখা শূভতা (আলান্, আস্, ক্যাক্-কার্ক্, চাঘনা, নাক্স-মফ্); মাংস খাওয়ার অত্যন্ত ইচ্ছা; পাকস্থলী এবং অন্ত্রের মধ্যে খালি খালি বোধ (ইগ্নেন্দ, হাইড্রাট্, সিপিয়া)। উদর স্ফীত এবং বিস্তৃত (ক্যাক্-কার্ক্, চাঘনা, আইকোপ্, নাক্স-বম্); উদরের মধ্যস্থিত সমুদর বস্ত্র যেন নিম্নের দিকে টানিয়া বা কদিয়া ধরিয়াছে এরূপ অনুভূত হয়, যাহা বৃকের মধ্যের যন্ত্রাদি পর্য্যন্তও যেন বিস্তৃত হয় এবং যাহার দক্ষণ রোগী তাহার উদর উপরের দিকে ঠেলিয়া ধরিয়া রাখিতে বাধ্য হয় (বেল্, প্রাটিনা, সিপিয়া); যেন উদরায়ম্ন হইবে এরূপ অনুভূত হয় (আলোজ্); প্রস্রাব করার সময়ও অনেক সময় গুহ্বার দিয়া মল বাহির হইয়া পড়ে।

মল এবং মলদ্বার।* মলদ্বারে অত্যন্ত চাপাবোধ এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে বারবার বাহ্যে যাওয়ার ইচ্ছা; প্রাতঃকালে উদরায়ম্ন (আলোজ্, কমেক্স, সালফ্); মল তরল, পিত্তগুক্ত (পডোক্); মল কাল্চে, দুর্গন্ধযুক্ত এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে অত্যন্ত বাহ্যের বেগ, যাহার দক্ষণ রোগী এক মিনিটও বাহ্যে না বাইয়া থাকিতে পারে না; দান্তের পূর্বে পেট কামড়ানী এবং কষ্টদায়ক কৌণ্ডপাড়া ও উহার সঙ্গে সঙ্গে গুহ্ব চাপাবোধ; দান্তের পর গুহ্বদ্বারে জ্বালা এবং চিড়িকমারা (আস্, ক্যাহ্); কোষ্ঠবদ্ধ।

মূত্রযন্ত্র। দিনের বেলা বারবার প্রস্রাব করা এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে মূত্রনাগীতে অত্যন্ত জ্বালা এবং চিড়িকমারা (ক্যাহ্, ক্যানাবিস্-স্ত্রাট্); মূত্রাধারে অনবরত চাপাবোধ; অনবরত মূত্রত্যাগের ইচ্ছা, কিন্তু বেগ দিলে মাত্র কএক ফোঁটা মূত্র নির্গল হয়; মূত্রত্যাগের পর মূত্রনাগীতে জ্বালা এবং চিড়িকমারা (একন্, ক্যাহ্)।

জননেশ্রিয়। স্ত্রীলোকের জরায়ু প্রদেশে ভারি এবং চাপা বোধ, যাহার দক্ষণ মনে হয় জরায়ু মধ্যো যাহা কিছু আছে তাহা যেন সমুদরই যোনিদ্বার দিয়া নিম্ন দিকে ঠেলিয়া বাহির হইয়া পড়িবে (বেল্, নাক্স-মফ্, প্রাটিনা, সিপিয়া), হাত দিয়া যোনি চাপিয়া ধরিলে যাহার উপশম হয়; ডিম্বকোষ প্রদেশে অত্যন্ত প্রথর বা তীক্ষ্ণ বেদনা (বেল্, সিমিসিক্); জরায়ুতে স্নায়ুশুলের ভার বেদনা, যাহার দক্ষণ রোগী তলপেট স্পর্শও করিতে দেয়

না এবং যাহার দক্ষণ পেটের উপর গায়ের কাপড়ের ভার বা সানান্ন ঝাঁক নিও সহ্য হয় না ; জরায়ু সমুখপানে সরিয়া বা বাঁকিয়া পড়ে ; নিম্নদিকে লজোরে ঠেলিয়া নামিলে যেরূপ হয়, জরায়ুতে সেকরূপ অনুভূত হয় এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে বাম ডিম্বকোষ এবং বাম স্তনে বেদনা ; যোনিদ্বারে অত্যন্ত চুলকানি এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে ঐ স্থানে পূর্ণবোধ ; বাম ডিম্বকোষ প্রদেশে হল ফুটানের ছায় বেদনা বা যাতনা ; শ্বেতপ্রদব এবং তদ্রূপ উজ্জল হরিদ্রা, জালা উৎপাদক এবং ক্ষতকারক ক্লেদ নিঃসরণ (আলাস্, আর্সি, ক্রিয়াজ্) যাহা কাপড়ে লাগিয়া শুকাইলে কটাবর্ণ হয়।

বক্ষ এবং হৃৎপিণ্ড । হৃৎপ্রদেশে চাপিয়া ধরার ছায় ঘৃশ্, ঘৃশে বেদনা (আরোড্, ক্যাক্ট্) ; বুকের বাম পার্শ্বে অত্যন্ত তীব্র বা প্রধর বেদনা (ক্রিয়াজ্) এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে হৃৎপিণ্ডের ধড়্ফড়ানী (স্পাইজেল্) ; হৃৎপিণ্ডের মধ্যে মোচড়াইয়া ধরার ছায় বেদনা (আর্গিকা, ক্যাক্ট্) ; অথবা হৃৎপিণ্ডে একবার ষাটিয়া ধরা এবং একবার শিথিল হওয়ার ছায় যাতনা ; হৃৎপিণ্ডের ধড়্ফড়ানি বা হৃৎস্পন্দন (নেট্রাম্-মিউর)।

পৃষ্ঠদেশ । শুষ্ক দ্বারের ঠিক উপরিভাগের হাড়ে ঘৃশ্, ঘৃশে বেদনা (ইস্কুলাস) ; শুষ্ক দ্বারের ঠিক উপরিভাগে বেন উপর দিকে ঠেলিয়া উঠার ছায় অনুভূত হয়।

অঙ্গ প্রত্যঙ্গ । অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ঠাণ্ডা এবং চট্‌চটিয়া আঠা যাহা মন উত্তেজিত হইলেই অধিক হয় ; হাত পায়ের পাতার তালুতে জালাবোধ ; ডাইন কুঁচ্কি বা উকুর সন্ধিতে বেদনা যাহা উরুদেশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয় ; পক্ষাঘাতে যেরূপ হয়, হাত এবং হাতের আঙ্গুলে সেকরূপ কুট্‌কুটানি।

ব্যবহার । জীলোকের ডিম্বকোষের উত্তেজনা, প্রদাহ অথবা উহাতে দ্রাব্যশূলের ছায় বেদনা ; হিষ্টিরিয়া ; জরায়ুর কতক পরিমাণে পুরাতন (Sub-acute) প্রদাহ ; জরায়ু স্থান ভ্রষ্ট হওয়া বা সরিয়া পড়া ; জরায়ু সমুখ পানে সরিয়া বা বাঁকিয়া পড়া ; জরায়ু পশ্চাৎদিকে বাঁকিয়া বা সরিয়া ও মোচড়াইয়া পড়া ; শ্বেতপ্রদব ; হৃৎপিণ্ডের ত্রায়বিক অনুধ ; উদরাময় ; চকুর পাতার স্পন্দন ইত্যাদি অনুরূপে লিগিয়াম্ ব্যবহার্য্য।

বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ । দুর্দলতা, শরীর কম্পন ; চলিলে

বেদনার বৃদ্ধি, অথচ চলা বন্ধ করিলে বেদনা এত অসহ্য হইয়া পড়ে যে উহার দরুণ রোগী (পুরুষ) পুনরায় চলিয়া বেড়াইতে বাধ্য হয় ; শরীরের কোন কোন স্থানে বেদনা ; শরীরের স্থানে স্থানে স্থান পরিবর্তক বেদনা (পাল্‌স্) ; শরীরের স্থানে স্থানে দপ্‌দপনি, যাঁহার দরুণ মনে হয় যেন সমুদ্র রক্তবহা নাগীতেই দপ্‌দপ্‌ কবিতেছে ; যন্ত্রাদির স্বেচ্ছাপূর্ব্বক কার্য্য করার শক্তিহীন হওয়ার দরুণ রাত্রিতে বাতনাদির বৃদ্ধি এবং দিনের বেলা, বিস্তৃত বায়ুতে, সর্ব্বদা কাজ কর্ষে নিযুক্ত থাকিলে এবং উষ্ণ ঘরে অল্পখের উপশম ; জরায়ু নিম্নদিকে যোনি দ্বারা দিয়া ঠেলিয়া নামিতেছে একরূপ অল্পভূত হওয়া এবং তদরূপ যোনি চাপিয়া ধরিতে বাধ্য হওয়া এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে ডিম্বকোষ, জরায়ু এবং যোনি দ্বারাদির ক্ষীণতা ও বেদনা লিলিয়ামের কতকগুলি বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ ।

সমগুণ বিশিষ্ট ঔষধ । লিলিয়ামের মানসিক লক্ষণের সঙ্গে প্রাটিনার লক্ষণের বিশেষ সাদৃশ্য আছে এবং জরায়ুর উপর ইহার কার্য্যের সঙ্গে হেলোনিয়াসের কার্য্যের বিশেষ সাদৃশ্য আছে । এতদ্ভিন্ন ইহার কার্য্যের সঙ্গে ক্যাষ্টাস্, ক্যাস্টারিস্, সিমিসিকিউগা, নাক্স-বমিকা, পিডোফিলাম্, পাল্‌স্‌টেলা, সিসিয়া এবং স্পাইজেলিয়ার্ কার্য্যও অনেক সাদৃশ্য আছে ।

প্রতিষেধক ঔষধ । হেলোনিয়াস্, নাক্স-বমিকা ।

ডাইলুশন বিচার । ১ম এবং ২য় দশমিক ডাইলুশনই সচরাচর অধিক ব্যবহৃত হইয়া থাকে । কোন কোন চিকিৎসক এই ঔষধের মূল আরোকও ১ ফোঁটা মাত্রাঙ্গ, ব্যবস্থা করিয়া থাকেন ।

লোবিলিয়া ইন্ফ্লেটা, -(ভারতবর্ষীয় তামাকু, -লোবিলিয়া

(LOBELIA INFLATA, -(INDIAN TOBACCO), -LOB-INF.)

এই গাছের সমুদ্র অংশ যথানিয়মে প্রফ্‌ স্পিরিটে ভিজাইয়া মূল আরোক প্রস্তুত হইয়া থাকে । আবার কেহ কেহ ইহার শুকনা গাছ যথানিয়মে ইথারে (Ether) ভিজাইয়া মূল আরোক প্রস্তুত করিবার ব্যবস্থা

দিয়া থাকেন । আবার কেহ কেহ শুকনা গাছের শুঁড়ার সঙ্গে যথা নিয়মে মৃগার অব্ মিক্ মিশাইয়া ইহার মিশ্র শুঁড়াও প্রস্তুত করিতে ব্যবস্থা দিয়া থাকেন ।

সাধারণ ক্রিয়া । মস্তিষ্ক এবং কসেরূকা মৰ্জা সম্বন্ধীয় দ্রাবু, বিশেষতঃ নিউমোগ্যাস্ট্রিক্ দ্রাবু ব উপর ইহার কার্য্য অতি প্রবল, যাহার দরুণ দ্রাবুগুলি অবসন্ন এবং শিথিল হয় এবং তদরূপ বৃকে কষ্টবোধ হয়, শ্বাসপ্রশ্বাস এবং গিলিবার ব্যাধাত জন্মে ও উহার সঙ্গে সঙ্গে উদরোর্ক প্রদেশে কষ্টবোধ, বমনোদ্বেষ্ট এবং বমন হইয়া থাকে ।

সাধারণ প্রাকৃতিক লক্ষণ ।

মন । অত্যন্ত মানসিক অবসন্নতা (ইগ্নেন্স্, লাইকোপ্, পাল্‌স্) ; মৃত্যুভয় এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে শ্বাসকষ্ট (অস্ম্) ।

মস্তক । মাথাঘোরা এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে বমনোদ্বেষ্ট (আলাম্, আন্টি-ক্রুড্) ; কপালের চতুঃপার্শ্বেই চাপিয়া ধরার জ্বায় ঘূশ্ ঘূশ্বে বেদনা বা ভারিবোধ যাহা কপালের এক পার্শ্ব হইতে অপর পার্শ্ব পর্য্যন্ত ব্যাপিয়া থাকে ; মাথার পশ্চাৎদেশের বামদিকে চাপিয়া ধরার জ্বায় বেদনা, রাত্রিতে এবং নড়াচড়াতে যাহার বৃদ্ধি হয় ।

মুখগহ্বর এবং গলার মধ্য । মুখদিয়া প্রচুর পরিমাণে লাল পড়া (আয়োড্, আইরিস্, মাক্) ; মুখে বিস্ত্রী স্বাদ, জিহবার অগ্রভাগ এবং গলার মধ্যের পশ্চাৎভাগেই যাহা অধিক অনুভূত হয় । মনে হয় যেন আহার বহা গলনালী নিম্নদিকে হইতে উপরদিকে সঙ্কুচিত হইয়া রাহিয়াছে ; মনে হয় যেন পাকস্থলীর মধ্যে ডেলার জ্বায় কোন পদার্থ লাগিয়া বা চাপিয়া রাহিয়াছে (বেল্, ল্যাক্) ।

পাকস্থলী । ক্ষুধাশূন্যতা এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে মুখে জ্বালামুক্ত স্বাদ (অস্ম্) ; পাকস্থলীর অনুরোগ এবং পাকস্থলীর মধ্যের সঙ্কোচন ; উদগার দ্বারা দ্রাবু নিঃসরণ (কার্কো-বেজ্, চায়না, ফস্) ; অনবরত প্রবল বমনোদ্বেষ্ট (আন্টি-টার্ট্, ইপিকাক্, ডিজিট্) ; প্রাতঃকালে বমনোদ্বেষ্ট যাহা এক ঢোক জল গিলিলেই দূরীভূত হয় ; বমনোদ্বেষ্ট এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে পাকস্থলীতে অকথ্য বেদনা, কষ্টানুভব ; বৃক জ্বালা এবং উহার

সঙ্গে সঙ্গে মুখ দিয়া জল উঠা ও পাকস্থলীতে কষ্টানুভব (আস্) ; উদরোচ্চ প্রদেশে দুর্বলবোধ এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে বৃকে আঁটা এবং কষ্টবোধ (আস্) ; পাকস্থলীতে জ্বালাবোধ (আস্, ক্যাঙ্ক-কার্ক, ক্যাঙ্ক, মেজিরিয়াস্) ।

শ্বাসযন্ত্র । অত্যন্ত শ্বাসকষ্ট, বৃকে আঁটাবোধ হওয়ার দরুণ বাহার উদ্রেক হয় (আস্, কস্) ; শ্বাস কষ্ট ।

মূত্রযন্ত্র । মূত্রে গোলাপের ছায়া লাল তলানী পড়ে এবং তলানীতে ইউরিক আসিডের ক্রিষ্টাল (Uric Acid Crystals) থাকে ।

ব্যবহার । অনেকানেক অস্থিরের সঙ্গে সঙ্গে, বিশেষতঃ শ্বাস যন্ত্রের অস্থিরের সঙ্গে, বমনোদ্বেষ্ট এবং বমন ; অজীর্ণ ; পাকস্থলীতে বেদনা এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে বমন ; অস্ত্রের এক অংশ অত্র অংশে প্রবিষ্ট হইয়া লাগিয়া বা বদ্ধ হইয়া থাকা (Intussusception of the bowels) ; কঙ্ক অত্র বৃদ্ধি (Incarcerated Hernia) ; শুষ্কদ্বার এবং ঘোনিদ্বারের মধ্যবর্তী স্থান (Perineum) এবং গুদায়ুর মুখের কঠিনতা ; ছপিকফ বা কাশি ; বায়ুনল প্রদাহ ; আক্কেপিক কাশি ; ঘুংড়ী কাশি ; হাঁপানী কাশি ; হৃৎস্পায়শূল বা হৃৎবেদনা (Angina Pectoris) ; হিষ্টিরিয়া ; বাতরোগ ; সবিরাম বা পাংগা-অর ; বৃক জ্বালা ; অগ্নরোগ ; ফুফুসের ক্ষুদ্র বায়ুনলীর বিস্তৃতি (Emphysema of the lungs) ইত্যাদি অস্থিরে লোবিলিয়া ইন্ফেন্টা ব্যবহার্য্য ।

বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ । অত্যন্ত বলক্ষয় এবং প্রান্তিবোধ ; মাথায় গরম এবং পূর্ণবোধ ও উহাতে কখন কখন কন্কনানি ; অনবরত কষ্ট-দায়ক স্বপ্ন দেখা ; চক্ষে এক বস্তুর সমুদয় অংশ দৃষ্ট না হইয়া কেবল কতক অংশ দৃষ্ট হয় ; গলার মধ্যে চুলকানি, জ্বালা এবং শুষ্কবোধ ; একটা কাঁটা মারিয়া রাখিলে বেক্রপ হয়, পাকস্থলীর মধ্য দিয়া বেক্রদণ্ড পর্য্যন্ত সেরূপ অস্থিত হয়, বাতা ডাইন এবং বামদিকে বিস্তৃত হয় এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে মোচড়া-নের ভায়া অস্থিত হয় ; ডাইন পাখের কৃত্রিম পাঁজরার হাড়ের ধারে কোন এক নির্দিষ্ট স্থানে বেদনা, বাহা উদরোচ্চ প্রদেশের মধ্য দিয়া বাম স্বক্কাস্থির চতুর্দিক পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয় এবং বেদনার আক্রমণের পর আক্রান্ত স্থান বেশ অসাড় হইয়া যায় ; উদরের ক্ষীতি এবং বিস্তৃতি, বাহার দরুণ শ্বাস প্রবাহের ব্যাঘাত জন্মে ; অতিরিক্ত পরিমাণে মূত্রত্যাগ ; পুরুষের জননেন্দ্রিয়ে অত্যন্ত

কষ্টদায়ক ভারিবোধ ; সমুদয় শবীরে কুট্‌কুটানি বাহা হাত পায়ের আঙ্গুল পর্য্যন্তও বিস্তৃত হয় ; ঠাণ্ডা লাগিলে, বিশেষতঃ ঠাণ্ডা জলে স্নান করিলে, অস্থির বৃদ্ধি : শেষ বেলা বা সন্ধ্যার সময় অস্থির বৃদ্ধি ইত্যাদি লোবিলিয়া ইন্‌ফেউটার কতকগুলি বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ ।

সমগুণবিশিষ্ট ঔষধ । লোবিলিয়া ইন্‌ফেউটার কার্যের সঙ্গে আন্টিমোনিয়াম্‌ টার্টারিকাম্‌, ডিজিটালিন্‌, ইপিকাকিউএনা এবং টেবেকামের কার্যের বিশেষ সাদৃশ্য আছে। এতদ্ভিন্ন ইহার কার্যের সঙ্গে আসিনিঙ্ক এবং বিরেটাম্‌ আল্‌বামের কার্যেবও সাদৃশ্য আছে ।

প্রতিষেধক ঔষধ । ইপিকাকিউএনা ।

ডাইলুশন বিচার । ১ম, ৩য় এবং ৬ষ্ঠ দশমিক ডাইলুশনই সচরাচর অধিক ব্যবহৃত হইয়া থাকে । ইঁপানি কাশিতে মূল আরোক এক ফোঁটা মাত্রায় ব্যবহার করিয়া বিশেষ উপকার দর্শিতে দেখা যায় । ২১৩টী রোগীর ইঁপানি কাশির চিকিৎসায় এই ঔষধের মূল আরোক ১ ফোঁটা মাত্রায় ব্যবহার করিয়া আশাতিরিক্ত ফল পাওয়া গিয়াছে । গা বমী বমী করা, অনবরত শ্বাসরোধ হওয়া, ঠাণ্ডা লাগিলে বা সামান্য শারীরিক পরিশ্রমে ইঁপানির বৃদ্ধি ইত্যাদি লক্ষণ উক্ত কএকটি রোগীতেই বর্তমান ছিল । ইঁপানি কাশিতে লেখক এই ঔষধের মূল আরোক ১ ফোঁটা মাত্রায় সচরাচর ব্যবহার করিয়া বিশেষ ফল পাইয়া থাকেন ।

ম্যাগ্নেসিয়া কার্বোনিকা,-কার্বোনেট্‌ অব্‌

ম্যাগ্নেসিয়া,-ম্যাগ্ন-কার্ব্‌

(MAGNESIA CARBONICA,-CARBONATE OF MAGNESIA,-MAG.-CARB.)

কোন এক বিস্মৃত হোমিওপ্যাথিক ঔষধালয় হইতে আদত কার্বোনেট্‌ অব্‌ ম্যাগ্নেসিয়া ক্রয় করিয়া উহা যথা নিয়মে সুগার অব্‌ মিষ্টকর সঙ্গে মিশাইয়া ৩য় শততমিক ক্রম পর্য্যন্ত গুঁড়া প্রস্তুত হইয়া থাকে । ৩য় শততমিক ক্রমের গুঁড়া হইতে যথা নিয়মে ইহার ৪র্থ শততমিক ক্রমের আরোক প্রস্তুত হইয়া থাকে ।

সাধারণ ক্রিয়া । অস্ত্রের মৈথ্রিক কিল্লী এবং জ্বী-জননৈন্দ্রিয়ের উপর ইহার কার্য অতি প্রবল, যাহার দরুণ অস্ত্রের উত্তেজনা এবং মৈথ্রিক প্রদাহ ও জ্বীলোকের রক্তস্রাব সম্বন্ধীয় অস্থি উপর হইয়া থাকে ।

সাধারণ প্রাকৃতিক লক্ষণ ।

মস্তক । মাথায চাপিয়া ধরার ভ্রায় বেদনা ; মাথায় রক্তাধিক্য ; মাথার চুল পড়িয়া যাওয়া (গ্রাফ্, মার্ক্, নাইট্-ক্-আস্, নেট্রাম্-মিউর, ফস্, দিপিয়া) ; মাথায় শুক রকমের ফুসুড়ী বা টেটার (Totter), ভিজিলে এবং বৃষ্টির দিনে বাহ্য চুলকাশ ।

চক্ষু । প্রাতঃকালে চক্ষুর পাতায় পাতায় লাগিয়া থাকে (ক্যাক্-কার্ক্, লাইকোপ্, মার্ক্, পাল্-স্, সাল্-ফ্) ।

কর্ণ । কানে কম শুনা ।

মুখমণ্ডল । রাত্রিতে গালের হাড়ে ছিঁড়িয়া ফেলা, খনন করা বা ছিদ্র করার ভ্রায় বেদনা, বিশ্রাম কালীন যাহার বৃদ্ধি হয় এবং যাহার দরুণ রোগী ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইতে বাধ্য হয় ।

মুখগহ্বর । রাত্রিতে দাঁতের গোড়ায় বেদনা, যাহার দরুণ রোগী বিছানা হইতে উঠিয়া ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইতে বাধ্য হয় ; বিশ্রাম কালীন দাঁতের গোড়ায় বেদনা অসহ্য হইয়া পড়ে ; ঠাণ্ডাতে দাঁতের গোড়ায় বেদনার বৃদ্ধি ; গর্ভাবস্থায় দাঁতের গোড়ায় বেদনা ; মুখদিয়া রক্তমিশ্রিত থুথু উঠে ; মুখে তিক্ত বা টক স্বাদ (চায়না, নাস্-বন্) ।

পাকস্থলী এবং উদর । ফল এবং টক দ্রব্যাদি খাওয়ার ইচ্ছা (আন্টি ক্রুড, আন্টি-টার্ট, চায়না, হিপ্-সাল্-ফ্, ফস্, আস্, বিরেট্-আল্) ; মাংস খাওয়ার ইচ্ছা (এবিস্-ক্যান্) ; কাঁচা দ্রব্য খাওয়ার অনিচ্ছা ; অত্যন্ত প্রবল পিপাসা, সন্ধ্যাকালেই পিপাসার বৃদ্ধি হয় ; পাকস্থলীতে সঙ্কোচক বেদনা । উদর ক্ষীত এবং বিস্তৃত ও উহার সঙ্গে সঙ্গে গুল্মদ্বার দিয়া প্রচুর পরিমাণে দূষিত বায়ু নিঃসরণ এবং দূষিত বায়ু নিঃসরণের দরুণ উদরের ক্ষীতি এবং বিস্তৃতির অনেক উপশম হয় ; উদরের সমুদয় অংশেই কামড়ানী, কর্তনব্য বেদনা এবং গড়্-গড়্, কল কল শব্দ হওয়া ও তৎপর সবুজ রঙ্গের তরল ভেদ, কিন্তু কোঁথপাড়া বর্তমান থাকে না ।

মল এবং মলদ্বার । স্বচীবিধির ধাক্কিলে বেক্রপ হয়, ওহুবারে সেক্রপ বেদনা বা বাতনা (আলোজ); মল সবুজবর্ণের কেশার ভায় অথবা জমাট ঘোষের ভায় ডেলা ডেলা সাদা পদার্থ বিশিষ্ট; কোষ্ঠবদ্ধ (আমন-মিউর, আলাম্, ব্রাই, নাক্স-বন্, ওপিয়ার্) ।

জননেন্দ্রিয় । স্ত্রীলোকের নিয়মিত সময়ের অনেক পর এবং অতি অল্প পরিমাণে রজঃস্রাব; দিনের বেলা অপেক্ষা রাত্রিতে রজঃস্রাব অধিক হয়; গাঢ়, চট্‌চটিয়া আঠা, জালা উৎপাদক আলকাতরার ভায় কাল রজঃস্রাব ।

নিদ্রা । শেষ রাত্রি ২ বা ৩ টার পর ঘুম ভাঙ্গিয়া যায় এবং তৎপর আর ঘুম হয় না ।

চর্ম্ম । সমুদয় শরীরে চুলকানি ।

জ্বর । রাত্রিতে অত্যন্ত আত্যন্তরিক 'উষ্ণতা এবং ঘর্ম্ম; গায়ের কাপড় কেলিতে অনিচ্ছা ।

ব্যবহার । উদরাময়, বিশেষতঃ শিশু এবং ছোট বালক বালিকা-মণের; অঙ্গীর্ণ; কোষ্ঠবদ্ধ; শূল বেদনা; রজঃস্রাব ষটিত অস্থখ (অর্থাৎ স্বল্প রজঃস্রাব বা গোপে রজঃস্রাব); অতিরিক্ত রজঃস্রাব বাহা রাত্রিতে বিছানায় শয়ন করিলেই অধিক হয়; গর্ভাবস্থায় দন্তশূল; চক্ষে ছানি পড়া (Cataract) ইত্যাদি অস্থখে ম্যাগ্নেসিয়া কার্বোনিকা ব্যবহার্য্য ।

বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ । সমুদয় শরীরে বাতের বেদনার ভায় বেদনা; অঙ্গ প্রত্যঙ্গে ক্লাস্তিবোধ, বিশেষতঃ বসিয়া থাকা সময়ে শায়ের পাতায়; অনেকক্ষণ বসিয়া থাকিলে, বিশেষতঃ সন্ধ্যার সময়, অঙ্গ প্রত্যঙ্গে অস্থখবোধ; বিশ্রাম কালীন বা বিছানায় শয়ন করিলে, (দাঁতের বেদনামির), রাত্রিতে, বসিয়া থাকা কালীন, ঠাণ্ডা বাতাসে অস্থখের বৃদ্ধি এবং নড়াচড়াতে অস্থখের উপশম ইত্যাদি ম্যাগ্নেসিয়া কার্বোনিকার কতক গুলি বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ ।

সমগুণবিশিষ্ট ঔষধ । ম্যাগ্নেসিয়া কার্বোনিকার কার্য্যের সঙ্গে আর্সিনিক, আলোজ, ক্যালকেরিয়া কার্বোনিকা, ক্যানোমিগা, গ্রাফাইটস্, লাইকোপডিয়াস্, নাইট্রিক আসিড্, নাক্স মফাটা, ফুফুরাস্, সিপিগা, সাইলিসিয়ার কার্য্যের সাদৃশ্য আছে ।

প্রতিষেধক ঔষধ । ক্যামোমিলা, পাল্‌গেটীলা, মার্কিউরিয়াস্,
নাক্স-বম্, ক্রম্ ।

ডাইলুশন বিচার । হানিমানের মতে ইহার ৬ষ্ঠ শতভাগিক
ক্রমের আরোক ব্যবহার্য্য । আমরাও ৬ষ্ঠ ক্রম সচরাচর অধিক ব্যবহার
করিয়া থাকি ।

ম্যাগ্নেসিয়া মিউরিয়াটিকা, -মিউরিয়েট্ অব্ ম্যাগ্নেসিয়া, -ম্যাগ্ন - মিউর

(MAGNESIA MURIATICA; -MURIATE OF MAGNESIA, -MAG.-MUR.)

কোন এক বিশস্ত হোমিওপ্যাথিক ঔষধালয় হইতে আদত মিউরিয়েট্
অব্ ম্যাগ্নেসিয়া ক্রয় করিয়া যথা নিয়মে ২০° ডিগ্রী ওবার্ণক্ স্পিরিটে
মিশাইয়া ইহার ১ম দশমিক ক্রমের আরোক প্রস্তুত হইয়া থাকে । ২য় এবং
ততোধিক ক্রমের আরোক যথা নিয়মে রেক্টকাইড্ স্পিরিটে প্রস্তুত
হইয়া থাকে ।

সাধারণ ক্রিয়া । গ্যাংলিয়োনিক্ সায়ম্‌গুলের (Ganglionic System
of nerves) উপর ইহার কার্য্য দেখিতে পাওয়া যায় । গ্রেগ্নিক্ কিল্লোর
উপরও ইহার স্থানিক কার্য্য করার ক্ষমতা আছে ।

সাধারণ প্রাকৃতিক লক্ষণ ।

মন । সর্ব্বদা চিড়্ চিড়্, খিট্ খিট্ করা এবং বিমর্ষভাব ।

মস্তক । মাথায় ভারিবোধ এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে গা টালা, বাহ্যিক
দ্রুণ রোগী টলিয়া পড়িবার উপক্রম হয় ; কপালে আঁটা এবং চাপাবোধ ;
সন্ধ্যার সময় বা প্রথম রাত্রিতে শয়ন করিলে কপালের ছই পার্শ্বে কাম-
ড়াণ বা ষোঁড়াইয়া ধরা বা নিঃড়াণের স্থায় বেদনা, বাহ্যিক দ্রুণ মনে
হয় যেন মাথাঘোরা এবং অচেতনতা শীঘ্রই আবস্ত হইবে, হাত দিয়া
প্রবল প্রচাপনে বাহ্যিক উপশম হয় ; কপালের ডাইন পার্শ্বে ছিঁড়িয়া ফেলা

বা সূচী বিধানের জায় বেদনা, যাহা চক্ষু পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয় এবং চাপিয়া ধরিলে যাহার উপশম হয় ; মাথা ঢাকিয়া বাধিয়া রাখিলে মাথা বেদনার উপশম হয় (সাইলিসি) ।

চক্ষু । চক্ষু প্রদাহযুক্ত এবং উহাৰ সঙ্গে সঙ্গে চক্ষুর স্বেতাংশ লাল বর্ণ হওয়া ও উহাতে ভয়ানক জ্বালা বোধ এবং রাত্রিতে চক্ষুর পাতায় পাতায় লাগিয়া থাকা (কাক্-কার্ক, লাইকোপ্, মার্ক্, রাস্ টক্স, পাল্, সাল্) ।

কর্ণ । কানেব মধ্যে চিড়িকমারা বা দণ্ডপানি ।

নাসিকা । সর্দি, যাহার দরুণ কখন কখন নাসারন্ধ্র ক্লব হইয়া থাকে, কখন বা নাকদিয়া প্রচুর পরিমাণে জলবৎ স্লেয়া নির্গত হয় এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে মাথায় চিমাবোধ ও স্বাদ এবং আত্মাণ শক্তির সম্পূর্ণ বিনাশ হয় ; নাক এবং নাসারন্ধ্রে বধ্যবস্ত্রী উপাঙ্গির আবরক চর্ম্ম লালবর্ণ এবং ক্ষীত হয় ; নাসারন্ধ্রে টাটানি বা জ্বালাযুক্ত বেদনা ; নাকের মধ্যে মাম্ভী (চুম্ভী) পড়ে, যাহার দরুণ নাক স্পর্শ করিলে বেদনার উদ্রেক হয় ; নাসারন্ধ্রের মধ্যে ক্ষত ।

মুখমণ্ডল । মুখ মণ্ডল শিটা, হরিদ্রার আভাযুক্ত ; মুখমণ্ডলে ফুৰুড়ী (বায়েলা-টুক) ।

মুখগহ্বর এবং গলার মধ্য । মনে হব যেন উপরের মাজীর ঠিক মধ্য ভাগস্থিত ইনসিস্সর্ (Incisors) নামক দাঁত স্বাভাবিক অপেক্ষা লম্বা হইয়াছে ; দন্তমাড়ি ক্ষাত হয় এবং উহা হঠাৎ সহজেই রক্ত পড়ে ; মুখের মধ্যে অনবরত সাদা ফেগার জ্বায়ে থুথু উঠে । গলাব মধ্য শুক এবং ছাল উঠিয়া যাওয়ার জায় অল্পভূত হয় এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে স্বরভঙ্গ ; গলায় থেকুর দিতে দিতে গলাদিয়া গাঢ় চট্‌চট্‌িয়া মাঠা এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে কখন কখন রক্ত মিশ্রিত স্লেয়া নির্গত হয় ।

পাকস্থলী এবং উদর । ক্ষুধা থাকে বটে, কিন্তু যোগীর কোন নির্দিষ্ট দ্রব্য খাওয়ার ইচ্ছা থাকে না ; প্রবল পিপাসা (একন্, আর্ম্, ব্রাই, থেল্, রাস্ টক্স) ; পাকস্থলী হঠাৎ মুখের মধ্যে জ্বল উঠে এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে বমনোবেগ ; প্রাতঃকালে ঘুম ভাঙ্গিলেই বমনোবেগ (ক্যালেন্ড্, নাক্স-বন্, পিটোল্, পাল্) ; পাকস্থলী হঠাৎ আহারবহা গণনালাতে

যেন গোলার আয় কোন পদার্থ ঠেলিয়া উঠিতেছে একরূপ অস্বভূত হব (আলাক), উৎকার উঠিলে বাহার উপশব্দ হব : ক্ষত হইলে বা মোচড়াইয়া পড়িলে বা খেঁতলিয়া গেলে ঘেঁরুপ হয়, পাকস্থলীতে সেকরূপ বেদনা । স্পর্শনে বা চলিয়া বেড়াইলে যন্ত্রিতে বেদনা, ডাইন পার্শ্ব শয়ন করিলে যাগার বৃদ্ধি হয় ; যকৃত কঠিন এবং বড় হয় ; রাত্রিতে উপবে কনিধা ধরার আয় বেদনা ; উদরে খিল ধরার আয় বেদনা ।

মল । মল অপ্রচুর, কঠিন এবং অতি কষ্টে আস্তে আস্তে মলবার দিরা নির্গত হয় ; মল ভেড়ার মলের আয়, গুটিলে (আলাম্, ক্যালো-কার্ক্, ওপিয়াম্) ; নেড়মল গুহ্বারের বাহির হইলেই ভাঙ্গিয়া খণ্ড খণ্ড হইয়া যায় ; পুৰাতন আকারের উপরাময়ের বারম্বার অক্রমণ ।

মূত্রযন্ত্র । উদরের পেশীগুলি নাচের দিকে চাপিয়া ধরিলেই কেবল মূত্র নির্গত হয় ; ফোঁটায় ফোঁটায় মূত্র নির্গত হয় এবং মূত্রত্যাগের পর মনে হয় যেন মূত্রাপারে আরো মূত্র সঞ্চিত রহিয়াছে ।

জননেন্দ্রিয় । নিয়মিত সময়ের অনেক পূর্বে স্ফালোকের প্রচুর রজঃস্রাব (ক্যাক্-কার্ক্, নাগ্-বম্) ; রজঃস্রাবের সময় মুখমণ্ডল শিটা বা ফিকা এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে কোমরে বেদনা এবং মানসিক অবলম্বতা ; জরায়ুতে খিলধরা, যাহা উকদেশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয় ; মলত্যাগের পর, বা জরায়ুতে খিলধরার পরই শ্বেতপ্রদর নিঃসরণ ।

শ্বাস যন্ত্র । প্রাতঃকাল এবং নক্যাব সময় শুককাশি এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে বুকের মধ্যে জ্বালা এবং টাটানি ; রাত্রিতে অকোপিক কাশি এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে গলার মধ্যে হুড়্-হুড়া (হারোন্) ; বুকের মধ্যে আঁটা এবং কনিধা ধরার আয় অস্বভূত হয় ।

হৃৎপিণ্ড । বসিয়া থাকিলে হৃৎস্পন্দন, চলিলে বা নড়াচড়াতে যাহা থাকে না ।

অঙ্গ, প্রত্যঙ্গ । প্রাতঃকালে ঘুম ভাঙ্গিলেই বাহুতে অবশবোধ ; পায়ের পাতায় ঘর্ম ।

নিদ্রা । দিনের বেলা অত্যন্ত ঘুম পায় ; অনেক রাত্রি না হইলে ঘুম পায় না ; গরমবোধ হওয়া এবং পিপাসার দরুন ঘুম হয় না ; চক্ষু

বুজিলেই অস্থিরতা ; ঘুম দ্বারা কোন প্রকারের তৃপ্তি অহুত হয় না ; অতঃ-
এব প্রাতঃকালে ঘুম ভাঙিলে রোগী অত্যন্ত শ্রান্তি অনুভব করে ।

জ্বর । প্রতিদিন সন্ধ্যার সময় শীতবোধ, যাহা বিছানায় শয়ন করি-
লেই দূরীভূত হয় ।

ব্যবহার । আক্কেপিক এবং হিষ্টিরিয়া রোগ জনিত অমুখ ; মাথা
ধরা ; শ্বাসশূল ; শিশুগণের দাঁত উঠিবার সময় অমুখ ; পাকস্থলী এবং
যকৃতের অমুখ ; যকৃতের বিবৃদ্ধি এবং কঠিনতা ; জরায়ুতে খিলধরা ; কোষ্ঠ
বদ্ধ ; শ্বेतপ্রদর ; অতিরিক্ত রক্তস্রাব ইত্যাদি অমুখে ম্যাগ্নেসিয়া মিউ-
রিয়াটিকা ব্যবহার্য্য ।

বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ । ব্যবহার আক্কেপের আক্রমণ এবং
হিষ্টিরিয়া জনিত দুর্বলতা (অনাকিউডা) ; সন্ধ্যার সময় বা প্রথম রাত্ৰিতে
বিছানায় শয়ন করিয়া চক্ষু বুজিলে সমুদয় শরীরের দুর্বলতা, যাহা মনে হয়
যেন পাকস্থলী হইতে আরম্ভ হয় ; বসিলেই লক্ষণাদি আরম্ভ হয় এবং নড়া-
চড়াতে বা শারীরিক পরিশ্রমে এবং বহির্লব্ধিতে অমুখের উপশম ইত্যাদি
ম্যাগ্নেসিয়া মিউরিয়াটিকার কতকগুলি বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ । জ্ঞানলোক,
বিশেষতঃ বাহাদিগের হিষ্টিরিয়া এবং জরায়ুর অমুখ আছে, তাহাদিগের পক্ষে
এবং শিশুগণের দাঁত উঠার সময় অমুখে এই ঔষধ বিশেষ উপকারী ।

সমন্বিত বিশিষ্ট ঔষধ । ব্যরাইটা কার্বোনিকা, ব্রাইডনিয়া,
ক্যাকেরিয়া কার্বোনিকা, ক্যানোনিকা, গ্রাহাইটস্, ক্যালা কার্বোনিকা,
লাইকোপডিয়াম্, নাইট্রিক্ অ্যানিড্, নাইল্-বনিকা, পালনেটিলা, সাগ্ফার ।

প্রতিষেধক ঔষধ । ক্যামোমিলা ।

ডাইলুশন বিচার । ডাক্তার বেজের (Dr. Bayes) মতে এই
ঔষধের ৩য় এবং ৬ষ্ঠ ডাইলুশন ব্যবহার্য্য । লেখকও উক্ত দুই ক্রমই সচরাচর
অধিক ব্যবহার করিয়া বোধোচিত ফল পাইয়া থাকেন ।

মার্কিউরিয়াস্-বিনায়োডেটাস্,-বিনায়োডাইড্ অব্ মার্ক্যারি,-মার্ক্-বিন্

(MERCURIUS BINIODATUS,-BINIODIDE OF MERCURY,-
MERC.-BIN.)

কোন এক বিখ্যাত হোমিওপ্যাথিক ঔষধালয় হইতে রেড্ আয়োডাইড্ অব্ মার্ক্যারি (Red Iodide of Mercury) ক্রয় করিয়া যথানিয়মে উহাতে সুগার অব্ মিক্ মিশাইয়া ত্রয় শততমিক ক্রম পর্যন্ত ইহার গুঁড়া প্রস্তুত হইয়া থাকে। ত্রয় শততমিক ক্রমের গুঁড়া হইতে যথানিয়মে ৪র্থ শততমিক ক্রমের আরোক প্রস্তুত হইয়া থাকে।

সাধারণ ক্রিয়া। অত্যন্ত প্রকারের পারা বা পারা ঘটত ঔষধের ত্রায় ইহাও গলার মধ্যের গ্রন্থি এবং শৈল্পিক বিল্লী আক্রমণ করিয়া থাকে। ইহার কার্যের সঙ্গে আয়োডিনের কার্যের অনেকটা সাদৃশ্য আছে।

সাধারণ প্রাকৃতিক লক্ষণ।

মন। সর্বদা মনের অবসন্নতা এবং কাদিবার ইচ্ছা (ইগ্‌নেস্, নেট্রাম্-মিউর, নাস্ক্-মক্, পাল্‌স্, রাস্-টক্স্)।

মস্তক। মনে হয় যেন একগাছি রসি দিয়া কপাল কসিয়া বাঁধিয়া রাখা হইয়াছে (মার্ক্); মাথার ঠিক উপরিভাগে উন্মত্তত্ব এবং চিড়িক্-মারা বা দপ্পরপানি।

কর্ণ। উভয় কানের মধ্যে চুলকানি (ব্যারাইটা-কার্ক্, হিপ্-সাল্‌ফ্, সাল্‌ফ্); কর্ণমূল এবং উহার নিকটবর্ত্তী অত্যন্ত গ্রন্থির স্ফীতি (আয়োড্)।

নাসিকা। সর্দিলাগা; নাক উষ্ণ এবং স্ফীত; অত্যন্ত হাঁচি এবং নাক দিয়া প্রচুর পরিমাণে তরল শ্লেষ্মা নির্গমন (একন্‌মার্ক্, সাস্কুনেরিয়া); নাক দিয়া হরিজাবর্ণের বা রক্ত-মিশ্রিত শ্লেষ্মা নির্গমন; নাকের পশ্চাৎভাগের অসুখ এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে উক্তাংশে ছাল উঠিয়া যাওয়ার ত্রায় জ্বালা-মুত্ত্ব; নাকের হাড়ের অসুখ; টার্বিনেটেড্ নামক হাড় (Turbinated Bones) স্ফীত; গলার ক্ষেকুর দিলে নাসিকার পশ্চাৎদেশ হইতে শ্লেষ্মা নির্গত হয়; নাকের পাতায় মীম্‌ডী (চুমটী) পড়ার ত্রায় ক্ষুদ্রী।

মুখগহ্বর এবং গলার মধ্য । যুগ্ম ভাঙ্গিলে ভেঁটে চট্‌চট্‌ আঁটা বোধ ; মুখে প্রচুর পরিমাণে লাল উঠা এবং নিম্নমাজির দাঁতে কন-
কনানি(মার্ক) । গলার মধ্য এবং নাকের প্লেগ্মার স্ফোর, গলায় ক্ষেতুর দিলেই
যাহা নির্গত হয় ; ডেলার ভ্রায় কোন একটা পদার্থ লাগিয়া থাকিলে যে রূপ
হয়, গলার মধ্যে সেকুপ অস্ফুত হয় (বেল) এবং বারম্বার গলায় ক্ষেতুর দিয়া
উহা বাহির করিবার ইচ্ছা ; গলায় ক্ষেতুর দিলে গলা দিয়া সবুজের আভাষুক্ত
কঠিন প্লেগ্মা নির্গত হয় ; টন্সিল্ (Tonsils) এবং হস্তাহিব নিম্নস্থিত লাল
নিঃসারক গ্রন্থির ক্ষতি এবং উহাতে অত্যন্ত বেদনা ; গলার মধ্যে ভাসান
রকমের ক্ষত এবং ডিপ্‌থিরিয়ায় ভ্রায় পদার্থবিশিষ্ট পদার্থের স্ফোর (নাই-
ট্রিক-আস) ।

মূত্রযন্ত্র । অতিরিক্ত পরিমাণে প্রস্রাব হওয়া (এপিস্, আপোসাই
নাম্) ; পুরুষাঙ্গে অগ্রভাগের আবরক চর্মে (Prepuce) সমুখ ভাগের
কঠিন ক্ষতি এবং উহার ঠিক মধ্যভাগে বেদনাহীন গরমীর ঘা ; বাম
অণ্ডকোষের মাংস বিশিষ্ট ক্ষতি বা আব (Sarcocele) ; গরমীর ব্যারাম ;
বাগী, যাহা হইতে অনেক কাল, এমন কি অনেক বৎসর পর্য্যন্তও কণ্‌তানি
পড়ে ; গরমীর ঘা, যাহা সহজে শুকায় না ।

শ্বাসযন্ত্র । বুকের মধ্যদিয়া একপার্শ্ব হইতে অপর পার্শ্ব পর্য্যন্ত
আঁটা বোধ ; ডাইন স্তনের নীচে আঁকড়াইয়া ধরার ভ্রায় বেদনা ।

চক্ষু । গায় কোঙ্কার ভ্রায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ক্ষুদ্রুড়া, যাহার ভূমা প্রদাহযুক্ত
হয় এবং স্পর্শনে অত্যন্ত বেদনায়ুক্ত হয় ; গায় চুলকানি বিশিষ্ট ক্ষুদ্রুড়া,
যাহাতে মামড়ী (চুমটী) পড়ে, কিন্তু উহা হইতে পুঁথ বহিয়া পড়ে ; গরমীর ঘা
(মার্ক, নাইট্রিক আস) ; পুরুষাঙ্গে কঠিন আকারের গরমীর ঘা ।

ব্যবহার । সর্দি ; টন্সিল্‌ প্রদাহ (Tonsillitis) ; ডিপ্‌থিরিয়া ;
গরমীর ব্যারাম জনিত অস্থ, বাগী ; কঠিন আকারের গরমীর ঘা ; ক্ষত
এবং কঠিনতা ; গ্রন্থির ক্ষতি ; বায়ুনল স্ফটকীয় সর্দি বা প্লেগ্মা স্ফোঙ্কার
ভ্রায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ক্ষুদ্রুড়া বিশিষ্ট প্রদাহ ; গণ্ডমালা জনিত চক্ষু প্রদাহ ; চক্ষুর
যোজক ঝিল্লী প্রদাহ ; পুরাতন আকারের গোণ উপদংশ জনিত হাড়ে হাড়ে
বেদনা ইত্যাদি অস্থে বিনায়োডাইড্‌ অব্‌ মার্কারি ব্যবহার্য্য । ডাক্তার

হার্টম্যান্ এবং ডাক্তার বার (Drs. Hartmann and Jahr) বলেন যে, প্রাথমিক আকারের (Primary) হউক, বা গৌণ আকারের (Secondary) গরমীর ব্যারাইট হউক, যাহাতে মার্কিউরিয়াম্ সলিউবিলিস্ বা মার্কিউরিয়াম্ বাইবাস্ দ্বারা উপকার না দর্শে, সেপ্রকার গরমীর ব্যারাইটে বিনায়োডাইড্ অব্ মার্কিউরিয়াম্ সেবনে বিশেষ উপকার দর্শে ।

সমগুণবিশিষ্ট ঔষধ । বেলাডোনা, ল্যাকেসিস, মার্কিউরিয়াম্, মেজিরিয়াম্, নাইট্রিক্ অ্যাসিড্, ক্যালো বাইক্রমিকাম্, অ্যায়োডিয়াম্, ।

প্রতিষেধক ঔষধ । অণ্টিমোনিয়াম্ টার্টার, অ্যাসিনিক, বেলাডোনা, ক্যাম্ফার, চারনা, কফিরা, হিপাব সাল্ফার, ওপিয়াম্, ফুফরাস্, স্পঞ্জিয়া, সাল্ফার, নাইট্রিক্ অ্যাসিড্, মেজিরিয়াম্, অ্যায়োডিয়াম্, ল্যাকেসিস্ ।

ডাইলুশন বিচার । গরমীর ব্যারাম বা গরমীর ব্যাবাম জনিত অস্থিতে ইংলণ্ড এবং আমেরিকা নিবাসী হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসকগণ এই ঔষধের ১ম, ২য় এবং ৩য় দশমিক ক্রমের গুঁড়া ১ বা ২ গ্রেইণ্ মাত্রায় ব্যবহৃত করিয়া থাকেন । উক্ত রোগে লেথকও ২য় এবং ৩য় দশমিক ক্রমের গুঁড়া, ১ গ্রেইণ্ মাত্রায় ব্যবহার করিয়া থাকেন । ইহার ৬ষ্ঠ, ১২ এবং ৩০ ক্রমের আরোহণও ব্যবহৃত হইয়া থাকে ।

মার্কিউরিয়াম্ করোসাইবাস্,-ক্লোরাইড্ অব্ মার্কিউরিয়াম্,-
করোসিব্ সাল্ভলিমেট্,- মার্ক-কর

(MERCURIUS CORROSIVUS,-CHLORIDE OF MERCURY,-CORROSIVE
SUBLIMATE,-MERC.-CORR.)

কোন এক বিশ্বস্ত হোমিওপ্যাথিক ঔষধালয় হইতে আদত করোসিব্ সাল্ভলিমেট্ ক্রয় করিয়া বথানিয়মে রেক্টফাইড্ স্পিরিটে মিশাইয়া ইহার মূল আরোক বা নিম্ন মিশ্র আরোক প্রস্তুত হইয়া থাকে । ইহার সঙ্গে যথা নিম্নে স্নগার অব্ মিক্ মিশাইয়া ইহার গুঁড়াও প্রস্তুত হইয়া থাকে ।

সাধারণ ক্রিয়া । ইহার কার্য্যও প্রায় অন্তান্ত প্রকারের পারার

কার্যের জার বটে; কিন্তু কেরোসিন্, সাবলিমেন্টের কতক গুলি বিশেষ প্রাকৃতিক গুণ আছে যাহা অত্যন্ত প্রকারের পারায় নাই। ইহা একপ্রকার ক্ষতকারক উত্তেজক বিষ বিশেষ। শৈল্পিক ঝিল্লীর উপর ইহার কার্য অত্যন্ত প্রবল ধ্বংসকারক, বাহার দরুণ উক্ত ঝিল্লীগুলি প্রদাহযুক্ত হইয়া পচিয়া বিনাশ প্রাপ্ত হয়। মাস্তক ঝিল্লী (Serous Membranes), বিশেষতঃ অন্ত্রাবরক ঝিল্লীই (Peritoneum) ইহা দ্বারা অধিক আক্রান্ত হইয়া থাকে। ইহা দ্বারা বিযাক্ত হইয়া যে প্রকারের প্রদাহ, বা বা ক্ষত হয়, উহাকে পচান এই ঔষধের একটি বিশেষ প্রাকৃতিক গুণ বা শক্তি মধ্যে পরিগণিত।

সাধারণ প্রাকৃতিক লক্ষণ ।

মন। মনের অবসন্নতা এবং নিকংসাহর ভাব (ইগ্নেন্স, পাল্‌স); সর্দদা থিট্‌ থিট্‌, চিড্‌ চিড্‌ করা (ব্রাই, ক্যাম্‌, নান্স্‌-বম্‌); জ্ঞানের হ্রাস; কোন ব্যক্তি কথা বলিলে রোগী বক্তার পানে তাকাইয়া থাকে এবং বক্তা যাহা বলে সে উহার কিছুই বুঝিতে পারেনা; নিদ্রানুত এবং প্রলাপ (বেল্‌, ওপিয়াম্‌)।

মস্তক। মাথা এবং মুখ মণ্ডলে রক্তাধিক্য বা রক্তাবরোধ এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে গালে অগ্নাশ্রুতব (একন্‌, বেগ্‌); কপালে প্রবল বেদনা (পাল্‌স্‌, সান্স্‌নেরিয়া); মাথার হাড়ের আবরক কঠিন পর্দায় কসিয়া ধরায় জ্বর বেদনা।

চক্ষু। চক্ষুর তারা সঙ্কুচিত (ফাইসট্‌) এবং উহাতে কোন প্রকারের স্পর্শ বা আলোক জ্ঞান থাকে না (ওপিয়াম্‌); চক্ষে আলোক এক-বারেই সহ্য হয়না এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে চক্ষু দিয়া উগ্র আলা উৎপাদক জল পড়ে (আর্স্‌, ইউফ্রেস্‌, লেডাম্‌); চক্ষুর যোজক ঝিল্লি লাল বর্ণ হয়; চক্ষুর গোলকের পশ্চাৎ ভাগে বেদনা, বাহার দরুণ মনে হয় যেন চক্ষুর গোলক তৈলিয়া বাহির হইয়া পড়িবে; চক্ষুর পাতা উপরের দিকে উল্টান, ক্ষীণ লালবর্ণ, ক্ষতযুক্ত এবং উহাতে চিড়িকমারা; চক্ষুর পাতার প্রান্তে মাম্‌ডি (চুম্‌টা) পড়ে বা উহাতে ফোয়ার জ্বর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বাহির হয় (মার্ক্‌, সাগ্‌ক্‌); অল্প তরল পদার্থ পূর্ণ ফোয়ার জ্বর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মথলিত চক্ষুর যোজক

কিল্লীর গণ্ডমালা জনিত প্রদাহ(Phlyctenulae); কর্ণিয়াতে গভীর ক্ষত; চক্ষুর আইরিসের প্রদাহ, বিশেষতঃ গব্যমীর ব্যারাম জনিত (Syphilitic Iritis), বাহার দরুণ রাত্রিতে বেদনা যাতনাতির বৃদ্ধি হয়; চক্ষুর রেটিনা প্রদাহ (Retinitis Albuminuria) এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে ক্রতে ছিঁড়িয়া ফেলার জ্বায় বেদনা ও চক্ষুর কোটিরের চতুষ্পার্শ্বস্থিত হাড়ে বেদনা; কর্ণিয়ার ফোড়া এবং আইরিস্ প্রদাহে পূর্ব নিঃসরণ; আত্মভ্রুর শিশুগণের চক্ষু-প্রদাহ এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে চক্ষু দিয়া ক্ষতকারক ক্লেদ নিঃসরণ, বাহা শিশুর মাতার গব্যমীর ব্যারাম জনিত খেত প্রদবের দরুণ উৎপন্ন হয় ।

কর্ণ । কানের মধ্যে ভয়ানক দগ্ধদপানি বা চিড়িকমায়া ।

নাসিকা । নাসিকা লালবর্ণ এবং ক্ষীত (বেল্, মার্ক্); সর্দি এবং তদ্রূপ নাকদিয়া প্রচুর পরিমাণে জগবৎ তরল স্লেথ্মা নিঃসরণ; নাসারন্ধ্রের মধ্যে ছাল উঠিয়া যাওয়ার জ্বায় আলা এবং চিড়িকমায়া (আইম্-মিউর, সিপা, হাইড্রাষ্ট্) ।

মুখমণ্ডল । মুখাকৃতি শিটা এবং উদ্বিগ্ন যুক্ত; মুখমণ্ডল ক্ষীত, লাল-বর্ণ, টল্-টলে; ওষ্ঠ কাল, অত্যন্ত ক্ষীত এবং অত্যন্ত বেদনায়ুক্ত, শুষ্ক এবং কাটায়ুক্ত (আস্); মাড়ি শক্ত হয় বা উহা নোয়ান যায় না এবং উহা টাটায়; মুখমণ্ডল শোথের জ্বায় ক্ষীত, মলিন বা শিটা এবং মূত্র কোষের ব্রাইট্‌স্ ডিজিজ্ (Bright's Disease) ।

মুখগহ্বর ও গলার মধ্য । দাঁত নড়ে, উহাতে বেদনার উদ্বিগ্ন হয় এবং উহা পড়িয়া যায় (মার্ক্); মাড়ি এবং দাঁতে টাটানি; মাড়ি ক্ষীত এবং তলতলে ও উহা হইতে সহজে রক্ত পড়ে এবং যেন দাঁতের গোড়া হইতে আল্‌গা হইয়া যায় (কার্বো-বেজ, সিষ্টাস্, মার্ক্, নাইট্রিক্-আস্); জিহ্বা সাদা গাঢ় স্লেথ্মা দ্বারা লেপযুক্ত (আণ্টি-ফুড্), অথবা শুষ্ক এবং লালবর্ণ (বেল্, রাস্ট্রজ্), অত্যন্ত ক্ষীত (বেল্); পুড়িয়া গেলে বেরূপ হয়, মুখগহ্বর সেরূপ শুষ্ক, জ্বালাযুক্ত এবং উষ্ণ (এপিদ্); মুখগহ্বর এবং গলার মধ্যের স্রৈণিক কিল্লীতে দূষিত পদার্থের সঞ্চার এবং উহাতে ক্ষত; মুখে অত্যন্ত চট্‌চটিয়া আঠা লাগের সঞ্চার বাহা অতি কষ্টে নির্গত হয় (ক্যালী-বাই); মুখ দিয়া প্রচুর পরিমাণে লাল পড়ে; লোন্তা আদ্যবিশিষ্ট লাল পড়া (আণ্টি-ফুড্,

সাল্‌ফ্‌), অথবা অত্যন্ত তিক্ত স্বাদ বিশিষ্ট লাল পড়া ; জিহ্বা নিচু করিলে যত বেদনার উদ্বেক হয়, গিলিতে বেদনার তত উদ্বেক হয় না। গলাব মধ্য অত্যন্ত ক্ষীত এবং প্রদাহযুক্ত, যাচার দক্ষণ গিলিতে অত্যন্ত কষ্ট হয় এবং বোগী ফাঁপড় হওয়ার উপক্রম হয় (বেল্‌) ; গলাব মধ্য এবং আচারবহা গলনালীতে জালীয়ক প্রবল বেদনা (আস্‌, ক্যাস্‌, ক্যাপ্‌স্‌), বাহ্যিক সামান্য চাপ পড়িলেই যাহার বৃদ্ধি হয় ; আল্‌জিহ্বা ক্ষীত এবং লম্বা (মার্ক্‌) এবং কাল্‌চে লালবর্ণ হয় ; গলাব মধ্যের বহির্দেশ এবং উচার গ্রন্থি অত্যন্ত ক্ষীত ।

পাকস্থলী এবং উদর । অত্যন্ত প্রবল পিপাসা এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে শীতল জল পানের ইচ্ছা (একন্‌, আস্‌, ব্রাই) ; জলাদি পান বা জলাদি গিলিবার সময় উচা নাক দিয়া, বারম্বার বাহিব হইয়া পড়ে ; অত্যন্ত কষ্টদায়ক কঠবম্বী এবং বমন ; অনবরত সবুজ বর্ণের পিত্ত বমন (আইরিস্‌) ; রক্তের ডিটয়্ক পদার্থ বমন ; উদরোদ্ধ প্রদেশ অত্যন্ত ক্ষীত এবং বিস্তৃত (আস্‌, বেল্‌, ব্রাই, নাক্স-বম্‌, লাইকোপ্‌), বাহ্য সামান্য স্পর্শন এবং প্রচাপনেই অত্যন্ত বেদনায়ুক্ত হয় বা টাটায় । যকৃত প্রদেশে সূচীবিধানের ভ্রাস্থ অম্লভূত হয় (একন্‌, আস্‌, ক্যাক্স-কার্ক্‌, চায়না, কোনায়াম্‌, চেগিডন্‌, মার্ক্‌, ক্যালী-কার্ক্‌, নেট্রাম্‌-মিউর, নাক্স-বম্‌, সিপিরা, সাল্‌ফ্‌) ; উদর অত্যন্ত ক্ষীত এবং বিস্তৃত ও সামান্য স্পর্শনেও অত্যন্ত বেদনায়ুক্ত হয় বা টাটায় (একন্‌, পেম্‌, কুপ্রাম্‌) ; মোচেড়াইয়া পড়িলে বা ধৌতলিয়া গেলে দেকগ হয়, উদরে সেকগ বেদনা (মার্ক্‌, ফেরাম্‌), সিকাম্‌ প্রদেশে (Caecal Region) এবং সরলারাই যাহা অধিক অম্লভূত হয় ।

মল এবং মলদ্বার । শুষ্ক এবং শুষ্কভাবে অনবরত জালা (আস্‌, ক্যাস্‌) ; শুষ্কদ্বার দিয়া ছেক্‌ড়া ছেক্‌ড়া পদার্থ বহিয়া পড়ে, যাহার দক্ষণ শুষ্কদ্বার ক্ষত হয় (কার্কো-বেজ্‌) ; ক্রমাগত অত্যন্ত কষ্টদায়ক ঠোঁথপাড়া এবং উহার সঙ্গে উদরে শূল বেদনার ভ্রাস্থ কর্ত্তনবৎ বেদনা ; দান্তের পর শুষ্কদ্বারে এবং স্রাবাদ্বারে অত্যন্ত কষ্টদায়ক জালাভূতব এবং শূল, যাহার দক্ষণ বারম্বার ঠোঁথ পাড়িতে ইচ্ছা যায় ; বারম্বার মলভ্যাগ, মল কেবল

রক্তমিশ্রিত শ্লেষ্মা (ক্যাঙ্ক); মল কাইয়ের তায়, মলিন সবুজবর্ণ, পিত্তযুক্ত এবং দুৰ্গন্ধযুক্ত (আস্), চট্‌চটয়া আঠা ।

মূত্রযন্ত্র । মূত্রাধারের শূল এবং তদ্রূপ বারম্বার মূত্রতাগের ইচ্ছা (ক্যাঙ্ক, ক্যান্স, কল্‌চ্); মূত্রাববোধ (একন্, হায়োস্, ট্রাইমন্); বারম্বার প্রস্রাব করা; মূত্র ফোঁটায় ফোঁটায় নির্গত হয় এবং মূত্র নির্গত হওয়ার সময় অত্যন্ত যাতনা (একন্, বেব্, ক্যাঙ্ক); মূত্র পরিমাণে অল্প এবং রক্ত-মিশ্রিত; মূত্র অগ্নিব্রুমে মিশ্রিত (অস্মিষাম্, ফন্, ফাইটোল, প্লাস্‌ম) সাদা কোমল হ্রাস তায় পদার্থ, শ্লেষ্মাব তায় পদার্থ, অথবা কাল্‌চে মাংসের তায় শ্লেষ্মার অংশ বিশিষ্ট; প্রমেহ রোগ এবং মূত্রনালী দিয়া প্রথমতঃ পাতলা এবং তৎপর গাঢ় সবুজবর্ণ আভাযুক্ত ক্রেন নিঃসরণ, রাত্রিতে বাহার বৃদ্ধি হয় (মার্ক্) এবং প্রস্রাব করার সময় মূত্রনালীতে জ্বালা এবং চিড়িক মারা (ক্যানিদিস্-স্ট্রাট্) ।

জননেদ্রিয় । পুরুষাঙ্গ এবং অণুকোষ অত্যন্ত ক্ষীণ (আস্); পুরুষাঙ্গে পচাযুক্ত গরমীব বা, যাহা হইতে পাতলা গর্দাব তায় ছেক্‌ড়া ছেক্‌ড়া পদার্থ বিশিষ্ট পুঁয় নির্গত হয় । স্ত্রীলোকের যোনির ভয়ানক অবল প্রদাহ; শুনের বোটার চতুর্দিকের গ্রন্থির ক্ষীণতা ।

শ্বাসযন্ত্র । স্বরভঙ্গ বা স্বরশূন্যতা; বায়ুশূন্য মধ্য জ্বালা, কঠিন-বৎ এবং হুলফুটানের ন্যায় বেদনা; বুকের মধ্য দিয়া আঁটাবোধ; হাপা-নির লক্ষণ সম্বলিত সর্দি (অস্মিষাম্), শ্বাসকষ্ট; কাশি এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে গলা দিয়া রক্তের ছিট সম্বলিত শ্লেষ্মা নির্গমন; বুকের মধ্য দিয়া সূঁচী বা খোঁচা বিধার তায় বেদনা (ডাইন পার্শ্) ।

নাড়ী । নাড়ী ক্ষুদ্র, অসম (Intermittent) এবং অনিয়মিতরূপে স্পন্দন করে (ক্যানী-কার্ক্, নেট্রাম্-মিউব) ।

অঙ্গ, প্রত্যঙ্গ । সমুদয় অঙ্গ প্রত্যঙ্গে অলসবোধ; অঙ্গ প্রত্যঙ্গে ব কম্পন; উঁক বা কুঁকির সন্ধিতে সূঁচী বিধানের তায় বেদনা ।

নিদ্রা । বারম্বার হাঁইতোলা এবং গা ভাঙ্গা; রাত্রিতে নিদ্রা-শূন্যতা; ঘুমেরদ্বায়ে চমকিয়া উঠা (আস্, বেব্, হায়োস্, ট্রাইমন্) ।

জ্বর । সামান্য পারাবিক পবিশ্রমেই শীতবোধ (ক্যাক্-কার্ক্,

হিপ্-সাল্‌ক্, লাইকোপ্, ফস্, সাইলিসি); শরীর ঠাণ্ডা এবং উহাতে প্রচুব পরিমাণে ঘর্ম্ম হওয়া, বিশেষতঃ কপালে (ক্যাম্ফার, বিরেট-আর্ক); চর্ম্ম অত্যন্ত উষ্ণ (একন, আর্স্, বেল্, ব্রাই); গায় চট্‌চটিয়া আঠা ঠাণ্ডা ঘর্ম্ম (আর্স্, ক্যাম্ফার, মার্ক্) ।

ব্যবহার । গরমীর ব্যারাম বা প্রমেহ রোগ জনিত চক্ষু-প্রদাহ (Syphilitic or Gonorrhoeal Ophthalmia); শিশুগণের চক্ষু-প্রদাহ; চক্ষুর আইরিস্ প্রদাহ (Iritis); চক্ষুর রেটিনার প্রদাহ (Retinitis); সর্দি এবং নাক দিয়া শ্লেষ্মা নির্গমন; মুখ দিয়া লাল পড়া; দাঁতেব গোড়া এবং ঠোঁটে ঘা; মূত্থের মধ্যে ঘা; টন্সিল্ প্রদাহ (Tonsillitis); গাল গহ্বরের প্রদাহ; শরীরের স্থানে স্থানে পচাপুরু ক্ষত বা ঘা; যকৃত প্রদাহ; রক্তমাশয় যাহাতে কেবল রক্তযুক্ত শ্লেষ্মাই ভেদ হয় ও যাহাতে বাতাবিক মনের লেশ মাত্র থাকে না; মূত্রাধারে শূল, যাহার দকণ বারম্বার মূত্রত্যাগের ইচ্ছা হয়; মূত্র কোষের ব্রাইট্‌স্ ডিজিজ্ (Bright's Disease); প্রমেহ রোগ; পুরুষাদে গরমীর ঘা; বাগী; হাঁপানিব লক্ষণ সম্বলিত সর্দি; বায়ুনল প্রদাহ; গ্রন্থির ক্ষীতি; আক্ষেপ বা কন্বাল্‌সন্স্ (Convulsions); শোথ; কোন কোন প্রকার পুরাতন আকারের পালাজ্বর যাহাতে রাত্রিতে হাড়ের মধ্যে বেদনা থাকে; পিতামাতার গরমীর ব্যারাম জনিত শিশুগণের গরমীর ব্যারাম (Hereditary Syphilis); রক্ত মিশ্রিত তরল ভেদ; মূত্রকৃচ্ছ্র; অণ্ডকোষাধারের ক্ষীতি; ক্রীলোকের বোনির প্রদাহ এবং উহাতে পচালাগা; পর্ভাবস্থায় ক্রীলোকের মূত্রে আবুয়েন্ থাকা জনিত অস্থখ; অস্ত্রাবরক ঝিল্লীপ্রদাহ (Peritonitis); অস্থির সন্ধির উপাধিতে ক্ষত; গরমীর ব্যারাম জনিত অস্থি বৃদ্ধি; শিশুগণের পণ্ডমালা জনিত মাথায় ফুস্‌ফুস এবং শরীরের স্থানে স্থানে বিকচ (Eczema) ইত্যাদি অস্থখে মার্কিউরিয়াম্ করোসাইবাস্ ব্যবহার্য্য ।

বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ । চাঁৎ হইয়া হাঁটু ওটাইয়া শয়ন করা; অত্যন্ত দুর্বলতা এবং শরীরের কাঁপনি (ক্যাক্-কার্স্, চায়না); শরীরের স্থানে স্থানে স্পন্দন এবং সঙ্কোচন (সিকুটা, ইগ্‌নেস্); গ্রন্থির ক্ষীতি (ব্যারাইটা-কার্স্, ক্যাণ্‌ক্-কার্স্, গ্রাফ্, আয়েড্); অস্থির আবরক কঠিন পর্দায় (Periosteum) কসিগা ধরার স্থায় বেদনা (নাইট্রিক্-আন্স্);

লার্সাজিক শোথ (আস্, এপিদ্, আপোসাইনাম্) ; ষাং সচরাচর পচা থয়ে, বা আক্রান্ত স্থানে ছিদ্র হয় (আস্) ; আমাশয়ের মলে কেবল আম এবং রক্ত থাকা, উহাতে স্বাভাবিক মলের লৈনও না থাকা ও উহার সঙ্গে সঙ্গে মূত্রকৃচ্ছ, বর্তমান থাকা, মূত্র লালবর্ণ এবং মূত্রত্যাগের সময় মূত্রনাগীতে অত্যন্ত জ্বালাব উদ্বেক হওয়া মার্কিউরিয়াম্ করোসাইবাসের কতকগুলি বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ ।

সমগুণবিশিষ্ট ঔষধ । একোনাইট্, আর্সিনিক্, বেলাডোনা, ট্রাইওনিয়া, সিপা, নাইট্রিক্ আদিড্, নেট্রাম্ মিউরিয়াটিকাম্, সাল্ফার ।

প্রতিষেধক ঔষধ । হিপার সাল্ফিউরিস্, নাইট্রিক্ আদিড্, সাইলিসিয়া । এতদ্ভিন্ন অধিক মাত্রায় বিবাক্ত হইলে ডিমের লাল ব্যবস্থা ।

ডাইলুশন বিচার । ৩য় এবং ৬ষ্ঠ দশমিক ক্রমের আরোকই সচরাচর অধিক ব্যবহৃত হইয়া থাকে । পিতা মাতার গরমীর ব্যারাম জনিত শিশু-গণের অন্তর্গত ২য় বা ৩য় ক্রমের গুঁড়া, ১ গ্রেইন মাত্রায়, বিশেষ উপকারী । কোন কোন চিকিৎসক বলেন যে, রক্তমাশয়ে কোন কোন রোগীর পক্ষে ৩য় বা ৬ষ্ঠ দশমিক ক্রমের গুঁড়া, ১ গ্রেইন মাত্রায়, ৩য় বা ৬ষ্ঠ ক্রমের আরোক অপেক্ষা অধিক উপকারী । লেখক স্বয়ংও অনেক রক্তমাশয়াক্রান্ত রোগীর চিকিৎসায় এই ঔষধের গুঁড়া ব্যবস্থা করিয়া আরোক অপেক্ষা অধিক উপকার পাইয়া থাকেন । এই ঔষধের ১২, ১৫, ১৮, ৩০, ১০০ এবং ২০০ ডাইলুশনও ব্যবহৃত হইয়া থাকে । এই ঔষধের ২০০ ডাইলুশন, ১ কোঁটা মাত্রায়, ১ মাত্রা সেবন করাইয়া লেখক তিন বৎসরের পুরাতন আকারের রক্তমাশয়াক্রান্ত ৬ বৎসর বয়স্ক একটা বালককে আরাম করিয়াছিলেন । রোগীর পিতা হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা প্রণালীর ভয়ানক বিরোধী ছিলেন । তাঁহার পুত্র একরূপ আরোগ্যলাভ করার দরুণ তিনি হোমিওপ্যাথির এত পক্ষপাতি হইয়া পড়িয়াছেন যে, তাঁহার পরিবারের মধ্যে কাহারো ব্যারাম হইলে তিনি হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক ভিন্ন আলোপ্যাথিক চিকিৎসককে কখনও ডাকেন না এবং তাঁহার আশ্রয় বজ্জগকেও হোমিওপ্যাথিক মতে রোগ চিকিৎসা করাইতে বিশেষ অনুরোধ করিয়া থাকেন ।

মিলিফোলিয়াম্,—মিলিফ্ (MILLEFOLIUM,—MILLEF.)

ইউরোপ এবং উত্তর আমেরিকার বাগান এবং মাঠময়দানে এই গাছ জন্মে। ইংলণ্ডে ইহা সচরাচরই দেখিতে পাওয়া যায়। এই গাছের সমুদয় অংশ যথানিয়মে প্রফ্ স্পিরিটে ভিজাইয়া মূল আরোক প্রস্তুত হইয়া থাকে।

সাধারণ ক্রিয়া। কদেয়কা মর্জ্জা সঞ্চকীয় দ্বায়ু দিয়া কৈশিক শিবার (Venous Capillaries) উপবই ইহার কার্য্য অধিক দেখিতে পাওয়া যায়। আবার বস্তি কোটরস্থিত কৈশিক শিবার উপরট ইহার কার্য্য অত্যন্ত প্রবল, যাহার দরুণ বস্তিকোটরস্থিত যন্ত্র সমূহ হইতে রক্তস্রাব হয়। ইহা যে কেবল বস্তিকোটরস্থিত যন্ত্র হইতে রক্তস্রাব নিবারণ করে এমত নহে, ইহা নাসিকা এবং ফুফুস হইতে রক্তস্রাবও নিবারণ করিয়া থাকে। ইহার রক্তস্রাব হামামেলিনের রক্তস্রাব হইতে অধিক প্রবল। ইহা শৈল্পিক ঝিল্লীও আক্রমণ করিয়া থাকে, যাহার দরুণ আক্রান্ত শৈল্পিক ঝিল্লীতে সামান্ত প্রকারের রক্তাধিক্য বা রক্তাবরোধ, পাকস্থলী এবং উদরে বেদনা, উদরাময় এবং মূত্র ধারণে অশক্তি বা অবাড়ে বা অনিচ্ছা পূর্ব্বক মূত্র নির্গমন ইত্যাদি রোগ উৎপন্ন হইয়া থাকে।

সাধারণ প্রাকৃতিক লক্ষণ।

মস্তক। মাথায় রক্তাধিক্য বা বক্তাবরোধ (একন্, বেল্); মাথায গোলমেলে বোধ এবং ঘূর্ণ্ ঘূর্ণে মাথা বেদনা; মাথা এবং মুখ মণ্ডলের ধমনীতে সামান্ত রক্তের দপ্পদপানি; মাথার ঠিক উপরিভাগে ঘূর্ণ্ ঘূর্ণে বেদনা; একটা জুঁ আঁটিয়া মারিয়া রাখিলে যেরূপ হর, কপালেব ডাইন পার্শ্বে সেক্রপ অস্থিত অনুভূত হয়।

চক্ষু। মনে হয় যেন চক্ষের মধ্যে অতিরিক্ত পরিমাণ রক্ত সঞ্চিত হইয়া রহিয়াছে; চক্ষের মধ্যদেশে নাকের গোড়ী বা কপালের পার্শ্বে শর্শাস্ত ছুরিবিধানের ছায় চাপ পড়া।

কর্ণ। কান যেন বন্ধ হইয়া বহিষাছে একপ অনুভূত হয়।

নাসিকা । নাক দিয়া রক্ত পড়া (একন্, বেল্, ব্রাই, হামামেলিস), এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে মাথা বা বৃকে রক্তাধিকা বা রক্তাবরোধ ।

মুখমণ্ডল । মুখমণ্ডলে গরমবোধ, যাহাব দরুণ মনে হয় যেন মাথায় রক্ত উঠিতেছে । নিম্নমাড়িতে ছিঁড়িয়া ফেলার স্থায় বেদনা ।

মুখগহ্বর । বাত জনিত দন্তশূল এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে মাড়িতে অজুখ ; পিপাসা ; মুখ শুকাইয়া যাওয়া ।

পাকস্থলী এবং উদর । উদগার উঠা ; ক্ষুধা পাঠিলে ঘেরুপ হয়, পাকস্থলীতে সেরুপ চর্চনবৎ বা খনন করাব স্থায় অল্পভূত হয় (ইগ্নেস্, পাল্‌স্, সাল্‌ফ্) ; পাকস্থলীতে পূর্ববোধ ; পাকস্থলীতে জ্বালাবোধ (আস্, ক্যাস্, আতিবিস্, সাল্‌ফ্), যকৃত প্রদেশে বেদনা ; দূষিত বায়ু সঞ্চিত বা বদ্ধ হইয়া থাকিলে ঘেরুপ হয়, উপরে সেরুপ পূর্ববোধ ; উদর ক্ষীত এবং বিস্তৃত ; গুহ্বার দিয়া দুর্গন্ধযুক্ত দূষিত বায়ু (Fatus) নিঃসরণ ।

মল । গুহ্বার দিয়া রক্তস্রাব বা রক্ত মিশ্রিত মলাদি ভেদ ; কৌণ পাড়া ; উদরাময় ; প্রবল শূল বেদনা ; অর্শরোগ এবং তদরূপ গুহ্বার দিয়া প্রচুর রক্তস্রাব (ইরিজারগ, ইউকেলিপ্‌ট্, হামামেলিস) ।

মূত্রযন্ত্র । মূত্র মূত্রাণ (আস্, ক্যাস্, ফন্, টিরিবিহ্) ; বারম্বার মূত্রাণের ইচ্ছা ; অসাড় বা অনিচ্ছা পূর্বক মূত্রাণ ; মূত্রাধারের জড়তার দরুণ মূত্রাধারের শৈথিল্য রোগ ।

জননেদ্রিয় । স্ত্রীলোকের হয় রজঃরোধ, নতুবা প্রচুর বা অতিরিক্ত রজঃস্রাব ; জবাযু হইতে রক্ত স্রাব (একন্, বেল্, ইরিজারগ, হামামেলিস্, সিকেল্) ; শারীরিক পরিশ্রমে পর জবাযু হইতে রক্তস্রাব এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে মস্তিষ্কে বক্তাধিকা বা রক্তাবরোধ হেতু শিবিঃপীড়া ; স্বেত প্রদর ; সন্তান প্রসবের পর জবাযু হইতে হয় অতিরিক্ত রক্ত (লোকিয়া, Lochia) নিঃসরণ, নতুবা লোকিয়া নিঃসরণ একবারে বন্ধ হয় ।

শ্বাসযন্ত্র । কাশি এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে গলা দিয়া উজ্জ্বল লালবর্ণ রক্ত মিশ্রিত স্লেষ্মা নির্গমন (কেরাম্, হামামেলিস্) ; বৃকে কণ্ঠাশূলভব ; যক্ষ্মা কাশে স্থঃস্পন্দন (একন্) ; অর্শের রক্তস্রাব বদ্ধ হইয়া বৃকে বেদনা বা কণ্ঠাশূলভব ; রজঃরোধ হইয়া বৃক বেদনা বা কণ্ঠাশূলভব (ব্রাই, হামামেলিস্,

পাল্‌স); বারু উপনলে শ্লেষ্মার অতিরিক্ত সঞ্চায়; ফুফুসে ছুরি বিধানের জ্বার বেদনা এবং উহাতে হুল কুটান, মোচড়াইয়া পড়া বা থেঁতলিয়া যাওয়ার জ্বার বেদনা ।

হুংপিণ্ড এবং নাড়ী । অত্যন্ত হুংস্পন্দন এবং গলা দিয়া রক্ত মিশ্রিত শ্লেষ্মা নির্গমন; কাশিলে হুংপিণ্ড এবং নাড়ীর ভগ্নানক আন্দোলন, নাড়ী ক্রতগামী এবং সঙ্কুচিত হওয়া ।

নিদ্রা । ক্লান্তিবোধ না হইলেও বারম্বার হাই উঠা ।

ব্যবহার । নাসিকা, ফুফুস, অস্থি এবং স্ত্রীলোকের জননেত্রির দিয়া প্রবল রক্তস্রাব; প্রবল শারীরিক পরিশ্রম অথবা যন্ত্রাদির জড়তার দরুণ যদি উক্ত প্রকারের রক্তস্রাব হয় তবে; যক্ষাকাল; যন্ত্রাদির জড়তার দরুণ শৈল্পিক রোগ ইত্যাদিতে মিলিফোলিয়াম্ ব্যবহার্য্য ।

বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ । অঙ্গ প্রত্যঙ্গে ছুরিবিধান, কসিয়া ধরা এবং ছিঁড়িয়া ফেলার জ্বার বেদনা; রক্তাবরোধ; রক্তস্রাব; যন্ত্রের জড়তার দরুণ শ্লেষ্মা নিঃসরণ (হেলোনিয়াম্); পড়িয়া বাইয়া বা বা অস্ত্র কোন কারণে লা হইলে উক্ত ঘা হইতে সহজেই প্রচুর রক্ত পড়া; অধিক ভারি জ্বাৰ উঠাইলে বা অতিরিক্ত শারীরিক পরিশ্রমে রক্তস্রাব, সঞ্চায় সময় এবং রাত্রিতে বাহার বৃদ্ধি হয় এবং দিনের বেলায় বাহার উপশম হয় ইত্যাদি মিলিফোলিয়ামের কতকগুলি বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ ।

সমগুণ বিশিষ্ট ঔষধ । হামামেলিস্, ইপিকাকিউএনা, ট্রিলি-রাম্, সেনিসিয়ো অরিয়াম্ ।

প্রতিষেধক ঔষধ । এরাম্ ম্যাকুলেটাম্ ।

ডাইলুশন বিচার । ডাক্তার হিউজ্ (Dr. Hughes) ১২ দশমিক ডাইলুশন সচরাচর ব্যবহার করিয়া থাকেন । রক্ত যন্ত্রের পক্ষে মূল আরোক ই ফোঁটা মাত্রায় বিশেষ উপকারী । লেখক এই ঔষধের ১ম, ২য়, ৩য় এবং ৬ষ্ঠ ক্রমই সচরাচর অধিক ব্যবহার করিয়া থাকেন । পড়িয়া বাইয়া জ্বার হইতে রক্তস্রাবে মূল আরোক, ১ ফোঁটা মাত্রায় ব্যবহার করিয়া ২০টা রোগীর চিকিৎসায় আশাতিরিক্ত ফল পাওয়া গিয়াছে ।

মফাশ,-(মুগনাভি,-কস্তুরী),-মফ্

(MOSCHUS,-MUSK,-MOSCH.)

মুগনাভি (কস্তুরী) কাছাকে বলে তাহা বোধ হয় এতদ্ব্যপেক্ষে সকলেই জানেন। ভোটান হইতে এতদ্ব্যপেক্ষে ইহার আয়দানি হইয়া থাকে। ইহা কৃত্রিম কি অকৃত্রিম তাহা নির্ণয় করা কতকটা কঠিন ব্যাপার। অতএব ইহা কোন এক বিশ্বস্ত লোক বা ঔষধালয় হইতে ক্রয় করা উচিত। যথা নিয়মে ইহার সঙ্গে মুগার অবমিক্ মিলাইয়া ইহার মিশ্র গুড়া প্রস্তুত হইয়া থাকে। ১ ভাগ কস্তুরী, ২০ ভাগ রেবটকাইড্ স্পিরিটে মিলাইয়া ইহার মূল আরোক প্রস্তুত হইয়া থাকে।

সাধারণ ক্রিয়া, ব্যবহার ইত্যাদি। অনেক কাল হইতেই কস্তুরী স্নায়বিক মণ্ডলীর প্রবল উত্তেজক বলিয়া ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। রক্ত সঞ্চালন ক্রিয়া এবং জননেদ্রিয়ার উপর ইহার কার্য অতি প্রবল। যাতার দরুণ শিরঃস্রীড়া এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে যাতার পূর্ণবোধ ও নিদ্রার ভাব হইয়া থাকে। ইহার জ্বাণের দরুণই রোগের অনেকটা আশু উপশম হয়। হিষ্টিরিয়ার আক্রমণ এবং স্নায়বিক হৃৎস্পন্দনের আক্রমণের পক্ষে ইহা বিশেষ উপকারী। ডাক্তার হিউজ্ (Dr. Hughes) বলেন যে, হিষ্টিরিয়া রোগের আক্রমণের সময় রোগী একবারে চেতনাশূন্য হইয়া পড়িলে ইহা সেবনে রোগের আক্রমণ একবারে সারিয়া যায়। যে সকল ব্যক্তির হিষ্টিরিয়া রোগ রহিয়াছে কস্তুরীর গন্ধে তাহাদিগের রোগের আক্রমণ হইতে দেখা গিয়াছে। অতএব হোমিওপ্যাথিক মতে ঔষধ ব্যবস্থা করিতে হইলে হিষ্টিরিয়া রোগের আক্রমণের পক্ষে যে কস্তুরী একটা অত্যন্ত উপকারী ঔষধ তাহা বোধ হয় অস্বীকার করা যাইতে পারে না। যে প্রকার হৃৎপিণ্ডের অস্থির বাস্তবিক (Organic) মহে, কেবল স্নায়বিক মাত্র, হৃৎপিণ্ডের সরুপ অস্থির কস্তুরী দ্বারা বিশেষ উপকার দর্শিবার সম্ভাবনা। স্নায়বিক শিশু বা ছোট বালক বালিকাগণের আক্ষেপিক গুড়ী কাশি, হিষ্টিরিয়া জনিত হাঁপানি এবং হিকাতোও ইহা উপকারী। ডাক্তার গারেন্সি (Dr. Guereux) বলেন যে, রোগের আক্রমণের সময় হাত পা ইত্যাদি ঠাণ্ডা হওয়া এই ঔষধের একটা

বিশেষ প্রাকৃতিক নির্দিষ্ট লক্ষণ মধো পরিগণিত। হিষ্টিরিয়া রোগের আক্রমণের সময় অনেক রোগীর হাত পা ঠাণ্ডা হয়; অর বিকারাদি রোগের পতনাবস্থায়ও (Collapse stage) রোগীর হাত পা ঠাণ্ডা হয়। অতএব উক্ত অবস্থা গুলিতে কন্তুরী বিশেষ উপকারী। এজন্য আলোপ্যাথিক চিকিৎসকগণও উক্তাবস্থায় অত্রাণ্ড উত্তেজক ঔষধের সঙ্গে কন্তুরী ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। আরুর্সেনিক চিকিৎসা প্রণালীতেও উক্তাবস্থায় কন্তুরী ব্যবহার করিতে দেখা যায়। ইহার কার্যের সঙ্গে আন্থ্রা, আসাফিটিডা, ক্যাপ্টারিয়ান, বেলেরিয়ান, ক্যান্ফার এবং নাক্স মফাটাব কার্যের বিশেষ সাদৃশ্য আছে। ডাক্তার হিউজ্ (Dr. Hughes) বলেন যে, ইহার গন্ধেই উপকার পাওয়া যায়। অতএব ইহার ২য় বা ৩য় ক্রম অপেক্ষা উচ্চ ক্রমের জাবোক বা গুঁড়া, অর্থাৎ বাহাতে কন্তুরীর গন্ধ না থাকে, সে সকল ক্রম, ব্যবহারে বিশেষ ফল না পাওয়ারই অধিক সম্ভাবনা। লেখকও ডাক্তার হিউজের উক্ত মতের পোষকতা করিতে অনিচ্ছুক নহেন, কারণ, তিনিও এরূপ বিশ্বাস করেন।

মিরিকা সেরিফেরা,-মিরিকা

(MYRICA CERIFERA,—MYRICA)

এই গাছের শিকড়ের ছাল দিয়া যথা নিয়মে মূল আর্যক প্রস্তুত হইয়া থাকে।

সাধারণ ক্রিয়া। ডাক্তার হিউজ্ (Dr. Hughes) বলেন “ম্যাসা-চুসেট্‌স্ হোমিওপ্যাথিক সমিতির (Massachusetts Homoeopathic society) ৭ জন সভ্য এবং ডাক্তার জি, এন্স, ওয়াকার (Dr. G. S. Walker) শুল্ক শরীরে এই ঔষধ পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন। উক্ত সমিতির সভ্যগণ এই ঔষধ বাইরা বিশেষ কিছু অহুভব করেন নাই। ডাক্তার ওয়াকার বিশেষ সাহস সহকারে এই ঔষধ খাইয়া দেখিয়াছেন। ইহা খাইয়া তিনি হইবার ভয়ানক আকারের কামল রোগের লক্ষণাক্রান্ত হইয়াছিলেন।

তাঁহার চর্ম পিত্তলের স্থায় হরিদ্রা বর্ণ; যকৃত এবং উদর প্রদেশে পূর্ণবোধ; মূত্র হরিদ্রাবর্ণ, ফেণাযুক্ত, পরিমাণে অল্প; মল তরল, দুর্গন্ধযুক্ত, কাদার রসবিশিষ্ট, পিত্তশূন্য; অত্যন্ত দুর্বলতা এবং নিদ্রালুতা, প্রায় অর্দ্ধ অচেতনার স্থায় ইত্যাদি লক্ষণ প্রকাশ পাইয়াছিল। এই অবস্থার পড়োফিলাম্, লেপ্টোগ্রাফ, নাক্স-বমিকা এবং মার্কিউরিয়াম্ সেবনে কোনও উপকার দর্শে নাই। অবশেষে ডিজিটালিস্ দ্বারা উপকার দর্শিয়াছিল। এই ঘটনার ইহাই প্রতীত হয় যে, মিরিকা দ্বারা বিষাক্ত-হইলে যকৃতের পিত্তনিঃসারক নালীর (Bile-duct) শৈল্পিক রোগ হয়। অল্প মাত্রায় সেবনে অধিক মাত্রায় সেবনের বিপরীত ফল হয় কি না তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখিবার জন্য ডাক্তার সার্প (Dr. Sharp) তাঁহার একটি বন্ধুকে ইহার ১ম দশমিক ক্রমের আরেক, ১ কোঁটা মাত্রায়, প্রাতে এক মাত্রা এবং রাত্রিতে এক মাত্রা, একরূপ করিয়া ১ সপ্তাহ কাল খাওয়াইলেন। এই ঔষধ-বিনি খাইয়াছিলেন, ঔষধ খাওয়া কালীন এক সপ্তাহ কাল তাঁহার স্বাভাবিক অপেক্ষা অধিক ভেদ হইয়াছিল। তাঁহার মল স্বাভাবিক অপেক্ষা অধিক ক্রিা উজ্জল হরিদ্রাবর্ণ হইয়াছিল। ক্যামোমিলা সেবনেও উক্ত প্রকারের অবস্থা ঘটিয়া থাকে। অতএব কামল রোগে উক্ত লক্ষণগুলি প্রকাশ পাইলে মিরিকা সেবনে বিশেষ উপকার দর্শিবার সম্ভাবনা।”

শৈল্পিক বিলী, প্রধানতঃ পরিপাক সযক্কায় শৈল্পিক বিলীর উপর ইহার কার্য্য অতি প্রবল, বাহার দ্রুণ উক্ত শৈল্পিক বিলীর স্লেয়া জনিত অমুখ-উৎপন্ন হইয়া থাকে। যকৃতের উপর ইহার কার্য্য সর্বাধিক প্রবল, বাহার দ্রুণ যকৃতের নিঃসরণের সঞ্চার স্থগিত থাকে এবং তদ্রূপ কামল রোগঃ (নেবা, -Jaundice) এবং তজ্জনিত অস্বাভাবিক অমুখও উৎপন্ন হইয়া থাকে।

সাধারণ প্রাকৃতির লক্ষণ।

মনঃ। নিরুৎসাহ; মানসিক অবসন্নতা; সর্বদা থিট্ থিট্, চিড়্ চিড়্ করা; কোন বিষয়ে মন নিবিষ্ট না হওয়া; সর্বদা মন কেমন কেমন করা এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে নিদ্রাবেশ।

মস্তক। মাথাধোর, উহার সঙ্গে সঙ্গে নিদ্রার ভাব, মাথায়

চিমাবোধ ও মাথা হেট করিয়া উপুড় হইলে মাথা এবং মুখ মণ্ডলে রক্তাধিক্য বা রক্তাবরোধ ও উহার সঙ্গে সঙ্গে বমনোদ্বিগ; কপাল, কপালের দুই পার্শ্ব এবং ঘাড়ের বেদনার উদ্রেক হইয়া শুম ভাঙ্গিয়া যায়; চক্ষুর মধ্য এবং উপবে ভারিবোধ ।

চক্ষু । চক্ষু হরিদ্রা বর্ণ এবং উহাতে রক্তাধিক্য বা রক্তাবরোধ; চক্ষে ভারিবোধ; ঘুম ভাঙ্গিলেও চক্ষুর উক্ত প্রকারের অবস্থা; পুস্তকাদি পাঠ করার সময় চক্ষু সহজে ক্লান্ত হয় এবং জ্বালা করে (কন্স, রুটা, দিপিয়া); চক্ষুর পাতায় ভারিবোধ (কোনায়াস্, জেলস্) ।

মুখমণ্ডল । মুখ মণ্ডল হরিদ্রা বর্ণ, কামল রোগের তায় (চেলি-ডন, চায়না); মুখ মণ্ডলে পূর্ববোধ এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে উষ্ণবোধ ও দগ্ধপানি, বহির্জ্বাসূত বেড়াইবার পরই যাহা অধিক হয় ।

মুখগহ্বর এবং গলার মধ্য । জিহ্বা পৃক, হবিদ্রার আভাযুক্ত কালচে, শুষ্ক মানডিব (চুমটীর) তায় লেপযুক্ত, যাহার দক্ষণ জিহ্বা সঞ্চালন প্রায় অসম্ভব হইয়া পড়ে; মুখে পচা বিস্ত্রী স্বাদ, যাহার দক্ষণ রোগী খাইতে পারে না; মুখে তিক্ত, বমনোৎপাদক স্বাদ; গাল গহ্বরের ঝিল্লী এক প্রকার চট্‌চটিয়া আঠা পদার্থ দ্বারা আবৃত; মুখ গহ্বরের উপবিভাগে (তালুতে) শুষ্ক নামড়ি পড়ে, বাহ্য জলে ভিজেনা এবং বিগলিত করিতে পারা যায় না; মুখগহ্বর শুষ্ক; পিপাসা, জল পানে যাতায় অগ্নিক হাঁস বা উপশম হয় । গলার মধ্যে রসির তায় শৈথিল্য সঞ্চার, বাহ্য সহজে উঠে না বা নির্গত হয় না; গলার মধ্য এবং নাসিকার মধ্য এক প্রকার ভ্রূক্ষযুক্ত চট্‌চটিয়া আঠা পদার্থ দ্বারা পরিপূর্ণ, বাহ্য সহজে উঠে না বা পড়ে না (আমন-কার্ক, নাইট্রিক-আস্, ফাইটোন); আহাববহা গমনালীর উপবিভাগে শুষ্ক বোধ এবং টাটানি, যাহার দক্ষণ মনে হয় যেন গলার মধ্য কাটিয়া যাইবে এবং কোন দ্রব্য গিলিতে পারা যাইবে না ও অবশেষে গিলিতে অশক্তি হইয়া পড়ে; আহাববহা গমনালীর উপবিভাগে চট্‌চটিয়া আঠা ফেণাযুক্ত শৈথিল্য সঞ্চার, সঙ্কোচে গলায় থেকুব দিলেও যাহা নির্গত হয় না এবং যাহার দক্ষণ মুখে বিস্ত্রী স্বাদ হয় ও তদক্ষণ আহারের ব্যাঘাত জন্মে ।

পাকস্থলী এবং উদর । ভাড়াভাড়া আহার করিলে ঘেঁরুপ হয়,

পাকস্থলীতে সেক্রপ পূর্ণ বোধ, অগচ ক্ষুধা থাকে (চায়না, লাইকোপ); ক্ষুধা বা রুচি থাকে না; আহারে অরুচি বা অনিচ্ছা; পাকস্থলীতে পূর্ণ, চাপা, হ্রস্ব এবং পড়িয়া যাওয়া বা পেটে পিঠে লাগার ভ্রায় অল্পভূত হওয়া । বক্রত প্রদেশে ঘৃশ্ ঘৃশে বেদনা এবং পূর্ণ বোধ; নিজ্রাবেশ; হ্রস্বতা; মল ছাইয়া বা কাদার রঙ্গ বিশিষ্ট; কামল রোগ; পেট কামড়ানি; উদরে গড়্-গড়্, কল কল শব্দ হওয়া; বারম্বার বাহ্যেব বেগ, কিন্তু বেগ নিলে মল নির্গত না হইয়া কেবল কতক পরিমাণে দূষিত বায়ু নির্গত হয়; পেটে এক প্রকারের অস্থখ বোধ, যাহার দরুণ মনে হয় যেন উদরাময় আরম্ভ হইবে ।

মল । গুহম্বার দিয়া প্রচুর দূষিত বায়ু নিঃসরণ; মল তরল, গোলাপির ভ্রায় এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে কোথপাড়া এবং নাভি প্রদেশে খিল খদাব ভ্রায় অল্পভূত হওয়া (কলোস); মল ফিকা হরিজ্রা বর্ণ, ছাইয়া বা কাদার রঙ্গ বিশিষ্ট (ক্যাক্-কার্ক্, ডলিকস্, হিপ্-সাল্ফ, পডোফ্); কামলরোগ ।

মূত্র । মূত্র বিয়াব (Beer) নামক সুরার রঙ্গ বিশিষ্ট, বেণাবৃত্ত; মূত্রে গোলাপীর আভাবুক্ত কটাবর্ণের তলানি পড়ে; মূত্র পবিমাণে অল্প ।

হৃৎপিণ্ড এবং নাড়ী । হৃৎপিণ্ডেব কার্য্য করার শক্তি বৃদ্ধি হয় বটে, কিন্তু নাড়ী প্রতি মিনিটে ৬০ বারের অধিক স্পন্দন করে না; নাড়ী হ্রস্ব এবং অনিয়মিত গতি বিশিষ্ট ।

গ্রীবা এবং পৃষ্ঠদেশ । গ্রীবা এবং পৃষ্ঠদেশে ঘৃশ্-ঘৃশে রকমের কন্কনানি এবং কঁসয়া ধরার ভ্রায় বেদনা, অলসবোধ এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে মাথাধরা ।

নিদ্রা । নিজ্রার ভাব; মাথাঘোবা; অর্দ্ধ চেতনা; অস্থিরনিদ্রা, অথবা প্রাতঃকাল পর্য্যন্ত ভাল ঘুম হয় এবং ঘুম ভাঙ্গিলেই যেন সমুদয় অস্থিরের শক্তি হয় ।

জ্বর । ঘরের বাহিরে গেলে শীতবোধ; কোমরের স্থানে স্থানে সামান্য রকমের কন্কনানি; শরীরের সামান্য উত্তেজনার অবস্থা এবং অরবোধ ও উহার সঙ্গে সঙ্গে পর্য্যায়ক্রমে শীতবোধ; যেকদণ্ডের মধ্য দিয়া

আগা গোড়া উষ্ণমূত্ৰ এবং তৎপর শীতবোধ ও সামান্য বম্ব; মুখমণ্ডল উষ্ণ, লালবর্ণ এবং টল টলে।

চর্ম্ম। শরীর কামল রোগের জ্বর হরিদ্রাবর্ণ; পোকায় কামড়াইলে যে রূপ হয়, শরীর সে রূপ চুলকায়।

ব্যবহার। শৈল্পিক ঝিল্লী, মুখগহ্বর, আহারবহা গলনালী, যকৃতের পিত্তনিঃসারক নালী ইত্যাদির শ্লেষ্মাজনিত অম্বু; যকৃতের অম্বু; কামল রোগ ইত্যাদিতে মিরিকা সেরিফেরা ব্যবহার্য। ডাক্তার ফারিংটন (Dr. Farrington) বলেন যে, ইহা সমুদয় শরীরকে ভয়ানকরূপে আক্রমণ করে এবং শরীরের অত্যন্ত দুর্বল বা বিকারের অবস্থায়, কামলরোগ থাকুক, আর না থাকুক, শরীরের দুর্বলতার সঙ্গে সঙ্গে শৈল্পিক ঝিল্লী বিকৃতাবস্থা প্রাপ্ত হইয়া জিহ্বা, মুখগহ্বর এবং আহারবহা গলনালীর উপরিভাগে অল্পপরিমাণ চট্‌চট্টিয়া আঠা মাম্‌ড়ী উৎপাদক পদার্থের সঞ্চার হইলে, এই ঔষধ বিশেষ উপকারী। লেখকের ১৬ দিবস বয়স্ক আতুড়ের একটি পুত্র সন্তানের কামল রোগ হয়। কামল রোগের যত রকম ঔষধ আছে শ্রীযুক্ত ডাক্তার মহেক্স জাল সরকার, এম্‌, ডি, মহাশয় তাহার সমুদয়ই ব্যবস্থা করিয়া কোনও ফল না পাইয়া তিনি অবশেষে মিরিকা সেরিফেরা ব্যবস্থা করিলেন। ইহা দ্বারাও কোনও ফল দর্শিত না। এরূপ লেখকও ৭৬ জন রোগীর চিকিৎসায় এই ঔষধ দ্বারা বিশেষ ফল পান নাই। কিন্তু ভৈষজ্য তবে যে রূপ পাঠ করা যায়, তাহাতে কামল রোগে এই ঔষধ ব্যবহারে বিশেষ উপকার দর্শিত হইবে অধিক সম্ভাবনা।

বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ। সামান্য রকমের স্নায়বিক উত্তেজনা এবং অস্থিরতা ও উহার পরফণি গা বমীবমী করা এবং দুর্বলবোধ; সমুদয় পেশীতে বেদনা ও টাটানি এবং তদ্রূপ উহা সঞ্চালনে অশক্তি; অলসবোধ এবং মানসিক অবসন্নতা ইত্যাদি এই ঔষধের কতকগুলি বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ।

সমগুণ বিশিষ্ট ঔষধ। ডিজিটালিস্, চেলিডোনিয়াম্, পডোফিলাম্।

ডাইলুশন বিচার। ১ম, ২য় এবং ৩য় ক্রমের আরোক ব্যবহার্য।

কোন কোন চিকিৎসক ইহার মূল আরোকও ব্যবহা করিয়া থাকেন ।
লেখক ইহার ১ম হইতে ৬ষ্ঠ ক্রম এবং মূল আরোকও ব্যবহার করিয়া দেখি-
য়াছেন । তাঁহার মতে মূল আরোকে রোগের লক্ষণাদি বৃদ্ধি পায় ।

ইনাথ্রি ক্রোকেটা, -ইনাথ্র.

(*ENANTHE CROCATA*, -*ENANTH.*)

এই গাছের শিকড় মথানিয়মে প্রক্‌ স্পিরিটে ভিজাইয়া ইহার মূল
আরোক প্রস্তুত হইয়া থাকে ।

সাধারণ ক্রিয়া । মস্তিষ্ক এবং কসেবকা মজ্জা সহজীয় স্নায়ু মণ্ড-
লীতে ইহার কার্য অতি প্রবল, যাহার দরুণ মূত্রিবোগের দ্বারা আক্ষেপ এবং
মেডালার অবলম্বিত (Medulla Oblongata) ও উদার নিকটবর্তী অংশের
স্নায়ু এবং কোমলতা উৎপন্ন হইয়া থাকে । ইহা এক প্রবল বিষাক্ত ঔষধ
মধ্যে পরিগণিত ।

সাধারণ প্রাকৃতিক লক্ষণ ।

মন । উগ্র প্রলাপ (বেল্, ক্যাছ্, ট্রাইমন), যাহার দরুণ মনে হ্রস্ব
যেন রোগী মদ্যপান করিয়াছে (ওপিয়াম্) ; উন্নততা ; হঠাৎ চেতনা রহিত
হওয়া (বেল্, ওপিয়াম্) ।

মস্তক । প্রবল মাথাঘোরা এবং তদরূপ পড়িয়া যাওয়া ও উহার
সঙ্গে সঙ্গে বমনোদ্বগ, বমন, অজ্ঞানবৎ মূৰ্ছা এবং আক্ষেপ বা কন্‌বাল্-
সন্‌স ; মাথার প্রবল বেদনা ; সংজ্ঞা রোগের দ্বারা অবস্থা ; বাকরোধ
এবং অচেতনতা ; মুখমণ্ডল ক্ষীণ এবং টল্‌টলে ও নীলের আভাষিত ;
চক্ষুর তারি বিস্তৃত ; শ্বাস প্রশ্বাস কষ্টকর ; অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সঙ্কুচিত ; দাঁত
লাগা (বেল্) ; আক্ষেপের পর যৌর অচেতনতা ।

চক্ষু । চক্ষুর তারি বিস্তৃত (বেল্, হায়োস্, ওপিয়াম্, ট্রাইমন) ;
চক্ষু উপর এবং মধ্যদিকে উণ্টান ।

নাসিকা । নাক দিয়া রক্তস্রাব ।

মুখমণ্ডল । মুখমণ্ডলের পেশীর তাড়াতাড়ি আক্ষেপিক স্পন্দন (আগারিকাশ্, বেল্, সিকুটা, নাক্স-বম্ ইগ্লেস্) ; মুখমণ্ডল নীলবর্ণ এবং উহার শিরাদির ক্ষীতি, শিটা এবং শীতল, ভয় উৎপাদক এবং উদ্বেগযুক্ত ; দাঁতলাগা, বাহার দ্রুণ মাড়িতে মাড়িতে অত্যন্ত শক্তভাবে আঁটিয়া থাকে (আবিসিহ্, সিকুটা, ইগ্লেস্, হায়োস্, লরোস্, নৈজা, নাক্স-বম্) ; মুখমণ্ডলে গোলাপী রঙ্গের ফুসুড়ী ।

মুখগহ্বর এবং গলার মধ্য । জিহ্বা ক্ষীত এবং মুখের বাহির হইয়া পড়ে এবং সামান্য ফারযুক্ত (Furred ; মুখে ফেগাউঠা (সিকুটা, কুগ্রাম্, হায়োস্, লরোস্) ; মুখে রক্তমিশ্রিত স্লেয়ার স্ফার ; মুখগহ্বরের শুষ্ক এবং উষ্ণ ; বাকরোধ । গলাব মধ্যে ভরানক আঁটিবোধ এবং জ্বালা ।

পাকস্থলী এবং উদর । হিক্কা ; পাকস্থলীর স্থূপিশেষের নিকট-বর্ত্তী অংশের বেদনা এবং উহার সঙ্গে বমন বা বমনোদ্বেগ ; উদর অত্যন্ত ক্ষীত এবং বিস্তৃত ও উহার সঙ্গে সঙ্গে শূল বেদনার স্থায় বেদনা ।

মল । অসাড়ে বা অনিচ্ছাপূর্ব্বক মল নির্গমন ; উদরাময় ।

শ্বাসযন্ত্র । নিশ্বাস প্রাশ্বাস আক্ষেপিক ; নিশ্বাস প্রাশ্বাস কষ্টকর, ঘন ঘন, গৌ গৌ, ঘড় ঘড় শব্দ বিশিষ্ট ; অনবরত দীর্ঘনিশ্বাস, আক্ষেপিক কাশির দ্রুণ বাহার ব্যাঘাত অন্বে ; নিশ্বাস প্রাশ্বাস অনেক সময় অস্বাভাবিক হইয়া না ।

হৃৎপিণ্ড এবং নাড়ী । হৃৎপ্রদেশে বেদনা ; নাড়ী ক্ষুদ্র, দুর্বল, অনিয়মিত গতিবিশিষ্ট এবং লুপ্তপ্রায় ।

জ্বর । শরীর অত্যন্ত শীতল এবং শরীরের স্বাভাবিক সত্তাপের অভাব । প্রচুর ঘর্ম্ম ; দুর্গন্ধযুক্ত ঘর্ম্ম ।

ব্যবহার । মৃগী রোগের আক্ষেপ ; শৈশবাবস্থা এবং গর্ভাবস্থায় মৃগীরোগের আকার বিশিষ্ট আক্ষেপের পক্ষে এই ঔষধ বিশেষ উপকারী ।

বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ । মৃগীরোগের স্থায় আক্ষেপ ; ভরানক আকারের আক্ষেপ হইয়া তৎপর বোর অচেতনতা এবং বোর নিদ্রা ; আক্ষেপের সঙ্গে সঙ্গে মাথাঘোরা, পাগলামি, বমনোদ্বেগ বা বমন, অচেতনতা, চক্ষুর তারা বিস্তৃত, চক্ষুর গোলক উপরবিকে 'উল্টান' ; হঠাৎ আক্ষেপের

আক্রমণ, দাঁতলাগা, জ্বিয়ায় কানড় পড়া এবং তৎপর সম্পূর্ণ অচেতনতা ; আক্ষেপের সঙ্গে সঙ্গে মুখমণ্ডল ফীত এবং টল্‌টলে ও নীলের আভাযুক্ত ; নাক মুখ দিয়া রক্তমিশ্রিত ফেণা নির্গম্য ; নিশ্বাস প্রাশাস আক্ষেপিক ; স্পর্শ-জ্ঞান রহিততা ; নাড়ী দুর্বল এবং অত্যন্ত বলক্ষয় ; জলে সমুদয় লক্ষণাদির বৃদ্ধি ইত্যাদি ইনাস্টি ক্রোকেটার কতকগুলি বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ ।

সমগুণবিশিষ্ট ঔষধ । আগারিকাশ্, দিকুটা, এথুজা, ট্র্যামো-নিয়াম্, হাইড্রোম্যেনিক্ অসিড্ ।

ডাইলুশন বিচার । ৩য় ডাইলুশন ব্যবহার্য্য ।

পিটোলিয়াম্,-পিট্রোল্

(PETROLEUM,-PETROL.)

কোন এক বিকৃত হোমিওপ্যাথিক ঔষধালয় হইতে আদিত পিট্রোলি-নাম্ ক্রয় করিয়া যথানিয়মে বেক্টকাইড্ স্পিবিটে মিশাইয়া ইহার মিশ্র আবেক প্রস্তুত করিতে হয় ।

সাধারণ ক্রিয়া । চৰ্ম্ম এবং শৈথিল্যিক ঝিল্লীর উপর ইহার কার্য্য অতি প্রবল । ইহা চৰ্ম্ম ও শৈথিল্যিক ঝিল্লীকে উত্তেজিত করে, বাহার বিষয় নিম্নে বিশেষরূপে বিবৃত হইতেছে ।

সাধারণ প্রাকৃতিক লক্ষণ ।

মন । রোগী অত্যন্ত উগ্র, চটা, খিট্‌খিটে এবং সহজেই বিরক্ত হয় (ক্যাম্প, নাস্-বম্) ; অত্যন্ত ভয়ানক এবং তদ্রূপ সামান্য কারণেই ভয় খাওয়া (নাস্-বম্, ওপিয়াম্) ; চেতনাশূন্য হওয়া ; সর্বদা চিড়্ চিড়্, বক্ বক্ করা এবং কোন বিষয়ে চিন্তা করিতে অনিচ্ছা ; প্রলাপ ; রোগী মনে করে যেন কোন এক ব্যক্তি তাহার পার্শ্বে শয়ন করিয়া রহিয়াছে, অথবা সে যেন দ্বিগুণ হইয়াছে, অথবা তাহার একটা অঙ্গ যেন দ্বিগুণ হইয়াছে ।

মস্তক । মাথা হেট করিয়া উপড় হইলে বা বগা অবস্থা হইতে

দাঁড়াইলে মাথাঘোরা (বেল্) ; মাথাখ চিমা এবং ভারিবেধ ; রাগের দরুণ শিরঃস্রাব, অথবা উপবাসের পর প্রাতঃকালে মাথাধরা ; কপালে চাপিয়া ধরার স্থায় ঘূর্ণ ঘূর্ণ বেদনা ; একখানি নীসা চাপাইয়া রাখিলে যেক্রপ হয়, মাথার পশ্চাৎদেশে সেক্রপ চাপা এবং ভারিবেধ ; মাথার পশ্চাৎদেশে ঘূর্ণ ঘূর্ণে রকমের দগ্ধপিষা বেদনা ; মাথার চুল পড়িয়া যায় (গ্রাফ, নাইটিক্-আস্, ফস্, সিপিয়া) ; মাথায় কল্‌তানি, বিশিষ্ট বিকচ (Guzema), মাথার পশ্চাৎদেশেই বাহা অধিক হয় (ল্লাইকোপ্, সিপিয়া) ; মাথার আর্দ্র, চুলকানি বিশিষ্ট বিকচ, চুলকাইলে বাহা অত্যন্ত জ্বালা করে এবং টাটার (গ্রাফ, লাইকোপ্, মার্ক) ।

চক্ষু । চক্ষু সকালনে চক্ষে জ্বালা এবং চাপাবোধ (কট্টা) ; চক্ষু প্রদাহ এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে চুলকানি ও স্রুচী বিধানের স্থায় যাতনা ; দৃষ্টি হীনতা ; মনে হয় যেন চক্ষু একখানি পাতলা কাপড় দ্বারা ঢাকা রহিয়াছে (কষ্ট, পাল্‌স্) ; চক্ষুর পাতায় চুলকানি, যাহার দরুণ রোগী চক্ষুর পাতা রগড়াইতে বাধ্য হয় ।

কর্ণ । কানের মধ্যে প্রদাহ এবং বেদনায়ুক্ত ক্ষীতি ; কানে কন্‌ শুনা ; কানে সোঁ সোঁ, টনটন এবং কেড়্ কেড়্ শব্দ হওয়া (বেল্, চায়না) ; কানের পশ্চাৎভাগে কল্‌তানি বিশিষ্ট ক্ষত (ক্যাক্-কার্ক্, গ্রাফ) ।

নাসিকা । নাকদিয়া রক্তপড়া (একন্, বেল্, ব্রাই, হ্যামামেনিস্) ; নাকের মধ্যে অধিক পরিমাণে স্লেম্মার সঞ্চার ; নাসিকার অগ্রভাগের চুলকানি ।

মুখগহ্বর এবং গলার মধ্য । নাড়ির ক্ষীতি ; জিহ্বা সাদা লেপযুক্ত (আস্টি-ক্লড্, ব্রাই, নাক্স-বম্, পাল্‌স্) ; মুখে দুর্গন্ধ (হিপ্-সাল্‌ফ্, আয়োড্, নাইটিক্-আস্, মার্ক্, নাক্স-বম্) ; মুখে চটচটিয়া টক, তিক্ত স্বাদ (আস্, ব্রাই, পাল্‌স্) ; মুখে স্লেম্মার সঞ্চার (আয়োড্, মার্ক্) ; ওষ্ঠের কোণে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দানার স্থায় ক্ষুদ্রী । হস্তাহির নিম্নস্থিত গ্রন্থির (Sub-maxillary glands) ক্ষীতি (ব্যারাইটা-কার্ক্, ক্যাক্-কার্ক্, নেট্রাম্-কার্ক্, ব্রাস্‌টক্স্) ।

পাকস্থলী এবং উদর । মলত্যাগের পর চষ্টক্ষা ; শিপাসা

এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে বিয়ার (Beer) নামক মদ্য পানের স্পৃহা (ককিউল্, পাল্‌স্) ; উষ্ণ এবং টক উদ্‌গার উঠা ; অপরাহ্ন বা সন্ধ্যাকালে বুক জালা ; প্রাতঃকালে অনবরত বমনোদ্বেষ্ট এবং গা বমী বমী করা ও উহার সঙ্গে সঙ্গে মুখে জল উঠা ; নৌকা বা গাড়ীতে যাতায়াতে নৌকাদির আন্দোলনে বমন বা বমনোদ্বেষ্ট (ককিউল্, নাক্স-মক্) ; প্রবল বমন (অ্যান্টি-টার্ট্, ইপিকাক্) ; পাকস্থলীতে ভারি এবং চাপাবোধ (নাক্স-মক্) । উদরে কর্ভনবৎ প্রবল বেদনা এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে বমনোদ্বেষ্ট ও উদবাময় ।

মল । দিনের বেলা উদরাময় এবং দান্তেব পূর্বে উদবে বেদনা ; মল কঠিন বাহা অতি কষ্টে নির্গত হয় ; চট্‌চটিয়া আঠা মল ভেদ ।

মূত্রযন্ত্র । মূত্রত্যাগের পর অনবরত মূত্র গড়াইয়া পড়া (কষ্ট্, ট্রীমন্) ; বারম্বার অল্প পরিমাণে মূত্রত্যাগ ; মূত্র নালাতে জ্বালাহুভব ।

জননেন্দ্রিয় । অপ্রকোষাবারে চুলকানি এবং ভিজাবোধ (সাইলিসি) । স্ত্রীলোকের বোনির বহির্দ্বেশ ভিজা এবং উহাতে জ্বালা, টাটানি এবং চুলকানি ; নিয়মিত সময়ের অনেক পূর্বে রজঃস্রাব ; রজঃস্রাবের স্রবণ যোনিদ্বার চুলকায় ; স্তনের বোটা চুলকায় এবং মনে হয় যেন উহাতে ভাতের ফেণের গ্ৰাঘ কোন পদার্থ লাগিয়া রহিয়াছে ।

শ্বাসযন্ত্র । শ্বরভঙ্গ (কার্বো-বেজ্, কষ্ট্, কন্, সাল্‌ক্) ; রাস্ত্রিতে শুষ্ককাশি (কোনায়াস, হায়োস্, পাল্‌স্, সাল্‌ফ্) ; রাস্ত্রিতে বুক কষ্টাহুভব ।

গ্রীবা এবং পৃষ্ঠদেশ । হাড় ভারিবোধ এবং বেদনা ; পৃষ্ঠদেশ এবং কোমরে বেদনা ; বসিয়া থাকিলে গুহ্রাবের ঠিক উপরিভাগের হাড় বেদনা ।

অঙ্গ, প্রত্যঙ্গ, হাত, পা ইত্যাদি । বাহ্য অত্যন্ত দুর্বলতা ; স্পর্শ করিলে হাতের নখে পোঁতলিয়া যাওয়ার গ্ৰাঘ বেদনা ; আঙ্গুলের আগা খস্‌খসে, ফাটায়ুক্ত এবং উহাতে ঘাটিয়া ধবার গ্ৰাঘ বা কর্ভনবৎ বেদনা এবং উহা লালবর্ণ, ছাল উঠিয়া যাওয়ার গ্ৰাঘ জ্বালাযুক্ত হয়, সর্বদা ভিজা থাকে ও উহাতে সর্বদা পুঁক মাগ্‌ডী (চুমটী) পড়ে । পায় চুলকানি, জ্বালা এবং কলতানি বিশিষ্ট ফুস্‌ফুস্‌ ; পায়ের গোড়ালী অত্যন্ত ক্ষীণ, লালবর্ণ,

বেদনাযুক্ত এবং উহাতে স্থলী বিধানের দ্বারা অল্পভূত হয় ও কোঁকা পড়ে ; পায়ের আঙ্গুলের ফাঁকে ফাঁকে ছাল উঠিয়া যাওয়ার দ্বারা ক্ষত (আগারিকশ, নাইট্রিক-আস, জিঙ্কাম্) ; পায়ের কড়ায় জ্বালা এবং স্থলীবিধানের দ্বারা অল্পভূত হয় ; পায়ের আঙ্গুলের মধ্যবর্তী স্থানে ফুসুড়ী (ক্যাক্-কার্ব, ক্যাম্ফার, নাক্সবম্, নাইট্রিক-আস, নিপিরাম্) ; পায়ের পাতায় প্রচুর ঘর্ষ (সাইলিসি) ; রাত্রিতে পায়ের পাতার তলার খিলখিল (সাল্ফ) ।

চর্ম্ম । চর্ম্ম অস্থূহ ; সামান্য আঘাতেই ক্ষত এবং বিস্থূত হয় (বোরাক্স, ক্যাম্, হিপ্-সাল্ফ, গ্রাফ, সাইলিসি, সাল্ফ) ; পুরাতন আকারের কল্‌তানি বিশিষ্ট বিকচ (Eczema), বাহার দরুণ আক্রান্ত স্থানে ক্ষত হওয়া বা ছাল উঠিয়া যাওয়ার দ্বারা অল্পভূত হয় (গ্রাফ) ; সমুদয় শরীরের চর্ম্মই টাটায়, বাহ্যাব দরুণ গায়ের কাপড়ও অসহ হয় এবং উহার দরুণ ঘাতনার উদ্বেক হয় (বেল) ; গায় ক্ষত এবং ক্ষতে ছল ফুটানের দ্বারা বেদনা ও উহাতে অতিরিক্ত মাংস বৃদ্ধি (Proud Flesh) হয় (কার্বো-বেজ, নাইট্রিক আস) ; অনেক সময় গায় গভীর ক্ষত হয় বাহার প্রাপ্ত উচ্চ থাকে ।

কাবহার । ক্রোধ এবং বিরক্তি জনিত অস্থূহ ; বিকচ (Eczema) ; নাদেয় দ্বারা ফুসুড়ী (হাৰ্পিন্, Herpes) ; লোনা জল ব্যবহার করার দরুণ গায় ফুসুড়ী ; হাত পায়ের আঙ্গুলের ফাঁকে ফাঁকে ছাল উঠিয়া যাওয়ার দ্বারা ঘা ; পাকস্থলীর অস্থূহ ; জলপথে নৌকা জাহাজাদিতে চালবার সময় বমন বা বমনোদ্বেগ (Sea-sickness) ; গর্ভাবস্থায় বমন বা বমনোদ্বেগ (Morning sickness) ; গর্ভাবস্থায় চাক্ষু্যুক্ত আহাৰ দ্রব্যে অক্লিষ্ট ; বোগলে দুৰ্গন্ধ-যুক্ত ঘর্ষ ; পায়ের পাতায় দুৰ্গন্ধযুক্ত ঘর্ষ, বাহার দরুণ অনেক সময় ক্ষতও হইয়া থাকে ; বধিরতা এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে কানে শব্দ হওয়া ; মূত্রনাগী, জরায়ু, অন্ত্র এবং বায়ু উপনলের শ্লেষ্মা জানত রোগ ইত্যাদি অস্থূহে পিট্টোলিগাম্ ব্যবহায্য । টেষ্টার (Teste) মতে, শিশু বা বালক বালিকাগণের আমাশয় রোগে এই ঔষধ হাঁপকাণ্ডউন্নতির সঙ্গে পর্যায়ক্রমে ব্যবহারে বিশেষ উপকার দর্শে । ডাক্তার গারেন্সি (Dr. Guereusy) বলেন যে, গর্ভবতী স্ত্রীলোকের পেটের অস্থূহে এই ঔষধ বিশেষ উপকারী । তিনি

আরো বলেন যে, কেবল দিনের বেলা উদরাময় এই ঔষধের একটা বিশেষ প্রাকৃতিক নির্দিষ্ট লক্ষণ ।

বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ । অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বেন অসাড় এবং তৎপর শক্তি হয় ; সন্ধির বাতজনিত কঠিনতা এবং চলিবার সময় উহাতে কেড়্ কেড়্ শব্দ হওয়া ; বহির্বিষ্যু ভাল লাগে না ; সানাত্য কারণেই সর্দি লাগে ; গর্ভাবস্থায় চর্বিযুক্ত দ্রব্যে অকতি, পেটের অস্বস্থ এবং তদ্রূপ কেবল দিনের বেলাই উদরাময় ইত্যাদি পিষ্টো্যালিয়ামের কতকগুলি বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ ।

সমগুণবিশিষ্ট ঔষধ । বেলান্ডোনা, ব্রাউনিয়া, ক্যাল্কেরিয়া কার্ল্, ক্যামোমিলা, ককিউলাস্, গ্রাফাইটিস্, ইগ্‌নোনিয়া, লাইকোপজিয়া, নাক্স-বমিকা, ফক্ষরাস্, পাল্‌গেটিনা, রাস্টেজ্, পিপিয়া, সাইলিসিয়া, সাল্‌কার ।

প্রতিষেধক ঔষধ । ককিউলাস্, নাক্স-বমিকা ।

ডাইনুশন বিচার । নৌকা বা জাহাজাদিতে বাতায়ানের সময় বমন বা বমনোদেগ, গর্ভাবস্থায় বমন বা বমনোদেগ ইত্যাদি অস্বস্থে ডাক্তার বেজের (Dr. Bayes) মতে ৩য় দশমিক ক্রমের আবেক ব্যবস্থা । ৩য় এবং ৬ষ্ঠ ক্রমের আরোক সচরাচর ব্যবহার করিয়া আমরা যথোচিত ফল পাইয়া থাকি ।

রেনান্কুলাস্ বাব্বোসাস্,- রেনান্কুল্

(RANUNCULUS BULBOSUS,-RANUNC-BULB.)

ইউরোপের অনেক স্থানেই মাঠ বদ্বাদানে এই গাছ জন্মে । গাছের সমুদয় অংশ যথানিয়মে প্রক্‌ স্পিরিটে ভিজাইয়া ইহার মূল আরোক প্রস্তুত হইয়া থাকে ।

সাধারণ ক্রিয়া । চর্ম্ম এবং পৈশিক অংশের উপর ইহার কার্য্য অতি প্রবল । বুকের প্রাচির আক্রমণ করা এই ঔষধের একটা বিশেষ প্রকৃতি

মধ্যে পরিগণিত । ইহা বৃকের মধ্যে প্লুরোডিনিয়ার (Pleurodynia) দ্বারা
অল্প উৎপাদন করে । অতএব উক্ত অস্থিতে এই ঔষধ বিশেষ উপকারী ।

সাধারণ প্রাকৃতিক লক্ষণ ।

মন । কোন বিষয়ে চিন্তা করিতে করিতে চিন্তার বিষয়টী এক-
বারেই স্মরণ থাকে না ; স্থূল বুদ্ধি অথবা রোগী কোন বিষয় বুঝিতে পারে
না ; সর্বদা চিড়্ চিড়্ করা এবং ঝগড়া করার স্বভাব ।

মস্তক । ঘরের ভিতর হইতে বহির্কায়ুতে গেলে মাথাঘোরা এবং
তন্দ্ররূপ টলিয়া পড়িয়া যাওয়ার ভয় ; মনে হয় যেন মাথা স্বাভাবিক
অপেক্ষা অনেক বড় এবং বিস্তৃত (ম্যাগ্-কার্ক) ; মাথায় রক্তাধিক্য বা
রক্তাবরোধ (একন্, বেল্) ; ডাইন চক্ষুর উপরিভাগে বেদনা, শয়ন করিয়া
থাকিলে যাহার বৃদ্ধি হয় এবং চলিয়া বেড়াইলে বা দাঁড়াইয়া থাকিলে যাহার
উপশমন হয় ; কপালে চাপিয়া ধরার দ্বারা বেদনা, যাহা বহির্দেশ হইতে আরম্ভ
হইয়া মধ্যদেশ পানে বিস্তৃত হয় ; প্রায়ই উষ্ণ স্থান হইতে শীতলস্থানে এবং
শীতল স্থান হইতে উষ্ণ স্থানে গেলে শিরঃপীড়ার উদ্বেক বা বৃদ্ধি হয় ।

চক্ষু । চক্ষুর গোলকে চাপাবোধ ; চক্ষুর পাতায় জ্বালা এবং চিড়িক
মারা ; চক্ষু এবং চক্ষুর কোণে জ্বালা, টাটানি এবং চিড়িকমারা ; চক্ষুর
সম্মুখে কৃশাশার দ্বারা দেখায় ।

কর্ণ । কানের মধ্যে স্ফটিকবিশদনের দ্বারা অল্পভূত হয় এবং যাহা
দ্রব্য় সময়ই অধিক অল্পভূত হয় ।

নাসিকা । নাসিকা লালবর্ণ, প্রদাহযুক্ত, ক্ষীত এবং উহাতে কসিয়া
ধরার দ্বারা বেদনা ।

মুখগহ্বর এবং গলার মধ্য । মুখে সাদা লাল উঠা এবং উহার
সঙ্গে সঙ্গে মুখে তামার দ্বারা স্বাদ । গলার মধ্যে অধিক পরিমাণ আঁটাল
শ্লেষ্মার সঞ্চয় ; গলার মধ্য এবং তালুকায় প্রদাহ জনিত আলোযুক্ত বেদনা ।

পাকস্থলী এবং উদর । অপরাহ্নে পিপাসার বৃদ্ধি ; বারম্বার
উদগার উঠা ; আক্কেপিক হিক্কা (হায়োস্, ইগ্‌নেস্) ; অপরাহ্নে বমনোদ্বেগ
এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে কখন কখন মাথাঘোরা ; পাকস্থলীর মধ্যে চাপাবোধ

(আস্, ব্রাই, পালস্); পাকস্থলী এবং হৃৎপিণ্ডেব নিকটবর্তী পাকস্থলীর মুখে এবং পাকস্থলীতে জ্বালাহুতব। মোচড়াইয়া পড়িলে বা খেঁতলিয়া গেলে যেরূপ হয়, উদরের ছই পার্শ্বে সেরূপ বেদনা ; যকৃত প্রদেশে হৃচীবিধানের জ্বায় যাতনা, বাহার দক্ষণ শ্বাসরোধ হয় এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে ডাইন স্বকের উপরিভাগে হৃচীবিধানের জ্বায় যাতনা ; উদরে চিন্ চিনে বা কর্ত্তনবৎ বেদনা; খেঁতলিয়া গিয়া ক্ষত হইলে যেরূপ হয়, চালিলে উদরে সেরূপ টাটানি ।

শ্বাসযন্ত্র । নিশ্বাস প্রশ্বাস ঘন ঘন এবং শ্বাস কষ্ট ও উহার সঙ্গে সঙ্গে বৃকে জ্বালাযুক্ত এবং হৃচীবিধানের জ্বায় তীক্ষ্ণ বেদনা ও দীর্ঘনিশ্বাসের ইচ্ছা এবং অত্যন্ত ক্রন্দন ; বৃকে হৃচীবিধানের জ্বায় যাতনা, নড়া চড়া, মাথা হেট করিয়া উপুড় হইলে, অথবা নিশ্বাসে যাহার বৃদ্ধি হয় (ব্রাই) ; চামড়ার নীচে ক্ষত হইলে যেরূপ হয়, বৃকে সেরূপ টাটানি (আর্দিকা), আঘাত লাগিলে বা নড়া চড়াতে যাহার বৃদ্ধি হয় (সেনিগা) ।

পৃষ্ঠদেশ । পৃষ্ঠদেশে বেদনা ; ক্ষুদ্র পাজরা প্রদেশে অবশবোধ এবং উহাতে মোচড়াইয়া পড়া বা খেঁতলিয়া বা ওষার জ্বায় বেদনা ; চলিবার সময় কোমর প্রদেশের ডাইন পার্শ্বে হৃচীবিধানের জ্বায় যাতনা এবং উহাতে সামান্য রকমের জ্বালাহুতব ।

অঙ্গ, প্রত্যঙ্গ, হাত, পা ইত্যাদি । বাহ্যতে বাহ্যের বেদনার আকার বিশিষ্ট আঙ্গৈপিক বেদনা ; বাহু, হাত এবং হাতের আঙ্গুলে হৃচীবিধানের জ্বায় যাতনা ; আঙ্গুলের কোন কোন অংশে কন্ কনানি ; হাতের পাতা এবং আঙ্গুলে ফোড়ার জ্বায় কুস্তুড়ী ; উরুর মধ্য দিয়া আগাগোড়া কসিয়া ধরার জ্বায় বেদনা ; পূর্কালে চলিবার সময় পা ইত্যাদিতে অত্যন্ত দুর্বলতা ; দাঁড়াইয়া থাকিলে পায়ের গোড়ালীতে হৃচীবিধানের জ্বায় দগ্ধপ্যনি ।

চর্ম্ম । অনেক রাত্রিতে ঘুম হয় এবং রাত্রিতে বারবার ঘুম ভাঙ্গিয়া যায় ; ঘুম ভাল হয় না ।

ব্যবহার । পেশী এবং সন্ধিবাৎ রোগ, বিশেষতঃ পাজরার হাড়ের মধ্যবর্তী স্থানের পেশীবাৎ ; কুক্ষু সাবরক ঝিল্লা প্রদাহ (Pleurisy) ; কুজিম কুক্ষু সাবরক ঝিল্লা প্রদাহ বা প্লুরোডিনিয়া (Pleurodynia) ; আমবাত ;

টেটার (Tetter) ; পেম্ফাইগাম্ (Pemphigus) ; সাংঘাতিক রকমের ক্ষত বাহা শীঘ্র শীঘ্র বিস্তৃত হয় ইত্যাদি অস্থে এই ঔষধ ব্যবস্থা। ডাক্তার হিউজ্ (Dr. Hughes) বলেন যে, কটিবাত (Sciatica), দাঁদের জ্বাঘ কুস্কুড়ী, বাতজনিত শ্বায়ুশূল, বিকচ (Eczema), পাঁজরের হাড়ের মধ্যবর্তী অংশের শ্বায়ুশূল ইত্যাদিতে ইহা বিশেষ উপকারী। ডাক্তার আলেন্ এবং নর্টনের (Drs. Allen and Norton) মতে চক্ষুর কোটাবের উপরিভাগের শ্বায়ুশূলে এই ঔষধ বিশেষ উপকারী। ডাক্তার বেজ্ (Dr. Bayes) বলেন যে, যে প্রকার ফুফুসাবলক ঝিল্লী প্রদাহ (Pleurisy) এবং বক্ষশোথ (Hydrothorax) ভাইন পার্থ আক্রমণ করে, তাহাতে এই ঔষধ উপকারী। জাবার ডাক্তার গ্যারেঙ্গি (Dr. Guerey) বলেন যে, যে প্রকার শ্বেত প্রদর প্রথমতঃ অতি সামান্য আক্রমণ থাকে এবং তৎপর উগ্র জ্বালা উৎপাদক ও ক্ষত কারক হয়, তাহাতে বেনান্‌কুলাম্ বাঘোদাম্ বিশেষ উপকারী।

বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ। সমুদয় শরীরে অবশ এবং ভারি বোধ ; মোচড়াইয়া পড়িলে বা খেঁচিলিয়া গেলে যেকণ ভয়, সমুদয় শরীরে সেক্রপ বেদনা ; অঙ্গ প্রত্যঙ্গ এবং পেশীতে খোঁচাবিধা, ছিঁড়িয়া কেলা এবং পেশীবাত বা সন্ধিবাতের জ্বাঘ বেদনা ; বহির্নিঃসৃত পরিবর্তনে, প্রাতঃকালে, সন্ধ্যার সময়, স্পর্শনে, নড়াচড়াতে, পাশ পরিবর্তনে এবং মদ্য পানে অস্থের ব্যক্তি ইত্যাদি বেনান্‌কুলাম্ বাঘোদামের কতকগুলি বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ।

সমগুণবিশিষ্ট ঔষধ। রাস্টক্স, ক্রিমেটিস্, ইউফোর্বিয়াম্, ক্রোটন, মেজিরিয়াম্, সাবাডিল্লা, ষ্টাফিসেগ্রিয়া, ব্রাইওনিয়া, পাল্‌সেটিলা।

প্রতিষেধক ঔষধ। ব্রাইওনিয়া, ক্যান্‌ফার, পাল্‌সেটিলা, রাস্টক্স।

ডাইলুশন বিচার। ১ম, ২য় এবং ৩য় ক্রমের আরোকই সচরাচর অধিক ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

রুম্ পাল্‌মেটাম্,-রুম্বার্ব,-রুম্

(RHEUM PALMATUM,-RHEUBARB,-RHEUM)

চীনদেশ, চাইনিজ টার্টারি এবং তিব্বৎ দেশে এই গাছ জন্মে। ইহার শুকনা শিকড় যথানিয়মে ফ্রক্‌স্পিরিটে ভিজাইয়া মূল আরোক প্রস্তুত হইয়া থাকে।

সাধারণ ক্রিয়া। বৃক্ক এবং অন্ত্রনালীর (Intestinal Canal) উপর ইহার কার্য্য দেখিতে পাওয়া যায়, যাহার দরুণ পিত্তের সঞ্চয়ের বৃদ্ধি হয় এবং অন্ত্রের শেলীর কার্য্যের চাকল্য বৃদ্ধি হওয়ার দরুণ স্বাভাবিক মল ভেদ হয়, কিন্তু উহার দরুণ অন্ত্রে কোন প্রকারের প্রদাহ উৎপন্ন হয় না। মলে অভ্যন্তর টক গুরু থাকা এই ঔষধের একটি বিশেষ প্রাকৃতিক চিহ্ন মধ্যে পরিগণিত।

সাধারণ প্রাকৃতিক লক্ষণ।

মন। শিশু বা বালক বালিকাগণ নানা দ্রব্য চাহে এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে কাঁদে।

মস্তক। ঘুশ্‌ঘুশে রক্তের অবসরকারক শিরঃস্রাভা; মাথায় ভারিবোধ।

মুখমণ্ডল। মুখমণ্ডলে নীতল ঘর্ম্ম (বিরেট্‌-আল্‌ব্‌), নাক ও ওষ্ঠের চতুষ্পার্শ্বে ই বাহ্য অধিক দেখিতে পাওয়া যায়।

পাকস্থলী এবং উদর। অনেক প্রকার দ্রব্য খাওয়ার ইচ্ছা হয় বটে, কিন্তু যাচিত দ্রব্য দিলে তাহা পাইতে রোগীর রুচি হয় না (ক্যাম্‌, সিনা, ব্রাই); বমনোদ্বেগ যেন পাকস্থলী পিষা উদর হইতে আরম্ভ হয় একরূপ অস্বস্তি হয় এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে শূল বেদনার স্থায় বেদনা; অতিরিক্ত পরিমাণে খাইলে বেকরূপ হয়, পাকস্থলীতে সেরূপ পূর্ববোধ (চায়না, লাই-কোপ্‌, লাক্স-বম্‌, পাল্‌স্‌)। উদরে ভয়ানক আকারের কর্তনবৎ শূল বেদনার স্থায় বেদনা, যাহার দরুণ রোগী হাঁটু ওটাইয়া জড়সড় হইয়া থাকিতে বাধ্য হয় (আলোজ্‌, কষ্ট্‌, কলোস্‌, আইরিস্‌); পেট্‌ কামড়ানী এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে বাহ্যের বেগ্‌।

মল এবং মলদ্বার । বারম্বার বাহ্যের বেগ, কিন্তু বেগ দিলে মল নির্গত হয় না (আম্, কোনায়াম্, নেট্রাম্ কার্ক্, নাক্স-বু), নড়া চড়া এবং চলিবার সময় যাহার বৃদ্ধি হয় ; প্রত্যেকবার দান্তের পূর্বে উদরে শূল বেদনার স্থায় বেদনা (কলোস্, মার্ক্) ; আহ্বারের পব বাহ্যে যাওয়ার ইচ্ছা ; তরল, কাইয়ের স্থায়, টকগন্ধযুক্ত মলভেদ (আর্বিকা, হিপ্-সাল্ফ্, পডোফ্, সাল্ফ্) এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে দান্তের পূর্বে কৌথপাড়া, দান্তের পর শূল বেদনার স্থায় আঁটিয়া ধরা বা কর্তনবৎ বেদনা এবং দান্তের পর শীতকম্প (মার্ক্) ; শ্লেষ্মা মিশ্রিত কটাবর্ণের মলভেদ ও তৎপর অন্ত্যস্ত কষ্টদায়ক কৌথপাড়া এবং গুহ ও গুহদ্বারে ভয়ানক জ্বালাভূতব (আস্, সাল্ফ্) ।

পৃষ্ঠদেশ । পৃষ্ঠদেশে ভয়ানক আকারের কর্তনবৎ বেদনা, যাহার দৃশ্য মনে হয় যেন প্রত্যেকবার মলত্যাগের সময় কোমব প্রদেশস্থ মেক-দণ্ডের হাড়ের বৃদ্ধি হইয়াছে ।

অঙ্গ, প্রত্যঙ্গ । নড়া চড়ার সময় সমুদয় সন্ধিতে বেদনা ; যে পাশে শোয়া যায়, সে পার্শ্বের অঙ্গ একবারে অবশ বা অসাড় হইয়া যায় ; অনেক-ক্ষণ ধরিয়া বা অতিরিক্ত শারীরিক পরিশ্রম করিলে যেক্রপ হয়, উরুদেশে সেক্রপ ক্রান্তিবোধ ; বাম হাঁটুর পশ্চাৎদেশে চাপিয়া বা কসিয়া ধরার স্থায় বেদনা, পায়ের গোড়ালী পর্য্যন্ত যাহা বিস্তৃত হয় ।

নিদ্রা । অস্থির নিদ্রা বা নিদ্রা ভাল হয় না এবং তদ্রূপ বারম্বার বিছানায় এপাশ ওপাশ করিয়া ছট্‌ফট্ করা (একন্, রাস্টক্স) ; জ্বঃ উৎপাদক বিষয়ে স্পষ্ট স্বপ্ন দেখা ; ঘুমের অবস্থায় নিশ্বাসে গৌ গৌ শব্দ হওয়া ।

ব্যবহার । শিশু বা ছোট বালক বালিকাগণের এবং জ্বীলোকের স্মৃতিকাগারে টকগন্ধ বিশিষ্ট উদরাময়েই ক্রম্ অধিক ব্যবহার্য্য ।

বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ । শিশুগণের টকগন্ধযুক্ত উদরাময় এবং মল স্বাভাবিক মলের স্থায় আকার বিশিষ্ট, কিন্তু তরল বা অর্ধতরল ; শিশুগণের গায় সর্বদা টক গন্ধ যাহা প্রতিদিন ভাল করিয়া নান করিলেও দূরীভূত হয় না ইত্যাদি এই ঔষধের বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ । আবার ডাক্তার আলেন্ (Dr. Allen) বলেন যে, আহ্বারে বীতস্পৃহা বা অকৃতি

কমের একটা বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ। গায়ের কাপড় ফেলিয়া দিলে, ঠাণ্ডাতে অস্থখের বৃদ্ধি এবং গায় কাপড় দিলে বা উষ্ণতাতে অস্থখের উপশম। শুভ্রপায়ী শিশুগণের দাঁত উঠার সময় অস্থখে ইহা বিশেষ উপযোগী।

সমগুণবিশিষ্ট ঔষধ। আর্সিনিক, কেলোডোনা, ক্যামোমিলা কলোসিঙ্ক, মার্কিউরিয়াম্, নাক্স-বমিকা, পাল্‌সেটিকা ।

ডাইলুশন বিচার। ২য়, ৩য় এবং ৬ষ্ঠ ক্রমের আরো কই সচরাচর অধিক ব্যবহৃত হইয়া থাকে ।

রডোডেণ্ড্রন ক্রিশাঙ্খাম্,-রডোড্

(RHODODENDRON CHRYSANTHUM,-RHOD.)

এই গাছের শুকনা পাতা এবং ফুলের কুঁড়ি যথানিয়মে প্রক্‌ স্পিরিটে তিজাইয়া মূল আরোক প্রস্তুত হইয়া থাকে ।

সাধারণ ক্রিয়া। পেণী এবং শরীরের আঁশাল অংশের উপর ইহার কার্য্য অত্যন্ত প্রবল, যাহার দরুণ আক্রান্ত অংশের পেণী এবং সন্ধি বাস্তের অবস্থা প্রাপ্ত হয় এবং অণুকোষ ও অণুকোষাধারের উপর ইহার কার্য্য থাকা হেতু, অণুকোষ এবং অণুকোষাধারের প্রদাহ, ক্ষতি এবং কঠিনতা উৎপাদন করিয়া থাকে। ঠাণ্ডা, ঝড়, বৃষ্টি এবং বজ্রপাতের সময় এবং উহার পূর্বে অস্থখেব আক্রমণ বা বৃদ্ধি এই ঔষধের একটা বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ ।

মুক্তক। প্রাতঃকালে বিছানায় শয়ন করিয়া থাকা কালীন কপাল এবং কপালের দুই পার্শ্বে বেদনা, মদ্যপানে (নাক্স-বম্, জিঙ্ক্) এবং আত্ম ঠাণ্ডা বাতাসাদিতে যাহার বৃদ্ধি হয় ও বিছানা হইতে উঠিলে বা এদিক ওদিক চলিয়া বেড়াইলে যাহার উপশম হয় ; বাম কর্ণের পশ্চাৎভাগে ছিঁড়িয়া ফেলা বা ছিদ্র করার জ্বায় বেদনা ।

চক্ষু। চক্ষু শুষ্ক এবং জ্বালাবোধ, দিনের বেলা উজ্জ্বল আলোকে ও একভাবে অনেকক্ষণ কটমট্‌ করিয়া তাকাইয়া থাকিলে যাহার বৃদ্ধি হয় ।

কর্ণ । ডাইন কর্ণের বহির্দেশে প্রবল বেদনা বাহ্য প্রাতিঃকালে আরম্ভ হইয়া সমস্ত দিন অবস্থিতি করে ।

নাসিকা । বাম নাসারন্ধ্র রুদ্ধ হয় এবং কখন কখন উহার সঙ্গে সঙ্গে পর্যায়ক্রমে ডাইন নাসারন্ধ্রও রুদ্ধ হইয়া থাকে, বহির্কায়ুতে বাহার অনেক উপশম হয় ; দাঁতের গোড়ার কসিয়া ধরা বা ছিঁড়িয়া ফেলার ভ্রায় বেদনা, ঝড় বৃষ্টিতে বা ঝড় বৃষ্টির পূর্বে বাহার বৃদ্ধি হয় (রাস্টল্) ।

গলার মধ্য । গলার মধ্যে টাচিয়া ফেলা বা ছাল উঠিয়া যাওয়ার ভ্রায় অনুভূত হয়, বাহার দরুণ মনে হয় যেন গলার মধ্য শ্লেষ্মা দ্বারা আবৃত হইয়া রহিয়াছে ।

মল । মল কোমল বাহ্য আন্ত্রে আন্ত্রে নির্গত হয় এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে অত্যন্ত বাহ্যের বেগ বা কোথপাড়া বর্তমান থাকে (কার্কো-বেজ্, চায়না) ।

মূত্রযন্ত্র । বারম্বার মূত্রত্যাগের ইচ্ছা এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে মূত্রাধারে কসিয়া ধরা ; চামড়ার নীচে ক্ষত হইলে যেরূপ হয়, মূত্রনালীতে সেরূপ বাতনা ।

জননেন্দ্রিয় । পুরুষের গুহদ্বার হইতে অণ্ডকোষ পর্য্যন্ত কসিয়া ধরার ভ্রায় বেদনা ; অণ্ডকোষ উপরের দিকে আকৃষ্ট, ক্ষীত এবং বেদনায়ুক্ত (ক্রিমेटিস্) ; অণ্ডকোষ এবং অণ্ডকোষাধার এত বেদনায়ুক্ত হয় বা টাটায় যে, উহাতে সামান্য স্পর্শও সহ হয় না ; থেংলিয়া গেলে যেরূপ হয়, অণ্ডকোষে সেরূপ বেদনা (আর্জেন্ট-নাইট্রিক্, স্পঞ্জ) এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে পর্যায়ক্রমে কসিয়া ধরার ভ্রায় বাতনা ; অণ্ডকোষের ক্ষীতি এবং কঠিনতা (একন্, আর্জেন্ট্, কষ্ট্), বিশেষতঃ বাম অণ্ডকোষের এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে উহাতে কসিয়া ধরার ভ্রায় প্রবল বেদনা বাহ্য উরুদেশ ও উদর পর্য্যন্তও বিস্তৃত হইয়া থাকে ; ডাইন অণ্ডকোষে বাটিয়া ধরা বা স্থলীবিধানের ভ্রায় বাতনা ; অণ্ডকোষের চুলকানি এবং উহাতে ঘর্ষণের বৃদ্ধি (সাইলিসি) ; অণ্ডকোষাধারের শোথ সম্বলিত প্রদাহ (Hydrocele) । ক্রীলোকের ডিম্বকোষে বেদনা, বায়ুর পরিবর্তনে বাহার বৃদ্ধি হয় ; যোনিদ্বারের স্থানে স্থানে জলপূর্ণ থলিয়ার ভ্রায় ক্ষীতি ।

শ্বাসযন্ত্র । প্রাতিঃকাল এবং সন্ধ্যার সময় অবসন্ন কারক শুক কাশি

এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে বৃক্কে কষ্টানুভব ও গলার মধ্যে থশ্বশে বোধ ; তাড়াতাড়ি চলিবার সময় বৃক্কে হইতে উদরের বাম পার্শ্ব পর্য্যন্ত কণ্ঠস্থায়ী শ্বশ্বশে বেদনা ।

গ্রীবা এবং পৃষ্ঠদেশ । অতি প্রত্যয়ে বিছানায় থাকিতে থাকিতে অথবা বিছানা হইতে উঠিলেই ঘাড় এবং পৃষ্ঠদেশে বাতের বেদনা ; কোমরের পশ্চাৎ দেশে খেঁতলিয়া যাওয়া বা মোচড়াইয়া পড়ার স্থায় বেদনা, বিশ্রাম কালীন এবং বৃষ্টিতে যাহার বৃদ্ধি হয় (রাস্-টঙ্ক) ।

অঙ্গ, প্রত্যঙ্গ । সমুদয় অঙ্গ প্রত্যঙ্গে বাতের স্থায় কসিয়া ধরা বা ছিঁড়িয়া ফেলার স্থায় বেদনা (একন্, কলোস্, লেডাম্, পাল্‌স্, জলবৃষ্টি এবং বিশ্রাম কালীন যাহার বৃদ্ধি হয় (রাস্-টঙ্ক) ; আঘাত লাগিয়া খেঁতলিয়া গেলে যেরূপ হয়, সন্ধিতে সেরূপ বেদনা এবং উক্ত সন্ধিতে ছিঁড়িয়া ফেলা বা কসিয়া ধরার স্থায় বেদনা ; অস্থির আবরক কঠিন পর্দায় (Periosteum) কসিয়া ধরা বা ছিঁড়িয়া ফেলার স্থায় বেদনা, হাত এবং পায়েই যাহা অধিক অনুভূত হয় ; অঙ্গপ্রত্যঙ্গের স্থানে স্থানে উক্ত প্রকারের বেদনা, স্নাত্তিতে, বিশ্রামকালীন এবং বায়ুর পরিবর্তনে যাহার বৃদ্ধি হয় (রাস্-টঙ্ক) ।

ব্যবহার । পেণী এবং বৃহৎ ও ক্ষুদ্র সন্ধিবাত জনিত অস্থখ ; অণ্ডকোষ এবং অণ্ডকোষাধারের পুরাতন আকারের শোথ সম্বলিত প্রদাহ ; অণ্ডকোষের কঠিনতা ; গ্রীবা এবং বৃক্কের পেণীবাত ; হাত পায়ে বাতজনিত স্নায়ুশূল, আহারের সময় এবং উহার পর যাহার বৃদ্ধি হয় ; চক্ষুর গ্লকোমা (Glaucoma) নামক অস্থখ ইত্যাদি অস্থখে রডোডেণ্ড্রন ব্যবহার্য্য ।

বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ । প্রাতঃকালে বিশ্রাম কালীন ; ঋতু বৃষ্টি এবং বজ্রাঘাতের পূর্বে, ঠাণ্ডা আত্মপাতনে অস্থখের বৃদ্ধি এবং আহারের সময় এবং উহার পর অস্থখের উপশম ।

সমগুণ বিশিষ্ট ঔষধ । রাস্-টঙ্ক, ক্রিমোটস্, রেনান্‌কুগাস্, ব্রাইওনিয়া, ক্যাল্‌কেরিয়া কার্বোনিকা, কোনাগাস্, লাইকোপডিয়াস্, মার্কিউরিয়াস্, নাক্স-বমিকা, পাল্‌সেটিলা, সিপিয়া, সাইলিসিয়া, সাল্‌ফার ।

প্রতিষেধক ঔষধ । ব্রাইওনিয়া, ক্যান্‌ফার, ক্রিমোটস্, রাস্-টঙ্ক ।

ডাইলুশন বিচার । বাতরোগ বা মুখমণ্ডলের বাতজনিত বেদনা

বা ঝায়ুশ্লে জার্মেনী দেশীয় চিকিৎসকগণ ১ম এবং ২য় দশমিক ক্রমের আরোকই সচরাচর অধিক ব্যবহার করিয়া থাকেন। আমরাও এতদেশে ১ম হইতে ৬ষ্ঠ ক্রমের আরোক সচরাচর ব্যবহার করিয়া থাকি। ইহার ১২ এবং ৩০ ক্রমও ব্যবহৃত হইয়া থাকে। অণুকোষ এবং অণুকোষাধারের পুরাতন আকারের বিবৃদ্ধি এবং কঠিনতায় শ্রীযুক্ত ডাক্তার মহেন্দ্র লাল সরকার, এম্, ডি, মহাশয় সচরাচর ৪র্থ দশমিক ক্রমের আরোক ব্যবহা করিয়া থাকেন।

রুমেক্স ক্রিস্পাস্,-রুমেক্স্

(RUMEX CRISPUS,-RUMEX.)

এই গাছের কাঁচা শিকড় যথা নিয়মে প্রক্ স্পিরিটে ভিজাইয়া মূল আরোক প্রস্তুত হইয়া থাকে।

সাধারণ ক্রিয়া। স্নায়িক বিষ্মী, লিম্ফাটিস্ (Lymphatics) এবং চর্মের উপর ইহার কার্য অতি প্রবল, যাহার দরুন উক্ত যন্ত্রদ্বয়ের স্বাভাবিক নিঃসরণ কম হয় এবং উহার স্পর্শজ্ঞান শক্তির অতিরিক্ত চাক্ষু্য হইয়া উহার অতিরিক্ত বিকৃত রক্তের উত্তেজনা উৎপন্ন হয়, অথচ উক্ত যন্ত্রাদির প্রকৃত প্রদাহ উৎপন্ন হয় না।

সাধারণ প্রাকৃতিক লক্ষণ।

মস্তক। ঘূশ্-ঘূশে মাথাধরা এবং মোচড়াইয়া পড়িলে বা পেঁতুলিয়া গেলে ঘেক্রপ হয়, কপালে সেক্রপ বেদনা।

নাসিকা। নাসিকা হইতে রক্তস্রাব; প্রবল হাঁচি এবং নানারক্ অত্যন্ত কষ্টদায়ক জ্বালা বা চড়্-চড়ানো; নাক দিয়া প্রচুর পরিমাণে জলবৎ তরল প্লেয়া নিঃসরণ এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে বারম্বার হাঁচি দেওয়া (একনু, সিপা, মাক্সুনেরিয়া), সন্ধ্যার সময় এবং রাত্রিতে বাহার বৃদ্ধি হয়।

মূথগহ্বর এবং গলার মধ্য। জিহ্বা হরিদ্রা লেপযুক্ত (চেলি-

ডন্, চারমা, আয়োড)। গলার মধ্যে ছাল উঠিয়া যাওয়া বা চাঁচিয়া ফেলার ভয় অমুক্ত হয় (আমন্-কার্ক, কার্কো-বেজ্, কষ্ট্, ফন্, পাল্‌স্) এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে গলার মধ্যের উপরিভাগে শ্লেষ্মার সঞ্চার ।

পাকস্থলী । আহারের পরই উদরোৰ্দ্ধ প্রদেশে ভারিবোধ (ব্রাই, নাক্স্-বন্, পাল্‌স্) ; চাপদিলে পাকস্থলীর মধ্যে পূর্ববোধ বাহা গলার মধ্য পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয় ; পাকস্থলীর মধ্য হইতে বৃক পর্য্যন্ত খোঁচা বিধার ভয় যাতনা ।

মল । প্রাতঃকালে উদ্বাসয় (আলোজ্, পডোফ্, সাল্‌ফ্) ; মল কটাবর্ণ এবং জলবৎতরল (আস্, ক্যালী-বাই) ; দান্তের পূর্বে কোঁধ পাড়া এবং উদরে বেদনা ; কোষ্ঠবদ্ধ (আলান্, ব্রাই, নাক্স্-বন্, ওপিয়াম্, ফন্, সাল্‌ফ্) ।

শ্বাসযন্ত্র । কঠনালীতে চট্‌চটিয়া আঠা শ্লেষ্মার সঞ্চার (ক্যালী বাই, নাক্স্-বন্) এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে বারম্বার গলার ক্ষেকুর দেওয়ার ইচ্ছা ও গলায় ক্ষেকুর দিলেও বাহার উপশম হয় না ; কঠনালীতে বেদনা (ফন্) ; স্বরভঙ্গ (কার্কো-বেজ্, কষ্ট্) ; রোগী (জীলোক) মনে করে যেন সে আর নিশ্বাস ফেলিতে পারিবে না এবং তাহার বৃকের মধ্যে যেন আর বাতাস প্রবেশ করিবে না ; অনবরত প্রাক্তিজনক শুক কাশি (নাক্স্-বন্, পাক-স্থলীর মধ্যে স্ফু-স্ফু-কবার দরুণ বাহার উজ্জেক হয় (হিপ্-সাল্‌ফ্, ফন্, সাক্সুনেরিয়া, সিপিয়া), চাপ পড়িলে, কথা বলিলে, প্রধানতঃ নিশ্বাসে বৃকের মধ্যে ঠাণ্ডা বাতাস প্রবেশ করিলে এবং সন্ধ্যার সময়, বিছানায় শয়ন করিলে বাহার বৃদ্ধি হয় (কোনায়াম্, ডিসিরা, হায়োস্, মেজিরিয়াম্, নাক্স্-বন্, পাল্‌স্) ; কঠনালীতে এবং বক্ষস্থির নীচে টাটানি ও ছাল উঠিয়া বাও-য়ার ভয় অমুক্ত হয় (আম্‌ন, আমোনিয়া, ফন্, রাস্‌টজ্) ; উভয় ফুফুদের সম্মুখ ভাগে কন্‌কনানি ; বৃকের বাম পার্শ্বে হৃৎপিণ্ডের নিকটবর্তী স্থানে হৃৎপিণ্ডের ভয় জালায়ুত এবং হৃৎপিণ্ডের ভয় প্রথর বেদনা ; দীর্ঘ-নিশ্বাসে, এবং রাত্রিতে বিছানায় শয়ন করিলে, বাহার বৃদ্ধি হয় ; বৃকের বাতরোগ (ব্রাই) ।

অঙ্গ, প্রত্যঙ্গ । পাঁজ ওঁচুর লাল বা গোলাপী রঙের ঘন ঘন ফুসুড়ী ।

চর্ম । শরীরের স্থানে স্থানে চুলকানি (প্রাক্, রাস্‌টক্স, সাল্‌ফ্‌), নিম্নাঙ্গে বা গায়ের কাপড় ফেলিয়া দিলেই বাহা অধিক অস্বস্তিত হয়; গায় হুল ফুটান বা কাঁটা বিধানের ভায় চুলকানি বা কুট্‌কুটানী; গায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কোঁকর ভায় ফুস্‌ফুসী; গায়ের কাপড় ফেলিলে বা গায় ঠাণ্ডা বাতাস লাগিলে শরীর চুলকায় ।

ব্যবহার । অনবরত কঠিনালী এবং বায়ুনলীয় প্রান্তিজনক প্রবল কাশি, বাহাতে গলাদিয়া কোন প্রকারের স্লেয়াই নির্গত হয় না, গলায় চাপ পড়িলে, কথা বলিলে, ঠাণ্ডা বাতাস টানিলে যাহার বৃদ্ধি হয়; প্রাতঃ-কালীয় উদরাময়; শরীর চুলকানি ইত্যাদি অস্থখে ক্রমেচ্ছ ব্যবহার্য্য ।

সমগুণবিশিষ্ট ভেষধ । ডাক্তার ক্যারল্‌ ডান্‌হাম্‌ (Dr. Carroll Dunham) বলেন যে, শ্বাসযন্ত্রে ক্রমেচ্ছের কার্য্য ল্যাকেসিস্‌, বেলাডোনা, কষ্টিকাম্‌ এবং ফক্‌রাসের ভায় । শ্বাস যন্ত্রের উপর ইহার কার্য্যের সঙ্গে স্পঞ্জিয়ারও অনেক সাদৃশ্য আছে । প্রাতঃকালে উদরাময় সম্বন্ধে ইহার কার্য্য অনেকটা এপিস্‌, স্ক্রুফ, পডোফিলাম্‌ এবং সাল্‌ফারের ভায় । এতদ্বিন্ন ইহার কার্য্যের সঙ্গে হিপার সাল্‌ফারের কার্য্যেরও সাদৃশ্য আছে ।

ডাইলুশন বিচার । ৬, ১২ এবং ৩০ ডাইলুশনই ব্যবহার্য্য ।

রুটা গ্রাবিয়োলেন্স্‌,-রুটা

(RUTA GRAVEOLENS,-RUTA.)

এই গাছ কাঁচা অবস্থায় সংগ্রহ করিয়া যথানিয়মে প্রক্‌ স্পিরিটে ভিজ্‌য়া ইয়া ইহার মূল আরোক প্রস্তুত হইয়া থাকে ।

সাধারণ ক্রিয়া । অস্থির আবরক কঠিন পর্দা (Periosteum), অস্থি সন্ধি এবং উপস্থির উপর ইহার কার্য্য অত্যন্ত প্রবল, যাহার দরুণ উক্ত অংগে বাতরোগের লক্ষণাদি প্রকাশ পাইয়া থাকে । চক্ষুর উপরও প্রায় উক্ত প্রকারের কার্য্য দেখিতে পাওয়া যায় । স্ত্রীলোকের জরায়ুর উপরও ইহার কার্য্য অত্যন্ত প্রবল । ইহা জরায়তে রক্তাশিক্য এবং জরায়ুর পৈশিক

অংশের সঙ্কোচন উৎপাদন করে। অতএব ইহা জরায়ু হইতে রক্তস্রাব এবং গর্ভস্রাব নিবারণ করে।

সাধারণ প্রাকৃতিক লক্ষণ।

মস্তক। মাথার দণ্ডপিয়া বা চাপিয়া ধরার জায় বেদনা : কপালের হাড় স্ট্রী বিধান বা কুসিয়া ধরার জায় যাতনা। যাহা কর্ণের পশ্চাৎ ভাগের হাড় পর্য্যন্ত ও বিস্তৃত হয়; মাথার হাড়ের আনয়ক কঠিন পর্দা। খেঁংগিয়া যাওয়া বা মোচড়াইয়া পড়ার জায় বেদনা, যাহা কর্ণের পশ্চাৎ ভাগের হাড় হইতে মাথার পশ্চাৎভাগের হাড় পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়।

চক্ষু। রগড়াইলে নাসিকার নিকটবর্তী চক্ষুর কোণে এবং চক্ষুর নিম্ন পাতায় জ্বালা এবং চিক্রিকমারি; চক্ষু জলপূর্ণ; চক্ষুর নিম্ন পাতায় গিলধরা এবং তৎপর চক্ষু দিয়া প্রচুর পরিমাণে জল পড়া; চক্ষে জ্বালা এবং কন্কনানী; চক্ষে ঝাপসা দেখা; অনেককণ ধরিয়া অত্যন্ত মনোযোগের সহিত পুস্তকাদি পাঠ বা সরু কাপড়াদি সেলাই করার পর বা অত্র কোন প্রকারে চক্ষুর অতিরিক্ত ব্যবহারের পর চক্ষে উক্ত প্রকার দেখা, সন্ধ্যার সময়ই যাহা অধিক অন্তর্ভূত হয় (মিরিকা, নেট্রাম্, আস্, নেট্রাম্-মিউর, দিপিয়া, ফস)।

পাকস্থলী এবং উদর। বারম্বার গন্ধহীন উদগার উঠা; পাকস্থলীতে জ্বালা বা চর্কনবৎ যাতনা। যকৃত প্রদেশে চাপিয়া ধরার জায় বা চর্কনবৎ বেদনা।

শ্বাসযন্ত্র। শ্বাসরোধক কাশি, যাহার দরুণ রাত্রি দুই প্রহরের সময় ঘুমভাঙ্গিয়া যায়; বক্ষাঙ্ঘিতে চাপাবোধ; বুকে চর্কনবৎ বেদনা।

গুহু এবং গুহুদ্বার। প্রস্রাব করার সময় গুহের মধ্যে ছিঁড়িয়া ফেলা বা স্ট্রী বিধানের জায় বেদনা, বারম্বার বেগ দেওয়া বা কৌথপাড়া, কিন্তু বেগ দিলে মল নির্গত হয় না এবং গুহদ্বার বাহির হইয়া পড়ে; মলত্যাগ করার চেষ্টা করিলেই গুহু বাহির হইয়া পড়ে।

মূত্রযন্ত্র। মূত্র পরিপূর্ণ থাকিলে যেরূপ হয়, মূত্রাধাবে সেক্রণ পূর্ববোধ এবং তদরূপ বারম্বার মূত্র ত্যাগের ইচ্ছা ও মনে হয় যেন তক্ষণই

অসাড়ে মূত্র নির্গত হইবে, অথচ বেগ দিলে অতি সামান্য পরিমাণ মূত্র নির্গত হয় ।

জননেন্দ্রিয় । ক্রীণোকের জারায় হইতে অতিরিক্ত রক্তস্রাব ।

গ্রীবা এবং পৃষ্ঠদেশ । থেঁতলিয়া গেলে বা মোচড়াইয়া পড়িলে যেরূপ হয়, ঘাড় এবং স্বন্ধে সেরূপ বেদনা; পৃষ্ঠদেশে বেদনা এবং মেরুদণ্ডে অত্যন্ত দুর্বল বোধ; থেঁতলিয়া গেলে বা মোচড়াইয়া পড়িলে যেরূপ হয়, পৃষ্ঠদেশ এবং গুহ্বারের ঠিক উপরিভাগে সেরূপ বেদনা; মেরুদণ্ডের মধ্য দিয়া নিম্ন দিকে শীতল বোধ ।

অঙ্গ, প্রত্যঙ্গ । মারিলে, পড়িয়া গেলে বা আঘাত লাগিলে যেরূপ হয়, অঙ্গ, প্রত্যঙ্গ, সন্ধি এবং হাড় সেরূপ বেদনা (আর্গিকা); স্থানজষ্ট হইলে বা থেঁতলিয়া গেলে যেরূপ হয়, পায়ের পাতার পঙ্কিতে সেরূপ বেদনা; পায়ের হাড় বেদনা, যাহার দক্ষণ সজোরে চলিবার ক্ষমতা থাকে না ।

নিদ্রা । দিনের বেলা নিদ্রাবেশ এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে গা ভাঙ্গিয়া রাত্রিতে বারম্বার ঘুম ভাঙ্গিয়া যায়; ঘুমেরঘোরে এলোমেলো স্বপ্ন দেখা ।

চর্ম্ম । সমুদয় শরীরে চুলকানি (গ্রাফ, রাস্-টক্স), চুলকাইলে যাহার উপশম হয় (সাল্ফ) ।

ব্যবহার । থেঁতলিয়া যাওয়া, মোচড়াইয়া পড়া বা অন্তকোন প্রকারের আঘাতজনিত অস্থি বা অস্থির আবরক কঠিন পর্দার (Periosteum) অজ্ঞপ্ত; অস্থির আবরক কঠিন পর্দার প্রদাহ (Periostitis); বাতরোগ; চক্ষুর অতিরিক্ত ব্যবহার জনিত চক্ষুরোগ বা দৃষ্টিহীনতা; (Asthenopia); জরায়ু হইতে অতিরিক্ত রক্তস্রাব; গর্ভস্রাব; অতিরিক্ত রক্তস্রাব; অস্থি, অস্থির আবরক কঠিন পর্দা এবং উপস্থিতে থেঁতলিয়া যাওয়া বা মোচড়াইয়া পড়ার ভ্রান্ত বেদনা; গুহ্ব বাহির হইয়া পড়া (Prolapsus ani); কোষ্ঠবদ্ধ এবং মলত্যাগের সময় গুহ্ব বাহির হইয়া পড়া ইত্যাদিতে ঋটা ব্যবহার্য্য ।

বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ । চলিয়া বেড়ানোর পর অত্যন্ত দুর্বল বোধ এবং থেঁতলিয়া গেলে বা মোচড়াইয়া পড়িলে যেরূপ হয়, অঙ্গ প্রত্যঙ্গে সেরূপ ব্যতনা (আর্গিকা); কোমরের পশ্চাৎভাগ এবং কোমরে বেদনা; যে পাশে শয়ন করা যায়, সে পাশের সমুদয় অংশই মোচড়াইয়া পড়া বা

থের্মিয়া বাওয়ার ভায় বেদনা (আর্বিকা, ব্যাপ্ট্); বিশ্রামকালীন, বসিয়া, থাকা কালীন; ঠাণ্ডাতে এবং আর্দ্র বায়ুতে অস্থির বৃদ্ধি ও নড়া চড়াতে অস্থির উপশম ইত্যাদি কুটার বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ।

সমগুণ বিশিষ্ট ঔষধ । জরায়ুর উপর কুটার কার্য ক্রোকাণ্ এবং সাবাইনার ভায়। অস্থির সন্ধি এবং শরীরের নানা অংশ পরিচালনার সহায়কারী যন্ত্রের উপর ইহার কার্য অনেকটা মেজেরিয়াম্ এবং ফাইটোলা-কার ভায়; চক্ষুর উপর ইহার কার্য অনেকটা ইউফ্রেসিয়ার কার্যের ভায়। এতদ্ভিন্ন কোন কোন বিষয়ে ইহার কার্যের সঙ্গে আমোনিয়াম্ কার্বোনি-কাম, আর্বিকা, ট্রাইওনিয়া, ক্যালকেরিয়া কার্ব্, লাইকোপডিয়াম্, মার্কিউরিয়াস্, ফসফরিক্ অ্যাসিড্, পাল্‌সেটিলা, রাস্-টজ্, সিপিয়া, সাইলি-সিয়া এবং সাল্‌ফারের কার্যের সাদৃশ্য আছে।

প্রতিষেধক ঔষধ । ক্যাম্ফার।

ডাইলুশন বিচার । হানিমান ২য় ডাইলুশন ব্যবহার করিতেন। এই ঔষধের ৩য় এবং ৬ষ্ঠ দশমিক ডাইলুশনই লেখক সচরাচর ব্যবহার করিয়াই যথোচিত ফল পাইয়া থাকেন। কোন কোন চিকিৎসক ২২ এবং ৩০ ক্রমও ব্যবহার করিয়া থাকেন।

সাবাইনা, -সাবাইন

(SABINA, -SABIN.)

এই গাছের কাঁচা পাতা এবং কুড়িঃ অগ্রভাগ যথানিয়মে ৪০° ডিগ্রী ওভার ফ্রক্‌স্পিরিটে ভিজাইয়া মূল আরোক প্রস্তুত হইয়া থাকে।

সাধারণ ক্রিয়া । ইহা প্রধানতঃ জীলোকের জননেন্দ্রিয়ই অধিক আক্রমণ করিয়া থাকে। ইহা মূত্রযন্ত্র, পাকস্থলী এবং অন্ত্রও স্পষ্টরূপে আক্রমণ করিয়া থাকে, যাহার দরুণ উক্ত যন্ত্রাদি উত্তেজিত হইয়া উহাতে রক্তাধিক্য বা রক্তাবরোধ এবং প্রদাহ উৎপন্ন হইয়া, জরায়ু হইতে রক্তস্রাব এবং গর্ভশ্রাব, মূত্রকৃচ্ছ ও ভেদ্র হইয় এবং মলে রক্তমিশ্রিত থাকে।

সাধারণ প্রাকৃতির লক্ষণ ;

মন । সর্বদা আপন বিষয়ে নন্দ চিন্তা করা, মনোমত্ততা বা মনো-রোগ (Hypochondriasis) (নাক্স-বম্) ; মনের অত্যন্ত উদ্বেগ এবং আশঙ্কা (একন্, আর্স) ; বাদ্য অত্যন্ত অসহ্য হয় ।

মস্তক । দাঁড়াইয়া থাকা কালীন মাথাধোরা, বাহ্যিক দরুণ রোগী মনে করে যেন সে টলিয়া পড়িবে এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে চক্ষে অন্ধকার দেখা ; চাপিয়া ধরার ভায়ে মাথা বেদনা যাহা কণের পশ্চাৎ ভাগেই অধিক অনুভূত হয় এবং যাহা হঠাৎ আরম্ভ হয় ও আস্তে আস্তে সারিয়া যায় ; কপালে চাপিয়া ধরার ভায়ে ঘৃণ-ঘৃণে বেদনা ।

নাসিকা । সর্দি এবং নাক দিয়া শুষ্ক শ্লেষ্মা নির্গমন ।

মুখগহ্বর । মুখগহ্বর এবং গলার মধ্যে শুষ্কবোধ (এপিস্, নাক্স-মক্) ; সন্ধ্যার সময় এবং রাত্ৰিতে দাঁতে দপ্-দপিয়া বেদনা ।

পাকস্থলী এবং উদর । টক দ্রব্য খাওয়ার ইচ্ছা (আন্টি-টার্ট্, চায়না, হিপ্-সাল্‌ক্, ফস্, পডোফ্, বিয়েট্-আর্) ; লিমোনেড্ (Lemonade) খাওয়ার অত্যন্ত ইচ্ছা ; বুক জালা এবং উদগার উঠা (নাক্স-বম্, লাইকোপ্) ; উদর হইতে কুচ্কি পর্য্যন্ত কামড়াগ, মোচড়াগ বা প্রসব বেদনার ভায়ে বেদনা ।

মল । রক্তমিশ্রিত শ্লেষ্মা ভেদ, অথবা উদরাময় ।

মূত্রযন্ত্র । বারম্বার মূত্র ত্যাগের প্রবল ইচ্ছা বা বেগ এবং প্রচুর পরিমাণে মূত্র ত্যাগ (এপিস্, আপোসিনাম্, আর্জেন্ট্-মেট্) ; মূত্রাবরোধ ; কোঁটার কোঁটার মূত্র নির্গমন এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে মূত্রনালীতে জালা (বেল্, ক্যান্থ্, ক্যানাবিস্-স্যাট্) ; ক্ষুদ্র সন্ধিবাতে মূত্রনালীর গোড়ায় অত্যন্ত উত্তেজনা ।

জননেদ্রিয় । জীলোকের নিয়মিত সময়ের অনেক পূর্বে অতিরিক্ত আশ্রমে এবং অনেক দিন ধরিয়া রজঃস্রাব (বেল্, ক্যান্থ-কার্ক, ক্যানালী-স্যাট্, নাক্স-বম্) ; পুরুষ সহবাসের অনিবার্য ইচ্ছা এবং জমাগত পুরুষ সহবাসেও উক্ত ইচ্ছা পরিহৃত না হওয়া ; জরায়ু হইতে থাকিয়া থাকিয়া রক্ত-

শ্রাব, নড়াচড়াতে সাহায্য বৃদ্ধি হয় ; কাণ্চে (ক্যালী-নাইট্রিক্), থানা থানা, চাপ চাপ রক্তশ্রাব (ক্রাকশ্) ; জরায়ু শক্তিহীনতা বা জড়তার দৰ্শন রক্তশ্রাব (কলোফিসাম্) ; গর্ভশ্রাব বা সন্তান আসবের পর রক্তশ্রাব এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে পৃষ্ঠদেশ হইতে গুহ্বারের ঠিক উপরিভাগ পর্যন্ত বেদনা ; গর্ভশ্রাব (প্রধানতঃ তৃতীয় মাসে) (সিকেল্) ; গাঢ় হরিদ্রাবর্ণের, দুর্গন্ধযুক্ত শ্বেতপ্রদর নিঃসরণ ; রজঃস্রোধের পর শ্বেতপ্রদর ; ঋতুর সময় রক্তশ্রাব না হইয়া তৎপরিবর্তে শ্বেত প্রদর নিঃসরণ ।

স্বাসযন্ত্র । কোন প্রাণী হামা দিয়া বাইলে যেরূপ হয়, কণ্ঠনালীতে সেরূপ অহুত হয় বা উহাতে স্ফু-হুড়ী, সাহায্য দৰ্শন কাশির উদ্বেগ হয় এবং গলা দিয়া চট্‌চট্‌য়া আঠা স্লেমা নির্গত হয় ; শুষ্ক থু-থু-শে কাশি এবং বায়ু-নলের মধ্যে স্ফু-হুড়ী ; গলা-দিয়া স্লেমার সঙ্গে রক্ত পড়া (একন্, চামনা, ফেরাম্, হামামেলিস্) ; বক্ষাঙ্কিতে চাপিয়া ধরার জ্বাৰ বেদনা, নিশ্বাসে প্রাশাসে সাহায্য হ্রাস বা বৃদ্ধি হয় না ।

প্রীবা এবং পৃষ্ঠদেশ । কোষের পশ্চাৎভাগ হইতে টানিয়া বা কসিয়া ধরার জ্বাৰ বেদনা আরম্ভ হইয়া গুহ্বারের ঠিক উপরিভাগ পর্যন্ত বিস্তৃত হয় ।

অঙ্গ, প্রত্যঙ্গ । অঙ্গ প্রত্যঙ্গে কসিয়া ধরা বা ছিঁড়িয়া ফেলার জ্বাৰ বেদনা, বিশেষতঃ রাত্রিতে, সাহা মণিবন্ধ এবং পায়ের আঙ্গুলেই অধিক অহুত হয় ও আক্রান্ত স্থানের উজ্জ্বল লালবর্ণের ক্ষতি ; সন্ধিবাত ; খেঁতলিয়া গেলে বা মোচড়াইয়া পড়িলে যেরূপ হয়, উৎদেশের সমুখ ভাগে সেরূপ বেদনা ।

নিদ্রা । অস্থির এবং ভয় নিদ্রা বা ঘুম ভাল না হওয়া ।

ব্যবহাব । অতিরিক্ত বা প্রচুর রজঃশ্রাব ; জরায়ু হইতে অতিরিক্ত রক্তশ্রাব ; গর্ভশ্রাব, (তৃতীয় মাসে গর্ভশ্রাবের পক্ষে বিশেষ উপকারী) ; শ্বেতপ্রদর ; জরায়ু প্রদাহ ; মুক্তিকা পাণ্ডুরোগ (Chlorosis) ; হিষ্টিরিয়া ; সন্ধিবাতজনিত অস্থখ ; শরীরের স্থানে স্থানে গ্রন্থি জ্বাৰ ক্ষতি ; ডিম্ব-কোষের উত্তেজনা ; গর্ভশ্রাব হওয়ার আশঙ্কা এবং তদ্রূপ কতক তরল এবং কতক চাপ চাপ, থানা থানা রক্তশ্রাব ; রজঃশ্রাবের নির্দিষ্ট সময়ে রক্তশ্রাব

না হইয়া তৎপরিবর্তে প্রচুর শ্বেত প্রদর নিঃসরণ; উদরাময়; রক্তাশাশন ইত্যাদি অসুখে সাবাইনা ব্যবহার্য্য। জীলোকের যোনিদ্বারে বা অরারূর মুখের চতুষ্পার্শ্ববর্তীস্থানে ফুলকফির দ্বারা শৈথিল্য ফোটকে (Condylomata) সাবাইনার বাহুপ্রয়োগে বিশেষ উপকার দর্শে।

বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ। সমুদয় অঙ্গ প্রত্যঙ্গে দুর্বল এবং প্রান্তিবোধ এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে হতাশের ভাব; সমুদয় শরীরে ভারি-বোধ এবং তন্দ্রকণ অনসবোধ ও শয়ন করিয়া থাকার ইচ্ছা; রক্তবহা নালী সমূহে দগ্ধপানি; রক্তস্রাবের নির্দিষ্ট সময়ে রক্তস্রাব না হইয়া তৎপরিবর্তে শ্বেতপ্রদর নিঃসরণ ইত্যাদি সাবাইনার কতকগুলি বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ।

সমগুণবিশিষ্ট ঔষধ। বেলাডোনা, ক্রোকাস, পালসেটিল, ট্রিলিয়াম, আণিকা, ককিউলান, রাস্ট্রজ, সালফার।

প্রতিষেধক ঔষধ। ক্যান্ধার, পালসেটিল।

ডাইলুশন বিচার। ১ম হইতে ৩০ ডাইলুশন ব্যবহার করিয়া অনেক চিকিৎসক বিশেষ ফল পাইয়াছেন এরূপ চিকিৎসা বিবরণ গ্রহণ পাঠ করা যায়। অনেকে ইহার আদত গুঁড়া বা তৈল ব্যবহার করিয়াও বিশেষ ফল পাইয়া থাকেন। লেবক স্বয়ং ৩য় এবং ৬ষ্ঠ দশমিক ক্রমের গুঁড়াই সচরাচর অধিক ব্যবহার করিয়া যথোচিত ফল পাইয়া থাকেন। ডাক্তার হিউজ (Dr. Hughes) বলেন যে, তিনি ২য় এবং ৩য় দশমিক ক্রম ব্যবহার করিয়াই যথোচিত ফল পাইয়া থাকেন। সাবাইনার গুঁড়া, ৫ হইতে ২০ গ্রেট, ২ কাঁচা পরিষ্কার জলে বা ওলিভ অয়েল (Olive-oil) মিশাইয়া বাহু প্রয়োগে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

সাস্কুনেরিয়া ক্যানাডেনসিস, -সাস্কুনের

(SANGUINARIA CANADENSIS, -SANG.)

এই পাছের শিকড় বা শিকড় হইতে যে ডাঁটার দ্বারা শিকড় বাহির হয়, (রিজোম, -Rhizome), তাহা যথানিয়মে প্রদ্র পিপিটে ভিজাইয়া মূল

আরোক প্রস্তুত হইয়া থাকে । সাক্সনেরিগ্ যথামিরমে স্থগার অবস্থিকের সঙ্গে মিশাইয়া ইহার মিশ্র শুঁড়া প্রস্তুত হইয়া থাকে ।

সাধারণ ক্রিয়া । ইহা শ্বাসবস্তুর মৈত্রিক বিলী আক্রমণ করিয়া উহাতে উত্তেজনা এবং শ্লেষ্মা জনিত প্রদাহ উৎপাদন করে । নিউমোগ্যাস্ট্রিক্‌ ন্যায় (Pneumogastric nerve) উপর ইহার কার্য অতি প্রবল । উক্ত ন্যায় দিয়া ইহা বকৃত এবং পরিণাক সম্বন্ধীয় বস্তুর অস্থব উৎপাদন করে ।

সাধারণ প্রাকৃতিক লক্ষণ ।

মস্তক । বসা অবস্থা বা মাথা হেট করিয়া উপুড় হইয়া থাকার অবস্থা হইতে সোজা হইয়া দাঁড়াইলে মাথাঘোরা (ব্রাই); তাড়াতাড়ি মাথা ঘুরাইলে মাথাঘোরা (ক্যাক্-কার্ক), অথবা উপরের দিকে তাকাইলে মাথা ঘোরা (ক্যাক্-কার্ক্, কুপ্রাম্); মাথার রক্তাধিক্য বা রক্তাবরোধ এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে কানে সাঁই সাঁই শব্দ এবং নরমক রক্তের উচ্ছাস্তব (একন্); কপালে চাপিয়া ধরার স্থায় ঘূর্ণবুশে বেদনা (ইউফ্রেস্, মার্ক-কর); মাথাঘরা, থাকিয়া থাকিয়া বাহার আক্রমণ হয় (চায়না); বাঁধা বেদনা মাথার পশ্চাৎভাগ হইতে আরম্ভ হইয়া (বিরেট্-বিরাইড্) উপরের দিকে বিস্তৃত হয় এবং তৎপর ডাইন চক্ষু উপরিভাগে স্থিত হয়; শিরঃপীড়া, বাহার নরুণ মনে হয় যেন মাথা ফাটিয়া বাইবে (ব্রাই, ক্যাম্প্, চায়না, পাল্‌স্, নেট্রাম্-রিউর); কপাল এবং কপালের ছই পার্শ্বে বেদনা, ডাইন অংশে বাহা অধিক অস্থত হয় ও বহির্ক্‌স্থে বাহার উপশম হয় (পাল্‌স্, সিগিয়া); শিরঃপীড়া, উহার সঙ্গে সঙ্গে বমনোদ্বগ এবং শীতবোধ ও তৎপর নরমক উচ্ছাস্তব, বাহা মাথা হইতে পাকস্থলী পর্যন্ত বিস্তৃত হয় ।

চক্ষু । চক্ষুরতারা বিস্তৃত (এইলাস্, বেগ্, সিকুটা, হায়োস্); চক্ষে আগার সহিত শুষ্কতা এবং তৎপর চক্ষু দিয়া প্রচুর জল পড়া (আর্স্, ইউফ্রেস্) ।

কর্ণ । কানে জালামুত্তব; গাল লালবর্ণ; কর্ণশূল এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে কানের মধ্যে জল ফুটানের স্থায় বেদনা এবং মাথাঘোরা ।

নাসিকা । সর্দি এবং তদ্রূপ নাক দিয়া প্রচুর পরিমাণে জলবৎ-

ভরল শ্বেয়া নির্গমন (একন, আস', সিপা, জেনন্স, আইরিস্, কমেস) বাহী ডাইন নাসার ক্ষেই অধিক হয় ।

মুখমণ্ডল । এক বা উভয় গালের স্থানে স্থানে চক্রাকারে লালবর্ণ হওয়া (ফ্রিয়াজ্); বিকারের লক্ষণাক্রান্ত ফুফুস প্রদাহে (Typhoid Pneumonia) গাল নীলবর্ণ হওয়া ; মুখমণ্ডল শিটা এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে বমন ; ওষ্ঠে শুষ্কবোধ ; উপরের মাড়িতে ত্রিমুশ্ণের ত্রায় বেদনা, যাহা নাক, চক্ষু, কান, গ্রীবা এবং মাথার একপার্শ্ব পর্য্যন্তও বিস্তৃত হয় ; আক্রান্ত স্থানে ঘোঁচাধিবার ত্রায় বা জ্বালাযুক্ত বেদনা, যাহার দরুণ রোগী মেজাজেতে হাঁটু গাড়িয়া মাথা কসিয়া ধরিয়া থাকিতে বাধ্য হয় ।

মুখগহ্বর এবং গলার মধ্য । মুখে স্বাদ শূন্যতা এবং পুড়িয়া বোলে যেরূপ হয়, জিহ্বায় সেরূপ অম্লভূত হওয়া (পাল্‌স্) ; মাড়ি এবং তালু-কাতে ক্ষত । গিলিবার সময় মনে হয় যেন গলা অভ্যন্ত ভুগিয়াছে এবং যাহার দরুণ স্বাস্রোধ হওয়ার উপক্রম হয় ; গলার মধ্যে শুষ্কবোধ, জ্বলাদি পান করিলেও যাহার উপশম হয় না ; ছাল উঠিয়া গেলে যেরূপ হয়, গলার মধ্যে সেরূপ জ্বালা এবং টাটানি (এরাম্, আর্জেণ্ট্-নাইট্‌ক্) ; গলার মধ্যে ক্ষত সম্বলিত টাটানি (হাইড্রাট্‌, মার্ক্‌, নাইট্‌ক্-আস্, ফাইটোল্) ; তালুকা এবং মুখগহ্বরের পশ্চাৎভাগ সাগুদানার ত্রায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ক্ষেটিক দ্বারা আবৃত ।

পাকস্থলী । কি খাটতে যে ইচ্ছা যায় তাহা বোগী স্থির করিতে পারে না ; মসলাযুক্ত দ্রব্যাদি খাওয়ার ইচ্ছা (ফন্) ; ভয়ানক বমনোদ্যোগ, থাকিয়া থাকিয়া বাহার উদ্রেক হয় (মাস্টি-টাট্) এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে মুখে প্রচুর লাল উঠা, মাথাধরা, শীত এবং উষ্ণামৃতব ; বমনোদ্যোগ, বমন দ্বারাও বাহার উপশম হয় না ; তিক্ত জল বমন ; টক, জ্বালা উৎপাদক, উগ্র জলবৎ টক পদার্থ বমন ; উদরস্থ আহার দ্রব্যাদি বমন (ইপিকাক্, ফন্, বিরেট্-আল্) ; কৃমি বমন (একন) ; পাকস্থলীতে খালি খালিবোধ এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে মুচ্ছার ভাব বা অবসন্নতা ও অরভাব ; উদরোচ্চ প্রদেশে চাপা বোধ এবং টাটানি, আহারের পর যাহার বৃদ্ধি হয় ; পাকস্থলীতে জ্বালা (আস', ক্যাস্, আইরিস্, বিরেট-আল্‌ব্) ।

মল । উদরাময়ের স্থায়ী তবলভেদ এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে গুরুদ্বার দিয়া প্রচুর দূষিত বায়ু নিঃসরণ (আলোজ্) ; সন্ধির পর উদরাময় ; বৃক্কে বেদনা এবং কাশি ।

মূত্রযন্ত্র । রাত্রিতে প্রচুর পরিমাণে বাবদ্বার, জলের স্থায়ী পরিষ্কার মূত্রত্যাগ (নেট্রাম্-মিউর, ফস্-আস্) ।

জননেন্দ্রিয় । স্ত্রীলোকের শেষ বজরোরোধের সময় অসুখ, বিশেষতঃ বারদ্বার দমকা উচ্চাভুতব এবং শ্বেত প্রদর নিঃসরণ (গ্যাক্) ; তলপেটে বেদনা, বাহ্যিক দরুণ মনে হয় যেন বজঃপ্রাণ আবিষ্ট হইবে (আলোজ্, কলোফিগাম্, সিমিসিক্, পান্দ্) ; জরায়ুব মুখ ক্ষতগুক্ত ; হর্গন্ধযুক্ত ক্ষতকারক শ্বেত প্রদর নিঃসরণ ; উভয় স্তনের বোটারই স্রাবী বিধানের স্থায়ী ঘটনা ; স্তনের বোটার টাটানি ।

শ্বাসযন্ত্র । গলার মধ্যের গভীরতম অংশে স্ফুটন দরুণ গুরু শ্বশ্বশ্বে কাশি (হিপ্-সাল্ফ্, ফস্, কমেজ্, সিমিয়া) এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে গলার মধ্যে শুকবোধ ; বক্ষাহির পশ্চাৎভাগে কোন প্রাণী হান্না দিয়া বাহ্যেতেছে একরূপ অস্বস্তি হয় ; শুককাশি, বাহ্যিক দরুণ ঘুম ভাঙ্গিয়া যায় এক বিছানায় সোজা হইয়া না বসিলে বা গুরুদ্বারদ্বারা ও উদগার দ্বারা দূষিত বায়ু নিঃসৃত না হইলে বাহ্যিক উপশমন হয় না ; কাশি এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে গালের স্থানে স্থানে চক্রাকারের লাল দাগ পড়া ; বৃক্কে বেদনা, সন্ধি এবং তদ্রুপ নাক দিয়া স্রোতা নির্গমন ; অত্যন্ত শ্বাসকষ্ট এবং বৃক্কে আঁটারোধ ও তদ্রুপ দার্বনিশ্বাস টানবার ইচ্ছা ; বৃকের উপরিভাগে অনবরত চাপা এবং ভারিবোধ ও উহা সঙ্গে সঙ্গে শ্বাসকষ্ট ; বক্ষাহির এবং ডাইন স্তনের বোটার মধ্যবর্তী স্থানে তীক্ষ্ণ, চিন্তিনে বেদনা ; বক্ষাহির নীচে এবং বৃকের ডাইন পার্শ্বে প্রবল বেদনা ও জ্বালা ; বৃকের ডাইন পার্শ্বে, স্তনের বোটার নিকটবর্তী স্থানে স্রাবীবিধানের স্থায়ী অত্যন্ত ঘটনা ; বক্ষা-কাশির ভোগ কালীন গলা দিয়া রক্ত উঠা ; গলা দিয়া কঠিন এবং মরিচার রক্তবিশিষ্ট স্রোতা নির্গমন (Rusty Sputa) ; অত্যন্ত শ্বাসকষ্ট ; কুক্ষ্ম প্রদাহ এবং কুক্ষ্ম যকৃতবৎ হওয়া (Hemitized) ; বৃকের ডাইন পার্শ্ব হইতে রক্ত পৃথক বেদনা, বাহ্যিক দরুণ স্রাবী কষ্টে রোগী মাথার তালিতে হাত রাখিতে

পারে ; খাস প্রাশাসে অত্যন্ত দুৰ্গন্ধ (ক্যাম্প, ক্রোকাশ) ; গলাদিয়া অত্যন্ত দুৰ্গন্ধযুক্ত শ্লেষ্মা নির্গমন ।

হুংপিণ্ড এবং নাড়ী । হুংপিণ্ড এবং নাড়ী অনিয়মিতরূপে স্পন্দন করে এবং উহাৰ সঙ্গে সঙ্গে সমুদয় শব্দে ঠাণ্ডা হয় এবং জ্ঞান থাকে না ।

গ্রীবা এবং পৃষ্ঠদেশ । ঘাড়, কঁক এবং বাহ্যে বাতের বেদনা ।

জ্বর । শরীরে আলায়ুক্ত উষ্ণানুভব এবং উহাৰ সঙ্গে সঙ্গে পর্যায়ক্রমে শীত এবং কম্প ; উষ্ণতা যেন মাথা হইতে পাকস্থলীতে বিস্তৃত হয় ; গায় দমকা উষ্ণানুভব ; গা দিয়া উত্তাপ যেন বাষ্পের ভাষ বাহির হয় বলিয়া অনুভূত হয় (ক্যাক্-কার্ক) ।

ব্যবহার । সর্দি ; ঘুংড়ী কাশি ; হুংপি কফ বা কাশি ; হাঁপানি কাশি ; ফুফুস-প্রদাহ ; বিকারের লক্ষণাক্রান্ত ফুফুস-প্রদাহ (Typhoid Pneumonia) ; গলাদিয়া ফুফুস হইতে রক্ত উঠা ; বক্ষশোথ (Hydrothorax) ; ফুফুস সঞ্চকীয় বক্ষাকাশ (Pulmonary Consumption) ; কামল রোগ ; উদরাময় ; বাতরোগ ; বমন সম্বলিত শিরঃপীড়া (Sick-headache) ; অজীর্ণরোগ ; রক্ত, পূর্ব ইত্যাদি নিঃসরণহেতু জ্বর বা হেক্টিক ফিবার (Hectic Fever) ইত্যাদি অল্পে সাঙ্গুনেরিয়া ব্যবহার্য্য । ডাক্তার জুসেট্ (Dr. Jousset) বলেন যে, যে প্রকার আধকপালিয়া মাথা ব্যাথা (Hemicrania) শয়ন করিয়া থাকিলে বা ঘুমাইলে উপশম হয় এবং বাহ্যর সঙ্গে সঙ্গে পিত্ত বমন, দস্তশূল, কর্ণশূল, অঙ্গ প্রত্যঙ্গে বেদনা, মাথায় যেন বিদ্যুতের ভাষ ধাক্কা লাগে এবং শীতকম্প হয়, তাহাতে এই ঔষধ বিশেষ উপকারী । যে প্রকার আধকপালিয়া মাথাব্যথা রজঃস্রাবের সময় (বিশেষতঃ বাহাদের অতিরিক্ত রজঃস্রাব হয়) হয়, তাহাতেই সাঙ্গুনেরিয়া অধিক উপকারী । ডাক্তার মিল্‌স্ (Dr. Mills) বলেন যে, যে প্রকার শিরঃপীড়া সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে আরম্ভ হইয়া দুই প্রহরের সময় অত্যন্ত বৃদ্ধি হয় এবং সূর্য্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গে কমিয়া যায়, সেপ্রকার শিরঃপীড়ার এই ঔষধ বিশেষ উপকারী । ডাক্তার হেরিংও (Dr. Hering) উক্ত মতের পোষকতা করেন । ডাক্তার মিল্‌স্ আরো বলেন যে, উক্ত প্রকারের মাথা ব্যাথা আরম্ভ হওয়ার পূর্বে মূত্রের পরিমাণ অত্যন্ত কমিয়া যাওয়া এবং প্রচুর

পরিমাণে মূত্র নিঃসরণের পর মাথাব্যথা সারিয়া যাওয়া এই ঔষধ ব্যবহারের একটি বিশেষ প্রাকৃতিক নির্দিষ্ট লক্ষণ মধ্যে পরিগণিত। তাঁহার মতে স্ত্রীলোকের শেষ রক্তঃরোধের সময় উক্ত অস্থি ইহা বিশেষ উপকারী।

বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ। অত্যন্ত দুর্বলতা এবং বলক্ষয়; সমুদ্র শরীরের জড়তা এবং অলসবোধ; উষ্ণতা যেন মাথা হইতে পাকস্থলীতে বিস্তৃত হয়; উষ্ণ জল ঢালিয়া দিলে ঘেঁকণ হয়, বুক বা স্তন হইতে উদরে সেকণ অস্থিত হয়; সমুদ্র শব্দে কুটুকাণি এবং উৎফুল্লত্ব; প্রাতঃকাল এবং সন্ধ্যার সময়, আলোকে, গোলমালে ও নড়াচড়াতে অস্থির বৃদ্ধি এবং নিস্তব্ধভাবে শয়ন করিয়া থাকিলে, অন্ধকার ঘরে ও বমনের পর অস্থির উপশম ইত্যাদি সান্থনেরিয়ার কতকগুলি বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ।

সমগুণবিশিষ্ট ঔষধ। ডাক্তার হেলের (Dr. Halo) মতে সান্থ-নেব্রিয়ার কার্যের সঙ্গে কক্ষরাসের কার্যের বিশেষ সাদৃশ্য আছে। ডাক্তার হিউজ্ (Dr. Hughes) বলেন যে, সিলার (Scilla) কার্যের সঙ্গেই অস্ত্রাশ্র ঔষধ অপেক্ষা সান্থনেব্রিয়ার কার্যের অধিক সাদৃশ্য আছে। এতদ্বিন্ন ইহার কার্যের সঙ্গে আন্টিমোনিয়াম্ টার্টারিকাম্, বেলাডোনা, ব্রাইকনিয়া, চেলিডোনিয়াম্, হিপার সাল্ফিউরিস্, আইরিস্, মাকিউরিয়াম্, কমেঞ্জ্, স্পঞ্জিয়ার কার্যের সাদৃশ্য আছে।

প্রতিষেধক ঔষধ। ওপিয়াম্, রাস্ রাডিকাল্ ।

ডাইলুশন বিচার। ৩য়, ৬ষ্ঠ, ১২ এবং ৩০ ডাইলুশন সচরাচর ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ডাক্তার জুসেটের (Dr. Jousset) মতে মাথাব্যথা ১২ এবং ৩০ ডাইলুশন অধিক উপকারী।

স্যান্টোনাইন্,-স্যান্টোন

(SANTONINE, SANTON.)

কোন এক বিখ্যস্ত হোমিওপ্যাথিক ঔষধালয় হইতে আদত স্যান্টোনাইন্ ক্রয় কবিতা বণানিয়মে অঁগাব অব্ মিকের সঙ্গে মিশাইয়া ইহার মিশ্র গুঁড়া প্রস্তুত হইয়া থাকে।

সাধারণ ক্রিয়া । ইহাৰ কাৰ্য্য অনেকটা সিনাৰ (Cina) কাৰ্য্যের
 তায়। কিন্তু ইহা স্বতন্ত্ৰৰূপে ব্যবহার কৰিলে ইহাৰ কাৰ্য্য বিশেষ স্পষ্টৰূপে
 দেখিতে পাওৱা যায়। ইহা সেবনে অসাড় বা অনিচ্ছাপূৰ্ব্বক মূৰ্ছা নিৰ্গত হয়।
 অতএব মূত্ৰধাৰণে অশক্তি হইলে ইহা (বিশেষতঃ শিশু বা ছোট বালক, বালি-
 কাগণের অল্প কুম্মী থাকার দরুন হইলে) বিশেষ উপকাৰী। চক্ষুর উপরও
 ইহাৰ কাৰ্য্য অতি প্ৰবল। প্ৰথমতঃ চক্ষে কোনও বস্তু দেখিতে পাওৱা যায়
 না; দ্বিতীয়তঃ রক্ত চিনিতে গোলমেলে বোধ হয়। অতএব চক্ষুর যে প্ৰকাৰ
 অন্ধুথে চক্ষে রক্ত সম্বন্ধে উক্ত প্ৰকাৰেব গোলযোগ দেখিতে পাওৱা যায়,
 তাহাতে স্যাণ্টোনাইন্ বাবহাৰ্য্য। মস্তিষ্কৰ উপরও ইহাৰ কাৰ্য্য অতি
 প্ৰবল। কাৰণ, কুম্মী বিনাশ কৰিব জন্ত শিশু বা ছোট বালক নালিকাদিগকে
 অধিক মাত্ৰায় স্যাণ্টোনাইন্ সেবন কৰাইলে তাহাৰ্ম্মিগণেৰ আক্ষেপ হইতে
 দেখা যায়। ইহা চক্ষুৰ কোৰোয়েডাইটিস্ (Choroiditis), রেটিনাইটিস্
 (Retinitis), দুষ্টিহীনতা, চক্ষে ছানি পড়া (Cataract) এবং চক্ষুৰ
 কণ্ঠিৰ অস্বচ্ছতাৰ (Opacity of the Cornea) পক্ষে বিশেষ উপকাৰী।
 চক্ষুৰ আইৰিচ প্ৰদাহও (Iritis) উপকাৰী। চক্ষুৰ উপৰ ইহাৰ কাৰ্য্যের
 সৰ্ব্ব আট্টোপিয়া এবং ডিছটালিয়েব অনেক সাদৃশ্য আছে। ১ম হইতে ৩য়
 দশমিক ক্ৰমেৰ শু'ডাই সচাৰ্চৰ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। (৪৩১ পৃষ্ঠাৰ সিনা
 (Cina) নামক ঔষধেৰ বিৱৰণ দেখ্য)।

সারাসেনিয়া পাপু'ৰিয়া,-সারাসেন্

(SARRACENIA PURPUREA.-SARRACEN)

এই গাছের সমুদয় অংশ যথা নিম্নে উক্ত পৰিকার জলে ভিজাইয়া ইহাৰ
 ইন্ফিউশন্ (Infusion) বা কাত, অথবা শুকনা গাছের সমুদয় অংশ যথা-
 নিম্নে সুগাৰ অব'নিকে দিশাইয়া ইহাৰ মিঞ্জা'ণ্ডা এং ইহাৰ শিকড় দ্বাৰা
 মূল আৰোক প্ৰস্তুত হইয়া থাকে।

সাধারণ ক্রিয়া । অল্প কএক বৎসৰ হইতে ইহা আমেৰিকাতে
 বসন্ত ৰোগেৰ চিকিৎসাৰ ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। বসন্ত ৰোগেৰ

চিকিৎসায় ইহা এক বিশেষ উপকারী ঔষধ বলিয়া ইংলণ্ড এবং আমেরিকা-য় চিকিৎসকগণ প্রশংসা করিয়াছেন। ইহা সেবনে প্রথম ফুসুড়ী গুলি বিকাশ প্রাপ্ত হইয়া প্রকাশ পায় এবং গুটিগুলিতে অতিরিক্ত পরিমাণে পুঁথ উৎপাদন নিবারিত হয়। স্ফু শরীরে সেবনে ইহা দ্বারা অরুচি এবং উদার সঙ্গে সঙ্গে অস্থিতে বেদনা এবং অরু প্রত্যঙ্গে টাটানি ইত্যাদি কতকগুলি বসন্ত বোগের লক্ষণাদি প্রকাশ পাইয়া থাকে। অতএব বসন্ত রোগে এই ঔষধ উপকারী। ইহার ১ম দশমিক হইতে ৩য় শততমিক ক্রমের গুঁড়া বা আরোক ব্যবহার্য।

সার্সাপেরিলা, -সার্সা

(SARSAPARILLA, -SARSA.)

জেমেকাতে এই গাছ জন্মে। ইহার শুকনা শিকড় যথানিয়মে প্রফু-
স্পিরিটে ভিজাইয়া মূল আদোক প্রস্তুত হইয়া থাকে।

সাধারণ ক্রিয়া। রক্তের উপর ইহার কার্য অতি প্রবল। ইহা রক্তকে দূষিত করে এবং তদ্বর্ণ গায় দাঁদের স্থায় চক্রাকারের ও অস্থায় রক্তের ফুসুড়ী প্রকাশ পায়। মূত্র যন্ত্রের উপরও ইহার বিশেষ কার্য আছে, যাহার দরুণ মূত্রাধারাদিতে পাথরীর (Gravel) লক্ষণাদি প্রকাশ পায়। অতএব উক্ত রোগে সার্সাপেরিলা এক অত্যন্ত উপকারী ঔষধ মধ্যে পরিগণিত।

সাধারণ প্রাকৃতিক লক্ষণ।

মন। যাতনাদির সঙ্গে সঙ্গে এবং ধাতু নিঃসরণের পূর্ব মনের উদ্বেগ।

মস্তক। মাথায় ভারি বোঝ; মাথার বাম পার্শ্বে চাপিয়া ধরা বা স্থচীবিধানের স্থায় যাতনা; মাথায দপ্পদিয়া বেদনা।

চক্ষু। চক্ষুর মধ্যে খোঁচাবিধার স্থায় বেদনা; চক্ষুর সম্মুখে কৃয়াশা থাকিলে বেক্রপ হয়, চক্ষে সেক্রপ বাপ্পা দেখা (কেই, ফস, রানান্-কুলাস, পাল্‌ফ)।

মুখমণ্ডল । মুখমণ্ডলে ফুস্ফুড়ী ; তনুহৃৎপোষ্য শিশুগণের মুখে ফুস্ফুড়ীর (Milk-crust) ভ্রায় ফুস্ফুড়ী (বায়োলা ট্রিকালার) ; মাড়ির সন্ধি এবং উহার সঞ্চালনের সহায়কারী পেশীতে শব্দ এবং আঁটা বোধ ।

মুখগহ্বর । প্রাতঃকালে মুখে তিক্তস্বাদ (ব্রাউ, নাক্স-বন্. পাল্‌স্) ।

পাকস্থলী এবং উদর । আহারের পর তিক্ত উদগার উঠা । উদরে গড়্‌গড়্‌, কল কল শব্দ হওয়া এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে উদরে খালি-বোধ, উদরের বাম পার্শ্বে সূচীবিধানের ভ্রায় বাতনা ।

মল । মল অতি কষ্টে নির্গত হয়, বাহার দ্রবণ অভ্যস্ত বাতনার উদ্রেক হয় ।

মূত্রযন্ত্র । বারম্বার প্রস্রাব করার ইচ্ছা এবং একবারে অতি কম পরিমাণে মূত্র নির্গত হওয়া ও উহার সঙ্গে সঙ্গে মূত্র নালীতে অভ্যস্ত জ্বালা বোধ (একন্, ক্যাস্) ; দিবা রাত্রি বারম্বার প্রচুব পরিমাণে ফিকা মূত্র নিঃসরণ (এপিস্, আপোসিনাম্, বার্সেকান্) ; মূত্রে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাথরী (Gravel) থাকে ; মূত্র কাদার জলের ভ্রায় ঘোলাটিয়া ; মূত্র ভাগ সমাপ্ত হওয়া হওয়া সময়ে অভ্যস্ত বাতনা ।

স্বাসযন্ত্র । বৃক্কে আক্কেপিক ব্রকমের বাতনা ।

পৃষ্ঠদেশ । পৃষ্ঠদেশ হইতে শুক্র নিঃসারক সূত্র (Spermatic Cord) পর্যন্ত বেদনা ; ধাতুনিঃসরণের পর উক্ত প্রকারের বাতনা ।

অঙ্গ, প্রত্যঙ্গ । বাহু, হাত এবং আঙ্গুলের সন্ধিতে সূচীবিধানের ভ্রায় বাতনা ; হাতের আঙ্গুলে গভীর আব্‌ডু খাব্‌ডু ফাটা এবং উহাতে অভ্যস্ত জ্বালাহুতব ; মনে হয় যেন হাতের আঙ্গুলের আগায় ক্ষত হইয়াছে । উরু, হাঁটু এবং পায় সূচী বিধানের ভ্রায় বাতনা ।

চর্ম্ম । শরীরের প্রায় সমুদয় স্থানেই দাদের ভ্রায় ফুস্ফুড়ী ; শরীরের স্থানে স্থানে গভীর জ্বালাযুক্ত এবং বেদনাযুক্ত ফাটার ভ্রায় ক্ষত (গ্রাফ্) ; কখন কখন সমুদয় শরীরে চুলকানি ; সন্ধ্যার সময় বিছানায় এবং প্রাতঃকালে ঘুম ভাঙ্গার পর বিছানায় হইতে উঠিলে শরীর চুনানি ; শরীরের স্থানে স্থানে শুষ্ক, লালবর্ণের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্রণের ভ্রায় ফুস্ফুড়ী, উতাপ লাগিলে যাহা চুলকায় ; চামড়া কঁচকাইয়া যায় ।

জ্বর । বারম্বার শীত কল্ম, শরীরের নিম্নভাগ হইতে বাহ্য উপরি-
ভাগে বিস্তৃত হয় ; সন্ধ্যার সময় বিছানায় শয়ন করিলে শরীর উষ্ণ হয় ;
বৈকালে বা সন্ধ্যার সময় শরীরের উত্তাপের সঙ্গে সঙ্গে ঘৰ্ষ ।

ব্যবহার । বৃহৎ এবং ক্ষুদ্র সন্ধিবাত জনিত অম্বুথ ; ক্ষত ; দাঁদের
জ্বর চক্রাকারের ফুসুড়ী ; মূত্রাধারাদিতে পাথরী (Gravel) ; হাঁপানি
কাশি ; বাতরোগ ; প্রমেহ রোগ ; গরমীর ব্যারাম বা পারার অপব্যবহার
জনিত শরীরের স্থানে স্থানে চক্রাকারের ফুসুড়ী ইত্যাদি অম্বুথে সান্দ্র
পেরিলা ব্যবহার্য ।

বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ । গরমীর ব্যারাম, প্রমেহ রোগ বা
পারার ব্যবহার বা অপব্যবহারের পর ইহা বিশেষ উপকারী ।

সমগুণবিশিষ্ট ঔষধ । আমোনিয়াম কার্বোনিকাম্, বেলাডোনা,
ক্যামোমিলা, মার্কিউরিয়াম্, সিপিরা, সাল্ফার ।

প্রতিষেধক ঔষধ । বেলাডোনা, মার্কিউরিয়াম্ ।

ডাইলুশন বিচার । ৬ষ্ঠ, ১২, এবং ৩০ ডাইলুশনই সচরাচর
অধিক ব্যবহৃত হইয়া থাকে । গরমীর ব্যারাম, প্রমেহ রোগ এবং পারার
অপব্যবহার জনিত অম্বুথ, বিশেষতঃ গায় চক্রাকারের ফুসুড়ীতে, মূল
আরোক, ২১৩ ফোঁটা মাত্রায়, সেবনে মিশ্র আরোক অপেক্ষা অধিক
উপকার দর্শিতে দেখা যায় ।

সেনিসিয়ো অরিয়ান্স্,-সেনিসিয়ো

(SENECIO AUREUS,-SENECIO.)

আমেরিকান ইউনাইটেড্ স্টেট্‌সের খাল নাগার নিকটবর্তী যে পট
জলাশয় থাকে, তাহার ধারে এই গাছ জন্মে । এই গাছের সমুদয় অংশ যথা
নিয়মে প্রফ্ স্পিরিটে-ভিজাইয়া মূল আরোক প্রস্তুত হইয়া থাকে ।
সেনিসিন্ যথা নিয়মে সুগায় অব্ মিকের সঙ্গে মিশাইয়া ইহার মিশ্র গুঁড়া
প্রস্তুত হইয়া থাকে ।

সাধারণ ক্রিয়া । শৈথিল্যক বিল্লীর উপবের অংশের উপর ইহার কার্য্য অতি প্রবল, বাহার দরুণ শৈথিল্যক বিল্লী উত্তেজিত হইয়া শৈথিল্য নিঃসরণের পরিমাণ অনেক বৃদ্ধি হইয়া থাকে । জননেন্দ্রিয় ও মূত্র যন্ত্রের সঙ্গে এই ঔষধের বিশেষ সম্বন্ধ আছে এবং বায়ুনল ও অস্ত্রের সঙ্গেও ইহার সম্বন্ধ আছে । স্ত্রীলোকের হিষ্টিরিয়া রোগ এবং জননেন্দ্রিয়ের অমুখের দরুণ স্নায়ু মণ্ডলীতে যে প্রকার উত্তেজনা এবং উহার নিস্তেজতা দেখিতে পাওয়া যায়, এই ঔষধেও স্নায়ু মণ্ডলীর সরুপ অবস্থা উৎপাদন করে । ইহাকে আমেরিকার লোকেরা সাধারণতঃ যথানিয়মে স্ত্রী পরিচালক (Female Regulator) বলিয়া উল্লেখ করিয়া থাকে ।

সাধারণ প্রাকৃতিক লক্ষণ ।

মন । অতি অল্প সময়ের জন্তও কোণ বিবয়ে মন নিবিষ্ট হইয়া থাকে না ।

মস্তক । মাথায় অবসন্নকারক ঘৃণ্ ঘৃণে বেদনা ; সর্দির প্রেয়ার নিঃসরণ বদ্ধ হইয়া মাথাধরা ।

চক্ষু । বাম চক্ষু এবং কপালের বাম পার্শ্বে ছুরিদিয়া কাটার ভায় তীব্র বেদনা ; চক্ষুর স্বাভাবিক নিঃসরণ বদ্ধ হইয়া চক্ষুর প্রেয়া জনিত প্রদাহ ।

নাসিকা । হাঁচি দেওয়া এবং নাসারন্ধ্রে জালা এবং পূর্ণবোধ ।

মুখগহ্বর । মুখগহ্বর এবং উহার পশ্চাৎভাগে শুষ্কবোধ ।

পাকস্থলী এবং উদর । প্রাতঃকালে ঘুম ভাঙ্গিলে বমনোদ্বেগ (গ্রাক্, নাক্স-মক্, পাল্‌স্, সিপিয়া) । পেটকামড়ানী বা শূল বেদনার ভায় বেদনা, সম্মুখ গানে বাকিয়া পড়িয়া জড় সড় হইয়া থাকিলে যাহার উপশম হয় (কলোন) ।

মল । মল জলবৎ তরল, কাগ্‌চে এবং কঠিন মল বা নেড় মিশ্রিত ।

মূত্রযন্ত্র । মূত্রাদারে শূল এবং উহাতে উষ্ণাম্ভব ও বারংবার মূত্র ত্যাগের ইচ্ছা ; অত্যন্ত মূত্রের বেগ হইয়া তৎপর শীতবোধ ; মূত্র রক্তের ছিটসংযুক্ত ; বারংবার প্রচুর পরিমাণে মূত্রত্যাগ ; মূত্রকোষ প্রদেশে সামান্য বেদনা ।

জননেন্দ্রিয় । পুরুষের শুক্র নিঃসারক বামসূত্রে (Left Spermatie Cord) পূর্ণ ও ভারিবোধ এবং বেদনা, যাহা অণ্ডকোষ পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়; প্রোষ্টেট্ গ্রন্থির (Prostate gland) বিরুদ্ধি ও স্পর্শ করিলে উহা কঠিন ও ক্ষীত বলিয়া অনুভূত হয়। ব্রীলোকের ঠাণ্ডা লাগিয়া রজঃরোধ (সিমিসিক্); কঠকর রজঃস্রাব এবং বাধকের বেদনা এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে মূত্র কুচ্ছু বা মূত্রযন্ত্রের অস্ত্রান্ত প্রকারের পীড়া; অকালে এবং প্রচুর বা অতিরিক্ত রজঃস্রাব (ক্যাল্‌ক্-কার্ক্); গোণে এবং স্বল্প রজঃস্রাব (সিপিয়া); অনিয়মিতরূপে রজঃস্রাব, অর্থাৎ কখন নিয়মিত সময়ের পূর্বে, কখন বা নিয়মিত সময়ের অনেক পর, রজঃস্রাব; রজঃস্রাবের সময় বা উহার মধ্যবর্তী সময়ে শরীরে বেদনা; রজঃস্রাব না হইয়া তৎপরিবর্তে নিয়মিত সময়ে কেবল স্বৈতপ্রদর নিঃসরণ বা উহার সঙ্গে সঙ্গে মূত্রযন্ত্রের অস্থখ ।

ঋসযন্ত্র । সর্দিজনিত তরল কাশি এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে রজঃস্রাব সঞ্চয়ী কোন গোগধোর থাকিলে বা অনিয়মিতরূপে রজঃস্রাব হইলে এই ঔষধ বিশেষ উপকারী; বায়ু উপনলের সৈন্মিক কিল্লী হইতে অধিক পরিমাণে স্লেমা নির্গমন ।

পৃষ্ঠদেশ । পৃষ্ঠদেশ এবং কোমরে বেদনা; কটদেশের বাহ পার্শ্বে ঘৃণ্‌ ঘৃণে বেদনা ।

ব্যবহার । স্লেমা জনিত অস্থখ; মৌত্রিক যন্ত্র এবং অণ্ডকোষাধার সঞ্চয়ী অস্থখ এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে মূত্রকুচ্ছু; মূত্রের সঙ্গে রক্ত নির্গমন এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে কোমরে বেদনা; মূত্রকোষের অস্থখজনিত শোথ; মূত্রকোষে রক্তাবরোধ এবং প্রদাহ; মূত্রকোষের গ্রীবার পুতান আকারের প্রদাহ; রজঃস্রাব সঞ্চয়ী অস্থখের সঙ্গে সঙ্গে কুক্ষুসের অস্থখ; অনিয়মিতরূপে রজঃস্রাব এবং কঠকর রজঃস্রাব ও বাধকের বেদনা; স্বৈতপ্রদর; মৌত্রিক যন্ত্রের অস্থখ জনিত শোথ; মূত্রকোষে রক্তাধিক্য বা রক্তাবরোধ এবং উহার প্রদাহ; মূত্রাধারের গ্রীবার পুতান আকারের প্রদাহ; কোন কোন প্রকারের রজঃরোধ ইত্যাদি অস্থখে সেনিসিয়ো ব্যবহার্য্য। একটা শুভ্র মহিলা অনেক বৎসর যাবৎ প্রচুর রজঃস্রাব এবং বাধকের বেদনা দ্বারা অত্যন্ত কষ্ট পাইয়া আসিতেছিলেন। আলোপ্যাথিক মতে উহার চিকিৎসা

সার কোন প্রকারে ক্রটি হয় নাই। কিন্তু উহাতে কোনও ফল হয় নাই। চিকিৎসা বিষয়ে বহুদর্শী এবং জ্বরী ও শিশুরোগ চিকিৎসা বিষয়ে বিশেষ পারদর্শী সুবিজ্ঞ আলোপ্যাথিক চিকিৎসক শ্রীযুক্ত ডাক্তার করুণাকুমার সেন মহাশয় একদিন আমাকে উক্ত রোগীটির রোগের বিবরণ বলেন এবং উক্ত রোগীটিকে চিকিৎসা করিতে অহুরোধ করেন। আমি লক্ষণানুসারে ঔষধ মনোনীত করিয়া প্রায় ২০ মাস চিকিৎসা করিলাম; কিন্তু উহাতে বিশেষ ফল দর্শিল না। তৎপর করুণা বাবু রোগীকে ২০ মাস পুনরায় চিকিৎসা করিলেন। কিন্তু তাহাতেও কোন ফল না দর্শিয়া ক্রমে রোগ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। ষটমাস ক্রমে আমি এক দিবস করুণা বাবুব নিকট যাই। যখন আমি তাঁহার বাড়ীতে পৌঁছাইলাম তখন উক্ত রোগীর স্বামী করুণা বাবুব নিকট বসিয়াছিলেন। তিনি আমাকে দেখিয়া বলিলেন যে “আমার জ্বরী রোগেরতো আপনারা কিছুই করিতে পারিলেন না, এখন উপায় কি? রোগী মারা যাইবে?” অনেক ভাবিয়া ভাবিষা এবং অহুসস্থানের পর সেনিসিয়ো মূল আরোক, ২ কেঁটা মাত্রায়, প্রতিদিন ৩ মাত্রা করিয়া ৮১০ দিবস সেবন করাইলে তাহার রোগটি সারিয়া গিয়াছে। এহলে বলা আবশ্যক যে, রজঃশ্রাবের সময় অতিরিক্ত রক্তশ্রাব, তলপেটে ভয়ানক অবসন্ন কারক বেদনা, শরীরে, বিশেষতঃ কোমবে, বেদনা, মূত্র ক্লান্ত ইত্যাদি লক্ষণগুলি উক্তরোগীর বর্তমান ছিল। প্রায় ১০ ১৪ বৎসর গত হইল কলিকাতাহ কোন একটা হোমিওপ্যাথিক ঔষধালয়ের ম্যানেজারের জ্বর উক্ত প্রকারের কষ্টকর রজঃশ্রাব ও বাধকের বেদনা এবং তজ্জনিত অস্থির সেনিসিয়ো দ্বারা ৫৬ দিবসের মধ্যে আরাম করা গিয়াছিল। এহলে বলা আবশ্যক যে, কলিকাতাহ সুবিজ্ঞ হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক ডাক্তার বিহারীলাল ভাট্টা এবং ডাক্তার সালজার (Dr. Salzer) সাহেবও এই রোগীর চিকিৎসা করিয়া বিশেষ কিছু করিতে পারেন নাই।

সমগুণবিশিষ্ট ঔষধ। হেলেনিয়াস্, পালমেটিকা এবং লাক্সুনেরিয়ার কার্যের সঙ্গে সেনিসিয়োর কার্যের বিশেষ সাদৃশ্য আছে। এতদ্বির ইহার কার্যের সঙ্গে ক্যাকেরিয়া কার্বোনিকা, ফক্ষরাস্ এবং সিপিয়ার কার্যেরও সাদৃশ্য আছে।

ডাইলুশন বিচার। লেখক এই ঔষধের মূল আরোক ২৩ ফোঁটা মাত্রায় সূচ্যচর ব্যবহার করিয়া থাকেন। মিশ্র আরোক ব্যবহার করিয়া অনেক রোগীর চিকিৎসায় বিশেষ ফল না পাইয়াই লেখক মূল আরোক উক্ত মাত্রায় ব্যবহার করেন এবং তদ্রূপ ফলও পাইয়া থাকেন।

স্টাফিসেগ্রিয়া, -স্টাফিস্

(STAPHISAGRIA, -STAPH.)

দক্ষিণ ইউরোপে এই পাঁছ জন্মে। ইহার ফলের বিচি যথানিয়মে রেক্-টিকায়েড্ স্পিরিটে ভিজাইয়া মূল আরোক প্রস্তুত হইয়া থাকে।

সাধারণ ক্রিয়া। জননেন্দ্রিয় এবং মূত্র যন্ত্রের উপর ইহার কার্য্য অতি প্রবল। ইহা মূত্রনালীর প্রোষ্টেট্ গ্রন্থি (Prostate gland) নিকটবর্তী স্থানের স্নায়িক বিশ্লীই অধিক আক্রমণ করে, যাহার দরুন উক্ত স্থান উত্তেজিত এবং পুরাতন আকারে প্রদাহযুক্ত হয় ও যদ্বারা কখন কখন শুক্র নিঃসারক নালী এবং শুক্রনিঃসরণের সহায়কারী নালীও আক্রান্ত হইয়া থাকে, যাহার দরুন শুক্রকরণের লক্ষণাদি প্রকাশ পায়। অতএব শুক্র ক্ষরণে এই ঔষধ সেবনে বিশেষ উপকার পাওয়া যায়। ইহা বৃহৎ মস্তিষ্ক (Cerebrum), পরিপাক সঞ্চায় যন্ত্র এবং চর্ম্মও আক্রমণ করিয়া থাকে।

সাধারণ প্রাকৃতিক লক্ষণ।

মন। সর্ব্বদা চিড়্ চিড়্ করা; রোগী দ্রব্যাদি অত্যন্ত রাগের সহিত এদিক ওদিক ছুড়িয়া ফেলিয়া দেয় (ক্যাম্, সিনা); মনের সামান্য আন্দোলনেই অস্থির হইয়া পড়া; অন্তায় কোন রকমের কথা শুনিলেই রোগীর (স্ত্রীলোক) মনে যেন অত্যন্ত আঘাত লাগে (নাক্স-বম্, প্লাটিনা); অস্ত্র লোষ্ট্রের এবং রোগীর আপন কার্য্যে চটিয়া যাওয়া এবং কার্য্যের যে কি কুফল হইবে তাহা ভাবিয়াই রোগী অত্যন্ত ক্ষোভান্বিত হয়; অরুণশক্তি হ্রাসিত বা হ্রাস (আনাকাৰ্ভ্, ক্রিয়াজ্, ল্যাকেসিস্, মার্ক্, নাক্স-মক্), স্ত্রী বা পুরুষ সহবাস বা হস্তমৈথুনের পরই যাহা অধিক অন্তঃস্থ হয় (চারনা,

ফল্‌আস্‌); মাথার ভারিবোধ, হাতের উপর মাথা রাখিলে যাহার উপশম হয় ।

মস্তক । মনে হয় যেন কপালে গোলাকারের গোলায় ভ্রাম্য কোন পদার্থ দৃঢ়ভাবে লাগিয়া রহিয়াছে যাহা মাথা ঝাকিলেও দূরীভূত হয় না ; মস্তিষ্ক চতুর্দিকে দৃঢ়ভাবে চাপিয়া ধরিলে যেৰূপ হয়, মাথায় সেরূপ বেদনা, কপালেই যাহা অধিক অনুভূত হয় ; কপালের ঠিক মধ্যভাগে কোন এক নির্দিষ্ট স্থানে চিমাবোধ ; প্রাতঃকালে কপালের বাম অর্দ্ধাংশে চাপিয়া ধরা, হিজ্র করা, বা স্থচীবিধানের ভ্রায় যাতনা, যাহা মধ্যদেশ হইতে বহির্দেশে বিস্তৃত হয় ; মাথার ঠিক উপরিভাগের উপরে তীক্ষ্ণ স্থচী বিধানের ভ্রায় যাতনা ; বহির্দেশ ও ভিতর হইতে চাপিয়া ধরিলে যেৰূপ হয়, মাথার পশ্চাৎভাগে সেরূপ যাতনা ; মাথার পশ্চাৎভাগ, মাথার পার্শ্ব এবং কর্ণের পশ্চাৎভাগে অর্দ্ধ, চুলকানি বিশিষ্ট হর্গন্ধযুক্ত মামড়ী বিশিষ্ট ফুসুড়ী (গ্রাফ্‌, লাইকোপ্‌, সাইলিসি, সাল্‌ফ্‌) ।

চক্ষু । চক্ষুর গোলক এবং পাতায় শুষ্ক ও চাপাবোধ ; চক্ষুর পাতার প্রান্তে চুলকানি (সিপিয়া, সাল্‌ফ্‌) ; চক্ষুর পাতার প্রান্তের প্রদাহ এবং রক্তিতে চক্ষুর পাতায় পাতায় লাগিয়া থাকা (ক্যাল্‌-কার্ক্‌, গ্রাফ্‌, সিপিয়া, সাল্‌ফ্‌) ; চক্ষুর পাতার প্রদাহ ; আঞ্জনী (পাল্‌স্‌, লাইকোপ্‌) ; চক্ষুর পাতার উপর কঠিন আবেশ ভ্রায় ক্ষীতি এবং কঠিনতা (গ্রাফ্‌) যাহা একটা পাতা আক্রমণের পর অপর পাতা আক্রমণ করিয়া থাকে এবং কখন কখন চক্ষুর পাতায় ক্ষতও হইয়া থাকে ; গরমীর ব্যারাম জনিত চক্ষুর আইরিস্‌ নামক অংশের প্রদাহ (Syphilitic Iritis) এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে চক্ষুর গোলক, কপালের পার্শ্ব এবং মুখমণ্ডলের পার্শ্বে কাটিয়া যাওয়ার ভ্রায় বেদনা ; সন্ধি-বাত জনিত চক্ষু প্রদাহ, যাহার যাতনাদি দাঁত পর্য্যন্তও বিস্তৃত হয় ; চক্ষের সামান্য সঞ্চালনেই চক্ষে জ্বালা উদ্ভেদ হয়, যাহার দরুণ মনে হয় যেন চক্ষু শুষ্ক, অথচ চক্ষু দিয়া অনবরত প্রচুর পরিমাণে জল পড়ে ; নাসিকায় নিকট-বর্তী চক্ষুর কোণের মধ্যে নেত্রনালীর পূর্ববর্তী ফোড়ার ভ্রায় ক্ষীতি (An-
chylope), যাহার যাতনাদি কমিয়া গেলেও ক্ষীতি এবং কঠিনতা থাকিয়া যায় ; চক্ষুর বোজক ঝিল্লীতে চর্কিপূর্ণ আব ; চক্ষুর বোজক ঝিল্লীতে পলি-